ICS 67.080.10
B 31

DB22

吉　林　省　地　方　标　准

DB 22/T 2169—2014

地理标志产品　西江大米（西江贡米）

Product of geographical indication-xijiang rice

2014－11－25 发布　　2014－12－25 实施

吉林省质量技术监督局　发布

前　言

本标准按照GB/T 1.1-2009、GB/T 17924-2008给出的规则起草。

本标准由通化县人民政府提出。

本标准由吉林省地理标志产品保护办公室归口。

本标准起草单位：吉林省地理标志产品保护协会、通化县质量技术监督局、通化县粮食储备销售有限公司。

本标准主要起草人：李宁、田桂英、刘波、刘大续、隗祥君、王丽娟、赵美莲、张学民。

地理标志产品　西江大米（西江贡米）

1　范围

本标准规定了地理标志产品西江大米（西江贡米）的术语和定义、保护地范围、自然条件、生产技术要求、产品技术要求、净含量、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫总局依据《地理标志产品保护规定》批准的《地理标志产品 西江大米（西江贡米）》保护公告的西江大米（西江贡米）。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191　包装储运图示标志

GB 1350　稻谷

GB 2715　粮食卫生标准

GB 5009.3　食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 5009.11　食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12　食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB/T 5009.15　食品中镉的测定

GB/T 5009.17　食品中总汞及有机汞的测定

GB/T 5009.123　食品中铬的测定

GB/T 5492　粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5494　粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5496　粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法

GB/T 5502　粮油检验 米类加工精度检验

GB/T 5503　粮油检验 碎米检验法

GB 7718　食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8321（所有部分）　农药合理使用准则

GB 14881　食品安全国家标准　食品生产通用卫生规范

GB/T 15682　粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法

GB/T 15683　大米 直链淀粉含量的测定

GB/T 17109　粮食销售包装

GB/T 17891　优质稻谷

GB/T 18979　食品中黄曲霉毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法和荧光光度法

GB/T 23502　食品中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法

GB 28050　食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

NY/T 496　肥料合理使用准则　通则

JJF 1070　定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令 第75号（2005） 《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令 第123号（2009） 《食品标识管理规定》

国家质量监督检验检疫总局2006年第109号公告《关于发布地理标志保护产品专用标志比例图的公告》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

西江大米（西江贡米） xijiang rice

以保护区域内生产的水稻加工的大米，素以“西江贡米”著称。

4 保护地域范围、自然条件

4.1 地理标志保护范围

西江大米（西江贡米）的保护范围限于地理标志管理部门根据《地理标志产品保护规定》批准的范围,西江镇地处地理坐标为北纬 41° 25′ ～41° 34′ ,东经 125° 37′ ～125 ° 47′ 。面积 142.6 km^2。为吉林省通化县西江镇现辖行政区域，见附录 A。

4.2 环境

4.2.1 海拔

吉林省通化县西江镇位于通化县南部，距201国道16 km，地势东南和东北部较高，西部和西南部较低，海拔300 m～1200 m之间。

4.2.2 气候

产区属东亚季风气候，中温带湿润气候区。年平均气温 5.5℃以上，最高气温 7 月份 35.5℃，最低气温 1 月份 -39.2℃，年平均日照 2514 小时，无霜期 140 d～150 d，年平均降雨量 790 mm，积温在 2600℃～2850℃之间。

4.2.3 土壤

冲积型水稻土、沼泽型水稻土和草炭型水稻土。土壤 pH 为 5.5～7.5，有机质含量≥2%。

5 生产技术要求

5.1 品种

“吉粳 83”、“通禾 835”、“稻花香 2 号”或选用通过国家或地方审定适应当地种植的食味性好的品种。

5.2 栽培管理

5.2.1 育秧

育秧应符合下列要求：

a) 育秧方法：育苗方法为旱育稀播。育苗地选择无污染、背风向阳，排水良好的旱田。
b) 播种期：播种期为 4 月中旬。秧田期 35 d～40 d。
c) 播种量：每平方米播催芽种子为 150 g～200 g。用种量小于等于 2.5 公斤每亩。
d) 插秧 4 月 25 日前完成春翻后放水泡田。5 月中下旬以后开始插秧，插秧密度为 10600 穴每亩～13300 穴每亩，2 株每穴～3 株每穴。

5.2.2 田间管理

在整地前施第一次腐熟有机肥 2 立方米每亩～3 立方米每亩，翻耕，结合整地施第二次腐熟有机肥，灌水泡田，整细耙平，插秧。

5.2.3 农药、肥料要求

5.2.3.1 农药应符合 GB/T 8321 的规定。
5.2.3.2 肥料应符合 NY/T 496 的规定。

5.3 收获与脱粒

5.3.1 9 月下旬到 10 月上旬，当黄熟谷粒达到 95%时采用人工或机械收割。
5.3.2 按品种单收、单贮，稻谷质量应符合 GB 1350 的规定。

5.4 大米加工工艺

风选→清理→去杂→砻谷→谷糙分离→碾米→精选→分级→检验→包装→入库。

6 产品技术要求

6.1 感官

6.1.1 米粒亮泽、呈透明或半透明，圆润饱满，青白有光泽。
6.1.2 具有大米固有的米味，无异味。
6.1.3 米饭口感香润粘滑，米饭表面有油光，凉后不回生。

6.2 加工质量指标

加工质量指标见表1。

表 1 加工质量指标

项目		指标要求	
		一级	二级
加工精度/%		背沟无皮或有皮不成线，米胚和粒面皮层去净的占 90%以上	背沟有皮，米胚和粒面皮层去净的占 85%以上
不完善粒/（%）	≤	3.0	3.0
垩白粒率/（%）	≤	8	10
杂质最大限量	总量/（%） ≤	0.10	0.20
	糠粉/（%） ≤	0.15	0.15
	矿物质/（%） ≤	0.02	
	带壳稗粒/（粒/kg）	10	
	稻谷粒/（粒/kg）	4	
碎米	总量/（%） ≤	5.0	10
	小碎米/（%） ≤	0.1	0.3
黄粒米/（%）	≤	0.5	1.0

6.3 理化指标

理化指标要求见表2。

表 2 理化指标

项　目		指　标
水分/%	≤	15.5
品尝评分值/分	≥	75
直链淀粉含量/%		15～18
胶稠度/mm	≥	70
黄曲霉毒素 B_1/（μg /kg）	≤	5.0
赭曲霉毒素A/（μg /kg）	≤	5.0
铅（以Pb计）/（mg/kg）	≤	0.2
镉（以 Cd 计）/（mg/kg）	≤	0.2
总汞（以 Hg 计）/（mg/kg）	≤	0.02
无机砷（以 As 计）/（mg/kg）	≤	0.2
铬（以 Cr 计）/（mg/kg）	≤	1.0
苯并[a]芘/（μg /kg）	≤	5.0

6.4 卫生指标

卫生指标按 GB 2715 规定执行。

6.5 加工生产过程中的卫生要求

6.5.1 原料应符合 GB 1350、GB/T 17891 的规定。
6.5.2 生产过程应符合 GB 14881 的规定。

7 净含量

按国家质量监督检验检疫总局［2005］75号令执行。

8 试验方法

8.1 感官和加工质量检验

8.1.1 感官检验按 GB/T 5492 规定的方法检验。
8.1.2 加工精度按 GB/T 5502 规定的方法检验。
8.1.3 不完善粒、杂质按 GB/T 5494 规定的方法检验。
8.1.4 垩白粒率按 GB/T 17891 规定的方法检验。
8.1.5 碎米按 GB/T 5503 规定的方法检验。
8.1.6 黄粒米按 GB/T 5496 规定的方法检验。

8.2 理化指标检验

8.2.1 水分

按 GB 5009.3 规定的方法测定。

8.2.2 品尝评分值

按 GB/T 15682 规定的方法测定。

8.2.3 直链淀粉

按 GB/T 15683 规定的方法测定。

8.2.4 胶稠度

按 GB/T 17891 规定的方法测定。

8.2.5 黄曲霉毒素 B_1

按 GB/T 18979 规定的方法测定。

8.2.6 赭曲霉毒素 A

按 GB/T 23502 规定的方法测定。

8.2.7 铅

按 GB 5009.12 规定的方法测定。

8.2.8 镉

按 GB/T 5009.15 规定的方法测定。

8.2.9 总汞

按 GB/T 5009.17 规定的方法测定。

8.2.10 无机砷

按 GB/T 5009.11 规定的方法测定。

8.2.11 铬

按 GB/T 5009.123 规定的方法测定。

8.2.12 卫生指标

按 GB 2715 规定检验。

8.3 净含量

按 JJF 1070 中规定的方法检验。

9 检验规则

9.1 出厂检验

9.1.1 每批产品出厂前，都应进行出厂检验。检验部门签发合格证方可出厂销售。

9.1.2　出厂检验项目包括感官指标、水分和净含量。

9.2　型式检验

9.2.1　有下列情况之一应进行型式检验：

a）正常情况每年一次；
b）相邻 2 次出厂检验结果差异较大时；
c）生产设备调整、大修后；
d）生产环境发生较大变化时。

9.2.2　型式检验项目包括本标准中的全部技术要求。

9.3　抽样

9.3.1　同一生产基地、同一品种、同一播种期、同一加工方法和、包装、同一等级的产品为同一批产品。

9.3.2　抽样的原则是件数不足 5 件，逐件抽取份样；5 件以上的每增加 6 件～100 件，随机再抽取 1 个份样。

9.3.3　将随机抽取的份样混匀，用 4 分法分别合成 3 个样本，每个样本为 500 g，用无毒器皿分别盛装，密封后存于干燥阴凉处。

9.3.4　抽取的样本为 1500 g。其中 1/3 量用于检验用，1/3 量用于复检，1/3 量用于备用。

9.4　判定规则

9.4.1　检验的全部指标检验合格，则该批产品判为合格产品。

9.4.2　凡检验不合格的项目，应取样进行复检，如仍不合格，则判定该项目不合格。

9.4.3　感官项目不得复检。

9.5　复检

在保质期内，供需双方对产品质量发生争议，可共同委托上级检验机构进行一次复检，并作为最终结论。

10　标志

10.1　食品标签

产品包装上的标识应符合GB 7718、GB 28050、国家质量监督检验检疫总局2009年第123号令的规定。

10.2　地理标志

地理标志产品专用标志应符合国家质量监督检验检疫总局 2006 年第 109 号公告的规定。

10.3　包装贮运图示标志

10.4　包装贮运图示标志应符合 GB/T 191 包装储运图示标志。

11　包装、运输、贮存

11.1　包装

包装应符合 GB/T 17109 的规定。

11.2 运输

11.2.1 产品运输应使用符合卫生要求的运输工具。

11.2.2 运输过程防止雨淋和污染。

11.3 贮存

11.3.1 产品应在干燥、通风、防雨、防虫、防鼠和无污染的环境存放。


11.3.2 不得与有毒有害物质存放在同一环境中。

11.4 保质期

在满足贮存条件下18个月。

附　录　A
（规范性附录）
西江大米地理标志范围

A.1　西江大米（西江贡米）地理标志产品保护范围为吉林省通化县西江镇现辖行政区域。见图 1



图A.1　西江大米（西江贡米）地理标志产品保护范围