ICS 65.020.20

B 05

DB2303

黑 龙 江 省 鸡 西 市 地 方 标 准

DB 2303/T 001—2020

地理标志产品 珍宝岛大米生产技术规程

2020－12－01 发布　　2020－12－01 实施

鸡西市市场监督管理局　发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　产地要求 1
4　种子 2
5　育苗 2
6　耕整地及插秧 4
7　本田管理 5
8　收获 7
9　生产档案 7
10　质量特性 7
附录 A（规范性附录）　地理标志产品　珍宝岛大米保护范围 8
附录 B（规范性附录）　珍宝岛大米质量特性 9

前　言

本标准依据 GB/T 1.1-2009 编写规则起草。

本标准由虎林市大米行业协会提出。

本标准起草单位：虎林市农业技术推广中心、虎林市大米行业协会、虎林市市场监督管理局。

本标准主要起草人：栾浩文、宋智慧、袁建江、仲桂芳、毛德恩、邢博翰。

地理标志产品 珍宝岛大米生产技术规程

1 范围

本标准规定了地理标志产品珍宝岛大米的产地要求、种子、育苗、播种、耕整地及插秧、本田管理、收获、生产档案和质量特性等。

本标准适用于原国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护范围内珍宝岛大米的生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1350 稻米

GB/T 1354 大米

GB 2715 食品安全国家标准 粮食

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB/T 8321 农药合理使用准则

GB 13122 食品安全国家标准 谷物加工卫生规范

GB/T 15683 大米 直链淀粉含量的测定

GB/T 15790 稻瘟病测报调查规范

GB/T 22294 粮油检验 大米胶稠度的测定

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 1276 农药安全使用规范总则

3 产地要求

3.1 产地范围

珍宝岛大米地理标志产品保护范围以黑龙江省虎林市人民政府《关于虎林市珍宝岛大米地理标志范围划定情况的报告》（虎政发[2007]40号）提出的范围为准，北纬45°23′-46°36′，东经132°11′-133°56′即为黑龙江省虎林市虎林镇、杨岗镇、虎头镇、迎春镇、宝东镇、东方红镇、东诚镇、伟光乡、新乐乡、阿北乡、珍宝岛乡等11个乡镇现辖行政区域及八五零农场、八五四农场、八五六农场、八五八农场、云山农场、庆丰农场等6个国营农场。见附录A。

3.2 产地环境

产地环境质量符合《绿色食品本地环境技术条件》的要求。

3.3 土壤条件

土层厚 20 cm～40 cm,有机质含量≥3%，pH 值在 5.5～6.5 之间。

4 种子

4.1 品种

根据当地积温条件，选择优质、高产、抗病耐寒，分蘖性强，符合产品质量特征要求的优良品种。中部、西部乡镇以 11 片叶水稻品种为主，搭配种植 12 片叶水稻品种；东部、北部乡镇以 10 片叶水稻品种为主，搭配种植 11 片叶水稻品种。可选用的品种有绥粳 18、龙粳 21、龙粳 31 等。

4.2 种子质量

种子应符合 GB 4404.1 规定，种子每年更换一次,种子发芽率 99%以上，纯度大于 99%，净度大于 99%，水分小于 14%。

4.3 晒种

浸种前选晴天背阴通风处晒种 2 d～3 d,每天翻动 3 次～4 次。

4.4 浸种消毒

用 25%氰烯菌酯悬浮剂 2 000 倍～3 000 倍液浸种，液面要高出种子袋 20 cm，浸种温度 12 ℃～14 ℃，浸种时间 5 d～7 d。

4.5 催芽

当种子浸透催芽前，排净箱内浸种用水，并用同温度水清洗 1 遍～2 遍。然后，注入 32 ℃～35 ℃清水，调至 32 ℃并保持 8h～12h,即可破胸露白,再用 20 ℃～25 ℃清水调至 25 ℃～28 ℃保持 8h～10 h，当芽长 1 mm 时，用 15 ℃～20 ℃左右温水洗种、降温、出箱。

4.6 晾芽

播种前将催好芽的种子摊开除去多余水分并降低温度。晾芽 6 h 左右，方可播种。

5 育苗

5.1 壮苗标准

机插秧龄 30 d～35 d，叶龄 3.1 片～3.5 片，苗高 12 cm～14 cm，根数 12 条～13 条，百株苗干重大于 3 g。

5.2 育苗准备

5.2.1 秧田地选择

选择地势平坦，背风向阳，排水良好，水源方便，土质疏松肥沃的旱田，园田或本田中的台田，建设高标准永久性秧田。

5.2.2 秧本田比例

秧本田比例为 1：（80～100），每公顷本田需育秧田 100 ㎡～125 ㎡。

5.2.3 苗床规格

采用大棚育苗，棚宽 8 m～12 m，棚内设置 2～3 个床，床间步行道宽 30 cm，床长 30 m～60 m，棚高 2.5 m～3.0 m。

5.2.4 整地做床

置床要做到细、平、实，清除根茬，打碎土块，整平床面。

5.2.5 制床施肥

每平方米施腐熟草炭 5 kg～10 kg，或腐熟猪粪 10 kg，均匀混拌 10 cm 厚的耕层土中。肥料使用应符合 NY/T 496 的规定。

5.2.6 床土配制

取旱田土 3 份加 1 份腐熟好的有机肥配置营养土,将其过筛后与水稻壮秧剂混合。每 800 kg～900 kg 过筛细土配 11 kg 壮秧剂（纯 NPK≥15），充分混拌均匀，装入 360 个～400 个机插盘中，用于 60 ㎡～65 ㎡苗床。高纯度壮秧剂需严格按照说明书配比。

5.2.7 苗床浇水

置床消毒前先浇足底水，施药消毒后使床土达到饱和状态。

5.2.8 置床消毒

每平方米苗床用 30%甲霜•噁霉灵水剂 2 ml，稀释 1 500 倍～2 000 倍喷施进行置床消毒。

5.2.9 置床调酸

使用固体硫酸进行置床调酸，将 98%的固体硫酸 1 kg 加 100 kg 水，调成 1%左右浓度硫酸水,每平方米置床浇施 300 kg，把床土 pH 值调到 4.5～5.5。

5.3 播种

5.3.1 播期

播种时间为 4 月 15 日～4 月 25 日，当日均气温稳定通过 5 ℃～6 ℃时开始播种，抓住冷尾暖头进行播种。

5.3.2 播量

机插盘每盘播芽谷 100 g～125 g，钵体 561 孔盘每盘播芽种 50 g～60 g，手插苗每平方米播芽谷 200 g～250 g。

5.3.3 压籽

播种后拍压种子，使种子三面入土。

5.3.4 覆土

用过筛无草籽的疏松沃土盖严种子，覆土厚度 0.5 cm～1 cm。

5.3.5 封闭除草

覆土后封闭除草，每 100 ㎡苗床用 90%杀草丹乳油 20 ml～25 ml，兑水 2 L，均匀喷施在土壤表层。农药使用符合 GB/T 8321、NY/T 1276 规定。

5.3.6 平铺地膜

播种后在床面平铺地膜，出苗达 80%立即撤掉。

5.4 秧田管理

5.4.1 温度管理

播种至出苗期，密封保温。苗床见绿后及时通风炼苗。出苗至 1.5 叶期，温度不超过 28 ℃。秧苗 1.5 叶～2.5 叶期，逐步增加通风量，棚温降到 25 ℃。秧苗 2.5 叶～3.0 叶期，棚温控制到 20 ℃。湿度大时，阴天也要小通风。移栽前全揭膜，炼苗 3 d 以上，遇到低温时，增加覆盖物，及时保温。

5.4.2 水分管理

秧苗 2 叶期前，在浇透底水基础上一般不用浇水，但当早晨叶尖无水珠时需要补水，床面有积水要及时晾床，保持床土旱田状态。秧苗 2 叶期后，床土易干旱，要早、晚浇水，1 次浇足浇透。揭膜后可适当增加浇水次数，但不能灌水上床。

5.4.3 苗床灭草

水稻出苗后，稗草 1.5 叶～2 叶期，每 666.7 ㎡使用 10%氰氟草酯乳油 60 ml，兑水 30 L 茎叶喷雾；在苗床稗草、阔叶草较多时，秧苗 1.5 叶期，每 666.7 ㎡使用 10%氰氟草酯乳油 60 ml 加 48%排草丹水剂 160 ml～180 ml，兑水 30 L 茎叶喷雾。

5.4.4 防治立枯病

秧苗 1.5 叶期时，每平方米苗床用 30%甲霜•噁霉灵水剂 2 ml 稀释 800 倍～1 000 倍喷浇秧苗。

5.4.5 苗床追肥

秧苗 2.5 叶期发现脱肥，选用腐殖酸液肥每平方米 1 ml，兑水 100 ml 叶面喷施。

5.4.6 秧苗“三带”

一带肥：起秧前 1 天每平方米苗床撒施磷酸二铵 150 g；二带药：70%吡虫啉水分散粒剂 6 g/100 ㎡对水 3 L 喷雾；三带生物菌：每 100 ㎡苗床喷施液体生物菌（每毫升活性菌≥2 亿）800 ml，或者每 100 ㎡苗床撒施颗粒生物菌（每克活性菌≥2 亿）1 kg。

6 耕整地及插秧

6.1 本田耕整地

整地前要清理和维修好灌排水渠，保证畅通。

6.1.1 修建方条田

单池子面积 1 500 ㎡～4 000 ㎡，长 50 m～80 m，宽 30 m～50 m。也可根据地势情况科学确定，实行单排单灌。

6.1.2 耕翻地

土壤适宜含水量为 25%～30%，耕深 18 cm～22 cm；采用耕翻、旋耕、深松及耙耕相结合的方法。以翻 1 年，旋 2 年为宜。

6.1.3 泡田

5 月上旬放水泡田。

6.1.4 整地

旱整地与水整地相结合，旋耕田只进行水整地。旱整地要旱耙、旱平、整平堑沟，结合泡田打好池埂；水整地要在插秧前 5 d～7 d 进行。整地时间和进度要和移栽时间和进度相吻合，整地质量要整平耙细，做到高低不差寸，寸水不露泥。搅浆平地机整地至少要沉降 15 d。

6.2 插秧

6.2.1 插秧时期

日平均气温稳定通过 13 ℃时开始插秧，一般在 5 月 15 日～25 日插秧。

6.2.2 插秧规格

机插秧以 30 cm×13.3 cm 为主，每穴 5 株～7 株基本苗。

6.2.3 插秧质量

插秧深度 1.5 cm～2 cm；插秧行要直；田间要插满、插严，做到不漏插、不飘苗。

7 本田管理

7.1 施肥管理

肥料应符合 NY/T 496 的规定，施肥要求水稻配方肥与农家肥配合使用。

7.1.1 施肥量

每 666.7 ㎡施腐熟农家肥 1.5 ㎥以上。施化肥总量：纯氮 6 kg～8 kg， 纯磷 3kg～4kg，纯钾 2.5 kg～4 kg。

7.1.2 底肥

农家肥于翻地前施入。化肥用氮肥总量的 40%～50%、钾肥的 50%～80%、磷肥 100%。采用全层施肥翻后旱耙前施入或者泡田前将肥料撒施田面，结合旋耕，将肥料混入耕层。

7.1.3 蘖肥

返青后立即追蘖肥，施肥量为氮肥总量的 20%～30%。6 月中、下旬秧苗脱肥地块，追调节肥，即氮肥总量的 10%。

7.1.4 穗肥

倒 2 叶展开一半时，追施氮肥总量的 20%～30%和剩余的钾肥，在 7 月 10 日前追完，水稻长势过旺或遇到低温、多雨寡照或发生病害时，只施钾肥。发生病害的稻田先治病再追肥。

7.2 水分管理

7.2.1 护苗水

插秧后返青前灌苗高 2/3 深的水。

7.2.2 分蘖水

有效分蘖期灌 3 cm～5 cm 深的水，增温促蘖。

7.2.3 晒田

有效分蘖末期前 3d～5d 排水晒田，一般达到目标苗数的 80%～85%时，开始晒田。晒田达到池面有裂缝，裂缝见白根，叶挺色淡，晒 5 d～7 d,晒后恢复正常水层。

7.2.4 护胎水

孕穗至抽穗前，灌 4 cm～6 cm 深的水。水稻减数分裂期遇到 17 ℃以下低温灌 15 cm～20 cm 深水护胎，井灌稻区井水应提前增温再进田。

7.2.5 扬花后水分管理

抽穗扬花期，灌 5cm～7cm 深的水，灌浆到蜡熟间歇灌水。黄熟初期开始排水，洼地适当提早排水，漏水地适当晚排。

7.3 化学除草

7.3.1 插前封闭

本田整地后，插前 5 d～7 d 每 666.7 ㎡使用 30%的莎稗磷乳油 50 ml～67 ml 加 10%的吡嘧磺隆可湿性粉剂 10 g～15 g，甩施，保持水层 3 cm～5 cm，保水 5 d 以上。

7.3.2 插后封闭

插后封闭：在插秧后 10 d～15 d，每 666.7 ㎡使用 53%的苯噻酰·苄可湿性粉剂 80 g 混拌 15 kg～20 kg 细土，毒土法施入，施药后保水 5 d～7 d。防治应符合 NY/T 1276 的有关规定。

7.4 虫害防治

7.4.1 潜叶蝇防治

水稻插后开始返青时，每 666.7 ㎡使用 70%吡虫啉水分散颗粒剂 6 g,对水 15 L 叶面喷雾。

7.4.2 负泥虫防治

负泥虫发生盛期，在清晨有露水时，用扫帚将幼虫扫落于水中；或喷药防治，每 666.7 ㎡使用 5%高效氯氟氰菊酯水乳剂 20 ml～30 ml，兑水 20 L 叶面喷雾。

7.5 病害防治

7.5.1 稻瘟病防治

叶瘟防治要稀植栽培，控制氮肥使用量，搞好预测预报，加强田间观察，及时控制发病中心，田间发病达到防治指标时，每 666.7 ㎡使用 75%三环唑可湿性粉剂 50 g，兑水 40 L～50 L 喷雾。在水稻抽穗前的孕穗破口期和齐穗期各喷一次，每 666.7 ㎡使用 40%稻瘟灵粉剂 60 g～75 g，兑水 30 L 喷雾防治。测报符合 GB/T 15790 规定。

7.5.2 纹枯病防治

在水稻 10.1 叶期（11 叶品种）和孕穗期，每 666.7 ㎡使用 75%戊唑醇·肟菌酯水分散粒剂 15 g～20 g，或 24%噻呋酰胺悬浮剂 15 ml～20 ml，兑水 30 L 喷雾，喷雾时撤浅水层向水稻中、下部叶鞘喷雾。

8 收获

8.1 收获时间

当 90%～95%稻粒达到完熟时收获，做好晾晒降低水分；单品种、单收获、单脱粒、单加工。

8.2 机械收获

留茬不高于 20 cm，收获损失率不大于 3%，破碎率不大于 1%，收获后应及时干燥或晾晒，并实行秸秆还田。


9 生产档案

应建立水稻生产档案，记录包括：地块档案和整地、播种、灌溉、施肥、病虫草害防治、收获等，以备查阅。

10 质量特性

珍宝岛大米质量特性见附录 B。

附 录 A
（规范性附录）
地理标志产品 珍宝岛大米保护范围



附 录 B
（规范性附录）
珍宝岛大米质量特性

B.1 生产加工

B.1.1 稻谷应符合 GB 1350 的规定。
B.1.2 加工技术流程：稻谷→筛选→去石→磁选→砻谷→谷糙分离→碾米→去碎米→色选→抛光→成品→包装。
B.1.3 珍宝岛大米生产加工应符合 GB 13122 的规定。

B.2 质量特性

B.2.1 产品品质

B.2.1.1 珍宝岛大米达到 GB/T 1354 优质大米中优质粳米二级及以上标准。
B.2.1.2 符合地理标志产品保护公告(2008 年第 25 号)质量特色要求。

B.2.2 质量特色

B.2.2.1 感官特征

珍宝岛大米感官特征：半透明，有光泽，蒸煮时饭有清香味，米饭口感绵软有弹性、饭粒晶莹透亮、饭味清香适口。

B.2.2.2 理化特性

珍宝岛大米理化特性指标见表 B.1。

表 B.1

项 目	指 标	检验方法
蛋白质/%	6～8	按 GB 5009.5 执行
胶稠度/mm ≥	70	按 GB/T 22294 执行
直链淀粉/%	14～18	按 GB/T 15683 执行

B.3 安全要求

B.3.1 产品安全指标必须达到国家对同类产品的相关规定。
B.3.2 珍宝岛大米应符合 GB 2715、GB 2762、GB 2763 等食品安全标准和法律法规相关要求。