ICS 67.060
B 22
备案号：46825—2015

DB31

上 海 市 地 方 标 准

DB31/T 908—2015

地理标志产品 松江大米

Product of geographical indication Songjiang rice

2015-06-25 发布 2015-08-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

手机发送防伪码至13720982315
网址www.cnhw315.com
电话400698315
刮涂层 查真伪

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出规则起草。

本标准由上海市松江区人民政府提出。

本标准由上海市质量技术监督局粮油作物标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海市松江区质量技术监督局、上海市松江区农业委员会、上海市松江区农业技术推广中心。

本标准主要起草人：吴国荣、李永华、刘旭阳、徐建军、郑建孟、陶玲萍。

地理标志产品　松江大米

1　范围

本标准规定了松江大米的术语和定义、产地范围、地域环境特点、生产技术规范、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护范围内生产的松江大米。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1354　大米

GB 2715　粮食卫生标准

GB 3095　环境空气质量标准

GB 5009.5　食品安全国家标准　食品中蛋白质的测定

GB 5084　农田灌溉水质标准

GB 5491　粮食、油料检验　扦样、分样法

GB/T 5492　粮油检验　粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5494　粮油检验　粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5496　粮食、油料检验　黄粒米及裂纹粒检验法

GB/T 5497　粮食、油料检验　水分测定法

GB/T 5502　粮油检验　米类加工精度检验

GB/T 5503　粮油检验　碎米检验法

GB 7718　食品安全国家标准　预包装食品标签通则

GB 15063　复混肥料(复合肥料)

GB 15618—1995　土壤环境质量标准

GB/T 15683　大米　直链淀粉含量的测定

GB/T 17891　优质稻谷

GB/T 22294　粮油检验　大米胶稠度的测定

NY/T 496　肥料合理使用准则　通则

3　术语和定义

GB 1354 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

松江大米　Songjiang rice

松江大米是在国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准的保护范围内生产的水稻，经加工而成，符合本标准规定的大米。

4 产地范围

松江大米的产地范围限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准的范围。即为松江区的叶榭镇、泖港镇、石湖荡镇、新浜镇、小昆山镇、佘山镇的现辖行政区域。见附录 A。

5 地域环境特点

5.1 地理环境

松江区地处上海市西南部，位于黄浦江上游，太湖流域碟形洼地的底部，湖泊众多，水系发达，植被茂密，属亚热带北缘，东亚季风气候，四季分明，雨量充沛，光照充足，气候三要素光、温、水年际变化分布基本一致。

5.2 气候环境

5.2.1 气温

全年无霜期 282 天，年平均气温 15.5 ℃，最冷一月份平均气温 4.1 ℃，最热 7 月中旬到 8 月中旬，平均气温 28.2 ℃，全年 10 ℃以上有效积温 4 943 ℃。

5.2.2 降水与光照

年平均降水量 1 000 mm 以上，降水日数 137 d，日照时数 1 987 h。

5.3 土壤

土壤 pH 值在 6.4～6.9，土质呈弱酸性，土层深厚，富含有机质。

6 生产技术规范

应符合附录 B 的要求。

7 要求

7.1 选用品种

选用通过国家或上海市审定的、适宜在松江地区种植的、优良粳稻品种。代表品种有：松早香 1 号、秀水 114、秀水 134、秋优金丰等同类食味特色的粳稻品种。

7.2 感官要求

a) 米粒大小均匀，饱满清香，晶莹半透明；

b) 蒸煮时米饭柔软有弹性，食味清淡略甜，表面油光。

7.3 加工质量

加工质量应符合表 1 的规定。

表 1　加工质量

加工精度	黄粒米/% ≤	不完善粒/% ≤	杂质/% ≤			碎米/% ≤	
			总量	糠粉	矿物质	总量	小碎米
背沟有皮，粒面留皮不超过1/5的占80%以上	1.0	3.0	0.25	0.15	0.02	15.0	1.5

7.4　理化要求

理化指标应符合表 2 规定。

表 2　理化指标

项　目		要求
水分/%	≤	15.5
直链淀粉(干基)/%		9.0～19.0
胶稠度/mm	≥	70
垩白粒率/%	≤	50
蛋白质/%	≥	8.0

7.5　卫生指标

卫生要求应符合 GB 2715 的规定。

8　检验方法

8.1　感官指标

按 GB/T 5492 规定执行。

8.2　加工质量

8.2.1　加工精度

按 GB/T 5502 规定执行。

8.2.2　黄粒米

按 GB/T 5496 规定执行。

8.2.3　不完善粒

按 GB/T 5494 规定执行。

8.2.4　杂质

按 GB/T 5494 规定执行。

8.2.5 碎米

按 GB/T 5503 规定执行。

8.3 理化指标

8.3.1 水分

按 GB/T 5497 规定执行。

8.3.2 直链淀粉

按 GB/T 15683 规定执行。

8.3.3 胶稠度

按 GB/T 22294 规定执行。

8.3.4 垩白粒率

按 GB/T 17891 规定执行。

8.3.5 蛋白质

按 GB 5009.5 规定执行。

8.4 卫生指标

按 GB 2715 规定执行。

9 检验规则

9.1 组批、扦样

按 GB 5491 规定执行。

9.2 检验分类

9.2.1 出厂检验

9.2.1.1 每批产品出厂时，均应由企业的质量检验部门检验合格并签发合格证后，方可出厂和销售。

9.2.1.2 出厂检验项目包括感官要求、加工质量、垩白粒率、水分。

9.2.2 型式检验

9.2.2.1 正常生产时，每年进行一次，有下列情形之一时，应进行型式检验：

a) 品种、加工工艺、设备等有较大改变，可能影响产品质量时；

b) 国家质量监督管理部门，提出型式检验要求时。

9.2.2.2 型式检验的项目为 7.2、7.3、7.4、7.5 规定的技术内容。

9.3 判定规则

卫生指标有一项不合格，即判该批产品不合格。感官要求、加工质量、理化指标中有不符合规定等级的项目，可进行复检，复检仍不合格，则判该批产品为不合格。

10 标志、包装、运输与贮存

10.1 标志、标签

标签应符合 GB 7718 规定，获得批准的企业，可在其产品外包装上使用地理标志产品名称和专用标志。

10.2 包装

10.2.1 包装材料应符合国家食品包装卫生规定。

10.2.2 包装物应清洁、结实，并且牢固缝制或牢固密封。

10.3 运输

产品在运输过程中应禁止雨淋和日光曝晒，严禁与有毒腐蚀、有异味物品混运。

10.4 贮存

贮存场所应满足防雨、通风、干燥、清洁、阴凉、无阳光直射的要求，严禁与有毒、有害、有腐蚀性、有异味、易污染的物品混放。

10.5 保质期

符合 GB 1354 的规定。

附　录　A
（规范性附录）
松江大米地理标志产品保护范围图

图 A.1 界定了松江大米地理标志产品保护的区域范围。



图 A.1　松江大米地理标志产品保护范围

附 录 B
（规范性附录）
松江大米生产技术规范

B.1 产地选择

生产基地生态条件良好，具有可持续生产能力。

B.1.1 空气质量要求

本区域空气符合 GB 3095 规定。

B.1.2 灌溉水质量要求

应符合 GB 5084 的规定。

B.1.3 土壤质量要求

大田土壤环境质量符合 GB 15618—1995 规定中Ⅱ类二级标准要求。

B.2 栽培技术

B.2.1 播种期

常规稻早熟品种，5 月 1 日～10 日；常规晚熟品种 5 月 20 日～6 月 10 日；杂交稻品种 5 月 20 日～6 月 10 日。

B.2.2 播种量

常规稻每 666.7 m^2 播稻种 4.0 kg；杂交稻每 666.7 m^2 播稻种 2.0 kg。

B.2.3 基本苗

常规稻 7 万株/666.7 m^2～8 万株/666.7 m^2；杂交稻 4 万株/666.7 m^2～5 万株/666.7 m^2。

B.2.4 适宜有效穗数及高峰苗

常规稻有效穗数 24 万穗/666.7 m^2～26 万穗/666.7 m^2，高峰苗 35 万株/666.7 m^2～40 万株/666.7 m^2；杂交稻有效穗数 20 万穗/666.7 m^2～23 万穗/666.7 m^2，高峰苗 30 万株/666.7 m^2～35 万株/666.7 m^2。

B.2.5 水浆管理

前期浅水和干湿交替促分蘖；中期排水搁田控苗，之后间歇灌溉，剑叶抽出期建立水层，抽穗前轻搁田；后期间歇灌溉，养根、保叶、争粒重。

B.2.5.1 出苗—有效分蘖期

3 叶期前湿润灌溉，以干为主。其中，2 叶前尽量排干沟中水，2 叶后灌跑马水，保持田间湿润；3 叶期后至有效分蘖期浅水促分蘖，干湿交替。灌一次水后，待自然落干，维持 2 d 无水状态，以增加土壤的

通透性，切忌长期灌深水。

B.2.5.2 无效分蘖期—拔节孕穗期

当田间总茎蘖数达到穗数苗数的80%时，开始脱水轻搁田，由轻到重，分次搁成；搁田程度至田中不陷脚、田面不发白、不开裂，叶色落黄褪淡即可。搁田后对于已明显降苗，叶色褪淡，叶片挺直的田块应及时复水。再采用间歇灌溉方法，灌一次浅水，保持2 d～3 d水层，断水3 d～4 d，再灌一次浅水，如此反复，直至剑叶抽出期建立浅水层；抽穗前脱水2 d～3 d。

B.2.5.3 抽穗期—灌浆结实期

抽穗扬花期保持浅水层；灌浆结实期采取间歇灌溉，做到浅水潮潮清；成熟期防止断水过早，在收割前7 d～10 d断水。

B.2.6 肥料运筹

掌握“前促、中控、后补”的施肥原则，注重N、P_2O_5、K_2O养分的平衡施用。全生育期总用氮量18～20 kg/666.7 m^2；N、P_2O_5、K_2O配比1∶0.3～0.4∶0.3～0.5；前后期氮化肥配比7.5～8∶2.5～2；提倡使用有机肥和配方肥；肥料及使用应符合NY/T 496、GB 15063的规定。推广“三三制”秋播耕作制度，绿肥、深翻、二麦三年轮茬一次，推广秸秆全量还田，提高土壤中有机质含量，改善土壤团粒结构，增强水稻抗逆能力。

B.2.6.1 出苗—有效分蘖期

2叶1心期施断奶肥，亩施尿素5 kg；隔7 d，施第一次分蘖肥，每666.7 m^2施水稻专用配方肥20 kg或尿素10 kg～12 kg；再间隔7 d～10 d，追施第二次分蘖肥，每666.7 m^2施水稻专用配方肥15 kg或尿素8 kg～10 kg。

B.2.6.2 无效分蘖期—拔节孕穗期

根据品种及水稻长势长相，合理施用长粗肥。稻苗长势差的田块可适当补施复合肥5 kg～7 kg，“捉黄塘”促平衡生长。

穗肥，用量占全生育期总用氮量的20%～30%，折纯氮4 kg～6 kg。穗肥分促花肥和保花肥两次施用。促花肥于主茎第一节间定长，第二节间始伸，叶龄余数3.5叶时，每666.7 m^2施水稻专用配方肥5 kg加尿素5 kg，或施水稻专用配方肥15 kg/666.7 m^2；隔10 d，叶龄余数1.5叶～2叶期时施保花肥，施尿素5 kg/666.7 m^2～6 kg/666.7 m^2。

B.2.6.3 抽穗期—灌浆结实期

看苗补肥，对部分田块抽穗后叶色褪淡较快，缺肥严重，齐穗后每亩补施2 kg～3 kg尿素或根外追肥。

B.2.7 病虫草防治

坚持“预防为主，综合防治”的植保工作方针，推广综合防控和专业化统防统治。草害防除，以农业防治为基础，化学除草为重点，辅助人工拔草的除草原则；病虫防治，以农业防治为基础，根据病虫测报，科学合理选用高效、低毒农药，适时防控。

B.2.7.1 浸种消毒

常规品种亩用17%杀螟·乙蒜素可湿性粉剂（菌虫清）40 g，加10%吡虫啉可湿性粉剂10 g，杂交

品种另加6%杀螟丹水剂(盾清)12 mL,采用二次稀释法,先加少量水调成浆糊状,然后再加清水6 kg稀释,配成药液。将稻种浸入药液中搅拌均匀,以药液高出种子2 cm～3 cm为宜。日平均气温20 ℃以下浸种48 h～60 h,20 ℃以上浸种36 h～48 h。

B.2.7.2 播前除草

在大田最后一次划田平整后,灌足水层(以不露高墩为准),在杂草未出苗时封除杂草。药剂选用26%噁草酮乳油100 mL/666.7 m^2,趁泥水浑浊时甩滴全田,或用40%苄嘧磺隆·丙草胺可湿性粉剂60 g/666.7 m^2,或30%苄嘧磺隆·丙草胺可湿性粉剂80 g/666.7 m^2,对水30 kg～40 kg均匀喷施;施药后保持水层3 d～4 d再行机械插秧。

B.2.7.3 播后苗前除草

播种后2 d～3 d内,每666.7 m^2用40%苄嘧磺隆·丙草胺可湿性粉剂60 g或30%苄嘧磺隆·丙草胺可湿性粉剂80 g,对清水40 kg～45 kg,均匀喷雾。施药后3 d内田板保持湿润,并做好平水缺和纵横沟系配套工作,防止雨天积水引起药害;之后恢复正常管理。

B.2.7.4 出苗—有效分蘖期

B.2.7.4.1 防治对象

稻纵卷叶螟、白背飞虱、灰飞虱、螟虫,水稻条纹叶枯病、黑条矮缩病、稻田杂草。

B.2.7.4.2 防治措施

B.2.7.4.2.1 稻纵卷叶螟

可选用17%阿维·毒死蜱乳油100 mL/666.7 m^2或5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂16 g/666.7 m^2～20 g/666.7 m^2,或20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂10 mL/666.7 m^2～15 mL/666.7 m^2,对水30 kg～40 kg,均匀喷雾;施药适期为1～2龄幼虫高峰期;施药时,田间应保持薄水层。

B.2.7.4.2.2 螟虫

可选用17%阿维·毒死蜱乳油100 mL/666.7 m^2,或20%哒嗪硫磷乳油100 mL/666.7 m^2,或20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂10 mL/666.7 m^2～15 mL/666.7 m^2,或15%茚虫威乳油12 mL/666.7 m^2～15 mL/666.7 m^2;施药适期为1～2龄幼虫高峰期;施药时田间保持浅水层,有利于发挥药效。

B.2.7.4.2.3 白背飞虱、灰飞虱

可选用25%吡蚜酮可湿性粉剂20 g/666.7 m^2,或10%醚菊酯悬浮剂60 mL/666.7 m^2～80 mL/666.7 m^2,或25%噻嗪酮可湿性粉剂80 g/666.7 m^2～100 g/666.7 m^2;对水30 kg～40 kg,均匀喷雾;施药适期为低龄若虫发生高峰期;注意轮换用药,防止抗药性的产生。

B.2.7.4.2.4 水稻条纹叶枯病、黑条矮缩病

强调治虫防病,重点做好灰飞虱防治工作。防治灰飞虱措施同B.2.7.4.2.3的规定;同时要加强合理布局、连片种植,及清除田边杂草,压低虫源、毒源等农业防治措施的落实。对于已出现症状的田块,可选用2%宁南霉素水剂150 mL/666.7 m^2～250 mL/666.7 m^2,对水30 kg～40 kg,均匀喷雾;隔5 d再喷1次。同时,在防治基础上,结合肥料的使用可有效缓解症状的发展。

B.2.7.4.2.5 杂草防除

对于栽前未能及时化除的田块,在栽插后5 d～7 d,结合活棵返青肥施用,666.7 m^2用53%苄嘧·

苯噻酰可湿性粉剂 60 g/666.7 m^2，拌化肥或细泥均匀撒施，施药时田间浅水层，施药后保水 3 d～5 d，以提高化除效果。同时开好平水缺，以防雨水淹没秧心，造成药害。同时，在有效分蘖期，针对稻田杂草草相、草龄，正确选用药剂，适时进行杂草补除工作。具体补除方法如下：

对于以稗草为主的田块，在稗草 2 叶～5 叶期，选用 25%五氟磺草胺油悬浮剂 40 mL/666.7 m^2～80 mL/666.7 m^2，对水茎叶喷雾；施药前排干水，药后 1 d 复水，并保水 3 d～5 d；五氟磺草胺油悬浮剂对高龄稗草有特效，但对大豆较敏感，施药时避免药液飘移。

对于以千金子为主的田块，在千金子 2 叶～4 叶期，选用 10%氰氟草酯乳油 50 mL/666.7 m^2，对水茎叶喷雾；施药前排干水，药后 1 d 复水，并保水 3 d～5 d。

对于以莎草和阔叶杂草为主的田块，在播后 25 d～30 d，选用 10%吡嘧磺隆可湿性粉剂 20 g/666.7 m^2，对水茎叶喷雾；施药前排干水，药后 1 d 复水，并保水 3 d～5 d。

对于以高龄莎草和阔叶杂草为主的田块，可选用 48%苯达松水剂 75 mL/666.7 m^2～100 mL/666.7 m^2，加 20%二甲四氯水剂 100 mL/666.7 m^2 混用，对水茎叶喷雾；施药前排干水，药后 1 d 复水，并保水 3 d～5 d。

B.2.7.5 无效分蘖期—拔节孕穗期

B.2.7.5.1 防治对象

稻纵卷叶螟、褐飞虱、螟虫、纹枯病。

B.2.7.5.2 防治措施

B.2.7.5.2.1 稻纵卷叶螟

同 B.2.7.4.2.1 的规定，注意药剂的交替使用。

B.2.7.5.2.2 褐飞虱

同 B.2.7.4.2.3 白背飞虱、灰飞虱防治措施的规定，注意轮换用药，防止抗药性的产生。

B.2.7.5.2.3 螟虫

同 B.2.7.4.2.2 的规定，注意药剂的交替使用。

B.2.7.5.2.4 纹枯病

可选用 15%井冈霉素 A 可溶性粉剂 35 g/666.7 m^2～50 g/666.7 m^2，或 11%井冈·已唑醇可湿性粉剂 40 g/666.7 m^2～60 g/666.7 m^2，或 10%井冈·蜡芽菌悬浮剂 100 mL/666.7 m^2～150 mL/666.7 m^2，或 23%噻呋酰胺悬浮剂 20 mL/666.7 m^2；施药适期为水稻封行至孕穗期；在纹枯病大流行前(病株率 5%)第一次施药，隔 7 d～10 d 再施药一次；重病田在齐穗后，再补防一次，注意药剂的交替使用。

B.2.7.6 抽穗期—灌浆结实期

B.2.7.6.1 防治对象

稻纵卷叶螟、二化螟、褐飞虱、三化螟、纹枯病、稻曲病、穗颈瘟。

B.2.7.6.2 防治措施

需防治 2 次，在水稻破口前的 5 d～7 d 和始穗期各防治一次。防治稻曲病和穗颈瘟，可选用药剂 43%戊唑醇悬浮剂 12 mL/666.7 m^2～15 mL/666.7 m^2，加 20%井冈·三环唑可湿性粉剂 100 g，对水

60 kg 均匀喷雾，可兼治胡麻叶斑病；防治纹枯病和虫害药剂的选用和方法同 B.2.7.5.2 条的规定，注意药剂交替使用；防治时可与稻曲病和穗颈瘟防治药剂混合使用。

B.3 适时收获

9 月上旬～11 月下旬，分品种收割。

B.4 加工

原粮→初清→精选→砻谷→碾米→分级→色选→抛光→成品。