ICS 67.060
CCS B 22

DB5117

四 川 省 （ 达 州 市 ） 地 方 标 准

DB 5117/T 22-2020

地理标志产品 米城大米

Product of geographical indication——Micheng rice

2020-11-25 发布　　2020 -11-25 实施

达州市市场监督管理局 发 布

前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由达州市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：达州市达川区农业农村局、达州市达川区种子管理站、达州市达川区农业技术推广站、达州市达川区植保植检站、四川腾华鑫农业科技有限公司。

本文件主要起草人：方传茂、王仁贵、何国清、赵其江、孙洋、刘波。

地理标志产品 米城大米

1 范围

本文件规定了地理标志产品米城大米的产地环境条件、基地建设、品种选择、耕作要求、播种育秧、大田管理、病虫害防治、稻谷收获贮藏、产品质量要求、标志、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于地理标志产品保护范围内地理标志产品米城大米的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2715 食品安全国家标准 粮食

GB/T 5490 粮食检验 一般规则

GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5494 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5502 粮油检验 米类加工精度检验

GB/T 5503 粮油检验 碎米检验法

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8321 农药合理使用准则

GB 14881 食品安全国家标准 食品企业通用卫生规范

GB/T 15683 大米 直链淀粉含量的测定

GB/T 17109 粮食销售包装

GB/T 17924 地理标志产品标准通用要求

GB/T 22294 粮油检验 大米胶稠度的测定

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第78号《地理标志产品保护规定》

国家质量监督检验检疫总局〔2010〕第112号公告《关于批准对江口醇酒、青川天麻、米城大米、富顺香辣酱、炉霍雪域俄色茶实施地理标志产品保护的公告》

3 术语与定义

GB/T 17924界定的术语和定义适用于本文件。

4 地理标志产品保护产地范围

米城大米地理标志产品保护产地范围为四川省达县米城乡、赵固乡、大堰乡、檬双乡、堡子镇、龙滩乡、金石乡、安云乡、碑庙镇、青宁乡、梓桐乡、北山乡、江陵镇等13个现辖行政区域。见附录A。

5 产地环境条件

5.1 环境要求

5.1.1 海拔条件

米城大米水稻适宜光热资源丰富、昼夜温差大、散射光较多、相对湿度适宜且海拔高度在500m～1000m深丘、中高山区域种植。

5.1.2 温度

5.1.2.1 稻谷每个生长期的温度

米城大米水稻苗期适温15℃～28℃；分蘖期适温28℃～30℃；幼穗分化期24℃-28℃；灌浆期适温22℃～30℃。

5.1.2.2 育秧

育秧温度要求10℃以上，12℃时发芽较快。采用增温育秧,以旱地育秧为主。小中苗秧移栽的667㎡备苗床面积20㎡～25㎡，大苗秧移栽的667㎡备苗床面积30㎡～40㎡；以壤土为好；做好培肥、调酸、消毒、浇水、化控等环节。加强秧苗管理，出苗前注意保温、保湿，出苗后应重点防治“立枯病”，使育出的秧苗矮健、嫩绿。

5.1.3 光照

水稻喜光，对光照敏感性较强，阳光充足，生长旺盛，籽粒饱满产量高；光照不足，籽粒不饱满产量低；漫射光，有助于秧苗生长及稻谷籽粒饱满，品质好。合理密植，充分利用光能。

5.1.4 土壤

紫色水稻土，质地以壤土为主，土壤PH值6.3～7.5，土壤有机质含量≥1.0%，土壤中全氮含量1g/kg左右。

5.1.5 微风

1～3级风能促进水稻生长发育，减少病虫害。

5.1.6 营养元素

5.1.6.1 施肥原则

应符合NY/T 496的规定。提倡测土配方施肥，控氮稳磷增钾，配合施用。

5.1.6.2 施肥量

氮、磷、钾之比为2：1：2，一般667㎡施纯氮10Kg～12Kg，五氧化二磷5Kg～6Kg，氧化钾10Kg～12Kg，有机肥1000Kg～1500Kg。

5.1.6.3 施肥方法

应采用底肥、分蘖肥、穗粒肥相结合的方法。全部有机肥、磷肥、50%氮肥、50%钾肥混匀撒施后耙田,2～3天后栽秧。30%氮肥在秧苗返青后作分蘖肥施入，余下的氮肥和钾肥作穗、粒肥施入。

5.2 生产基地条件

5.2.1 灌溉水要求

灌溉水质量指标应符合表1的要求。

表 1 灌溉水质量指标

项 目	指 标
PH值	5.5～8.5
氯化物(以CI^-计) mg/L	≤350
氟化物(F^-计) mg/L	≤2.0
氰化物 mg/L	≤0.5
硫化物 mg/L	≤1.0

表 1（续）

项 目	指 标
总汞(以 Hg 计) mg/L	≤0.001
总镉(以 Cd 计) mg/L	≤0.005
总砷(以 As 计) mg/L	≤0.05
铬(六价) mg/L	≤0.1
总铅(以 Pb 计) mg/L	≤0.1
总铜(以 Cu 计) mg/L	≤1.00
化学需氧量 mg/L	≤200

5.2.2 空气质量要求

空气质量指标应符合表2要求。

表2 空气质量指标

项目	日平均浓度	1 小时平均浓度
总悬浮颗粒物(TSP)(标准状态) mg/m^3	≤0.30	—
二氧化氮(NO_2)(标准状态) mg/m^3	≤0.12	≤0.24
二氧化硫(SO_2)(标准状态) mg/m^3	≤0.15	≤0.50
氟化物(F)(标准状态) $ug/(dm^2.d)$	≤0.50	—
ug/m^3	≤7	≤20
铅(Pb)(标准状态) ug/m^3	≤1.50	—

注: 标准状态:指温度为273.15K，压力为101.325KPa的状态。

5.2.3 土壤环境质量要求

土壤环境质量指标应符合表 3 的要求。

表 3 土壤环境质量指标

项 目	指 标
PH 值	6.3～7.5
有机质含量 %	≥1.0
镉 mg/kg	≤0.30

表 3 续

汞 mg/kg	≤0.50
砷 mg/kg	≤25
铜 mg/kg	≤100
铅 mg/kg	≤80
铬 mg/kg	≤300
六六六 mg/kg	≤0.10
滴滴涕 mg/kg	≤0.10

6 基地建设

选择生态环境优良、水源充足、土壤有机质含量高、沟渠配套、排灌方便集中连片的稻田。

7 品种选择

选择适宜本区域种植、抗性强、丰产性好、米质达国颁二级以上的籼型优质稻。

8 耕作要求

以一年一季（稻—冬水田或稻—油两熟）为主,稻田耕作层 30cm 以上。

9 播种育秧

9.1 秧田选择与基肥施用

育秧方式：旱育秧或润湿育秧。

留足秧田：秧田与本田比例 1∶8（机插穴盘育秧 1:80）。

基肥施用：每 667 ㎡施用腐熟的猪牛粪 1000kg 加 45%三元复合肥 20Kg～25kg 作基肥。

9.2 种子处理

播种前晒种，药剂消毒浸种。

9.3 播种育秧期与播种量

应按品种生育特性确定适宜的播种期和播种量。

旱育秧时间一般在 3 月 15 日左右，667 ㎡本田用种量 0.75 kg～1.0kg，秧龄期 30～35 天。

9.4 秧田管理

9.4.1 管水

旱育秧浇透底水；润湿育秧在秧苗一叶一心后浅水上厢。

9.4.2 施肥

秧苗三叶一心，667 ㎡施用腐熟的人畜清粪水 50kg 加尿素 8kg。

9.4.3 防病除草

三叶后防病（立枯病）、除草。

10 本田管理

10.1 翻耕整地、施足基肥

本田翻耕整地：翻耕深度为整个耕作层 15cm，耕耙 2 次，田面平整。

基肥使用：每 667 ㎡施用腐熟的猪牛粪 1000kg 加硅肥 25kg、45%三元复合肥 30kg～35kg。

10.2 移栽

带药移栽：栽秧前 3～5 天用三环唑等药剂喷施预防稻瘟病。

移栽规格：冬水（闲）田 3～5 叶小中苗等行栽植，采取 30cm×15cm 等行单株或 30cm×20cm 等行双株两种规格栽插，4 月底前移栽结束；种植小麦、油菜的小春田一律实行（30+23）×20cm 宽窄行或 30×20cm 等行双株栽植，在 5 月 25 日前栽插结束。

基本苗：667 ㎡植株数≥1.2 万。

10.3 管水

移栽后 5 天内灌水 2cm～3cm 返青；5 天后浅水分蘖，提早晒田（苗数达到计划穗数的 80%左右），晒至厢面起鸡爪裂，控制无效分蘖，幼穗分化期灌好养胎水；灌浆期以湿润为主、干湿壮籽。

10.4 追肥

10.4.1 移栽后追肥

移栽后 5～7 天，每 667 ㎡追施尿素 5kg、硫酸钾 5kg 或氯化钾 3kg～4kg。

10.4.2 孕穗期追肥

每 667 ㎡追施磷钾肥 3 Kg～5Kg。

10.5 综合防治病虫草鼠害

10.5.1 害虫防治

10.5.1.1 农业防治

灌水灭虫蛹，清明前灌水 5cm～7cm，保持 5～7 天。

健身栽培，增强抗虫能力。

10.5.1.2 物理防治

安装太阳能频振式杀虫灯、性引诱剂、色板等诱杀螟虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟等害虫。

10.5.1.3 生物防治

推广稻田养鸭（鱼）、释放赤眼蜂等生物治虫措施。保护利用稻田青蛙、蜘蛛等天敌资源。

10.5.1.4 化学防治

在准确测报的基础上，科学合理用药防治。

在二化螟、稻纵卷叶螟等卵孵高峰期，选用苏云金杆菌、氯虫苯甲酰胺等药剂防治；在稻飞虱低龄若虫高峰期，选用噻虫嗪、呋虫胺等药剂交替使用防治，遵守农药使用安全间隔期。

10.5.2 病害防治

10.5.2.1 稻瘟病

在分蘖期，叶瘟发生初期选用春雷霉素、稻瘟灵、三环唑等药剂防治；在水稻破口初期，选用三环唑等药剂预防穗穗茎瘟瘟。

10.5.2.2 纹枯病

在分蘖末期至拔节孕穗期选用井岗霉素、井岗枯芽菌等药剂防治。

10.5.2.3 稻曲病

在水稻破口前 5～7 天，选用戊唑醇、井岗枯芽菌等药剂防治。

10.5.3 杂草防治

10.5.3.1 生物除草

推行稻鸭（鱼）等生物除草措施。

10.5.3.2 化学除草

移栽后 5～7 天，选用对应药剂科学防除。

有机合成药剂的使用按 GB 8321 的规定执行。

10.5.4 鼠害防治

推行生物天敌、人工防鼠措施。

11 稻谷收获、贮藏

11.1 收获

全田稻谷成熟后，及时抢晴人工收割、田间晒穗、人工脱粒，竹筐运输、竹垫翻晒。

11.2 贮藏

晒干扬净的稻谷，麻袋包装，木仓贮藏。

布放鼠夹、粘鼠板等防治鼠害。

11.3 稻谷加工流程

稻谷—筛选—去石—磁选—砻谷—谷糙分离—碾米—成品包装。

12 生产加工过程中的卫生要求

生产过程应符合 GB 14881 的规定。

13 产品质量要求

13.1 感官指标

大米油亮光泽，米饭滋和糯实，有较浓的清香和甜味。

13.2 理化指标

碎米总量≤25%、出糙米率≥75%、精米率≥70%、整精米率≥52%、胶稠度≥55mm、直链淀粉≤25%、糊化温度（碱消值/级）≥4。

13.3 安全指标

应符合 GB 2715 的规定。

14 净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]年第 75 号令的规定。

15 试验方法

15.1 感官检验

按 GB/T 5492 的规定执行。

15.2 理化指标检验

15.2.1 碎米

按 GB/T 5503 的规定执行。

15.2.2 加工精度

按 GB/T 5502 的规定执行。

15.2.3 直链淀粉含量

按 GB/T 15683 的规定执行。

15.2.4 杂质、不完善粒

按 GB/T 5494 的规定执行。

15.2.5 胶稠度

按 GB/T 22294 的规定执行。

15.2.6 净含量检验

按 JJF 1070 的规定执行。

16 检验规则

16.1 扦样、分样

按GB/T 5491 的规定执行。

16.2 检验的一般规则

按GB/T 5490 的规定执行。

16.3 组批

同原料、同工艺、同设备、同班次加工的产品为一批。

16.4 出厂检验

每批产品均应做出厂检验，经过检验合格签发合格证后方可出厂。出厂检验项目包括感官指标、水分、加工精度、杂质、不完善粒、碎米。

17.5 型式检验

型式检验项目按本文件13 的全部项目进行。有下列情况之一时，应对产品进行型式检验：

a) 正常生产时，每年进行一次；

b) 新产品投产时；

c) 原料、工艺、设备等有较大改变，可能影响产品质量时；

d) 停产3 个月以上，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验的结果有较大差异时；

f) 国家法定质量监督机构提出型式检验要求时。

17.6 判定规则

不符合GB 2715 以及国家卫生检验有关规定的产品，判为非食用产品。

18 标志、标签、包装、运输、贮存和保质期

18.1 标志

应符合原国家质量监督检验检疫总局〔2010〕第 112 号公告《关于批准对江口醇酒、青川天麻、米城大米、富顺香辣酱、炉霍雪域俄色茶实施地理标志产品保护的公告》和原国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第 78 号《地理标志产品保护规定》的规定。

18.2 标签

标签内容应符合GB 7718、GB 28050 的规定。

18.3 包装

18.3.1 包装应符合GB/T 17109 的规定和卫生要求。

18.3.2 包装容器应坚固结实，封口或者缝口应严密。

18.4 运输

应使用符合卫生要求的运输工具和容器运送，运输过程中应注意防止雨淋和被污染。

18.5 贮存

产品应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的合格仓库内，不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存。

18.6 保质期

按本文件规定的包装、运输和贮存条件下，保质期不应低于 3 个月。

附 录 A
（规范性）
米城大米地理标志产品产地保护范围

A.1 米城大米地理标志产品产地保护范围见图A.1。



图 A.1 米城大米地理标志产品产地保护范围