
国务院妇女儿童工作委员会办公室
联合国儿童基金会

合作项目

儿童友好家园
Child-Friendly Space



儿童友好家园家庭教育系列读本

孕妇及0—2岁婴儿家长读本

主编：王玉

NWCCW
国务院妇女儿童
工作委员会办公室

unicef
联合国儿童基金会



前言

儿童友好家园是2008年5月12日汶川地震后，由国务院妇儿工委办公室和联合国儿童基金会联合在地震灾区创建的，以社区为依托，以保护儿童权利和促进儿童发展为宗旨，向儿童提供游戏、娱乐、教育、卫生保健和社会心理支持等一体化服务的体系。所有的18周岁以下的儿童、儿童的父母及其他照看人、教师及其他需要帮助的社区成员都可以参加儿童友好家园的活动。同时所有的社区成员都是儿童友好家园的主人和宝贵资源，他们有权接受家园的服务并以有效方式参与家园的组织和服务工作。

儿童友好家园,不仅努力为不同年龄的孩子创设适合他们的丰富多样的游戏、阅读、体育、小组活动，也提倡儿童作为志愿者，协助工作人员或和工作人员一起组织和开展活动。儿童友好家园不仅希望为广大的家长提供和孩子一起学习、一起成长的机会，也希望能够借助家园这个平台，为家长提供有关孩子发展、卫生保健、教育的培训和指导。因为家庭教育是孩子接受的最早的教育，也是影响孩子一生发展的教育，因为家长在教育中还存在很多的问题和困惑。

为了帮助广大家长提高教育水平，并最终促进孩子的全面、健康发展，为了解决家长在教育中遇到的问题，中华女子学院儿童发展与教育学院受国务院妇女儿童工作委员会办公室和联合国儿童基金会的委托，在对项目试点地区广大家长进行调研的基础上，编写了面向农村家长的家长读本。

根据孩子的年龄和家长的教育需求，家长读本分为四册，即《孕妇及0—2岁婴儿家长读本》（王玉编写）、《2—6岁儿童家长读本》（余珍有编写）、《6—12岁儿童家长读本》（焦健编写）、《12—18岁儿童家长读本》（夏菡编写）。希望能就家长在教育中遇到的问题、需要特别关注的问题和容易忽视的问题给予家长一定的帮助。需要特别注意的是，家庭教育有很大的差异性，每个家庭、每个家长、每个孩子的情况都是不同的，遇到的问题也各不相同。希望家长在教育孩子中，能根据自己家庭和孩子的情况，灵活地运用读本。相信在所有家庭成员的共同努力下，能够解决他们所遇到的问题。

读本的编写和印制，得到了国务院妇女儿童工作委员会办公室、联合国儿童基金会、儿童友好家园专家团队、儿童友好家园工作人员、四川安县、江油儿童友好家园家长和孩子们的大力支持，在此一并致以衷心的感谢。

由于水平有限，读本中难免会有缺点、错误存在，恳请广大读者批评指正。

编写者

2011年

目录

一、孕产期妈妈和胎儿的保健 1

（一）决定生孩子前需要做什么准备 2

多大年龄生孩子最好 2

夫妻双方的身体要健康 2

（二）怀孕期间怎样保养身体 2

怎样知道自己怀孕了 2

怀孕期间要做哪些检查 3

孕妇在日常生活中要注意什么 4

只要多吃就可以保证营养吗 4

孕妇可以吃药吗 5

孕期是不是要停止性生活 5

做个快乐的孕妈妈 5

（三）生孩子前要注意什么 6

学会推算预产期 6

会识别分娩前的症状 6

孕妇临产的“五不要” 7

生孩子前需要做好的物质准备 7

在医院生孩子最安全 7

二、0—2岁宝宝的日常护理与教育 8

（一）新生儿 9

1、了解我们的孩子 9

宝宝体重增长快 9

宝宝一出生就有多种感觉能力 9

宝宝天生就有运动能力 10

哭也是宝宝的交流方式 10

2、帮助我们的孩子 11

精心护理宝宝的小肚脐 11

要让孩子有充足的睡觉时间 11

怎样给宝宝喂奶 12

学会给宝宝洗澡 13

怎么选择和清洗宝宝的尿布、衣服 13

为宝宝按摩的好处非常多 13
要按时给宝宝打预防针 14

（二）1个月—1岁的宝宝 15

1、了解我们的孩子 15
运动能力发展迅速 15
小手越来越灵活 15
咿呀学语 16
“认生”说明宝宝长本事了 16

2、帮助我们的孩子 17
除了吃奶，宝宝还能吃什么 17
给宝宝添加食物要注意一些问题 17
宝宝按时睡觉很重要 19
多带宝宝到户外玩 19
虽然宝宝不会说，也要多“聊天” 19
会玩的孩子更聪明 20
带宝宝去儿童友好家园玩耍 21
对宝宝的大小便训练不能过早 21

（三）1—2岁的宝宝 22

1、了解我们的孩子 22
孩子特别喜欢走路 22
孩子有自己的主意了 23
孩子的语言需要“翻译” 23
喜欢堆一堆、摆一摆 23
能把不同的东西分开 24

2、帮助我们的孩子 24
不要急着给孩子断奶 24
避免孩子挑食和偏食 24
自己吃，饭更香 25
让宝宝养成独立大小便的习惯 26
一定要多和孩子说话 26
和宝宝一起玩的好处很多 26
时时刻刻关注孩子的安全 27

一、孕产期妈妈和胎儿的保健



怀孕对于每个女人来说都是人生中的一件大事。随着宝宝在妈妈的肚子里一天天长大，妈妈的幸福感会渐渐增加，而与此同时，女性的身体也会发生一些变化，也就是说，怀孕让妇女进入了人生中的一个特殊时期。

每个女性肯定都非常关心，怀孕时要怎样做才能确保母子健康平安。

那么，你知道吗：

在多大年龄怀孕最好?

妇女怀孕后身体会发生哪些变化?

胎儿在母亲的肚子中是怎样生长发育的?

在日常生活中，孕妇应特别注意哪些事情?

核心信息

- 最好的生育年龄是25–30岁之间。
- 怀孕期间女性的生理、心理状况与怀孕前大不一样，要注意孕期的生活调整和保养。
- 孕妇及其家人要学会识别即将分娩的迹象，认真做好分娩前的精神和物质准备。
- 生孩子后，产妇的饮食调养很重要，愉快的心情也必不可少。

（一）决定生孩子前需要做什么准备

多大年龄生孩子最好



一般来说，女性最好的生育年龄是在25-30岁之间。因为在这个年龄，妇女身体发育已经完全成熟，具备最良好的生育能力，妊娠并发症少，分娩也顺利。同时，丰富的生活经验，充沛的精力都有助于养育子女，最符合“优生优育”的基本原则。

夫妻双方的身体要健康

要生一个健康、聪明的小宝宝，一个重要的前提条件是夫妻两人都要身体健康。



首先，夫妻双方在准备要宝宝时最好能够进行一次健康检查，在确认双方，特别是女方身体健康后再怀孕。如果身体有病，要及时进行治疗、调养，即使是对于一些不能治好的疾病，如心脏病、高血压、肾脏疾病、糖尿病等，也应该把身体调整到适合怀孕的状态，在医生的指导下怀孕。

其次，怀孕前夫妻双方不要饮用有强烈刺激性食物，尤其应该禁酒、戒烟。行为方面应避免过分剧烈的运动方式。

再次，尽量避免接触有毒有害物质，比如农药、杀虫剂等。



最后，要有健康的生活方式。生活要规律，保证充足的睡眠，饮食要有营养。

（二）怀孕期间怎样保养身体

怎样知道自己怀孕了


及早发现是否怀孕是非常重要的，因为，怀孕的头3个月是胎儿的大脑、四肢、内脏以及手指、脚趾、五官等一些主要的器官开始形成的时期，而且，胎儿在这时还相当脆弱，及早发现怀孕了，就可以采取及时有效的措施保护自己、保护胎儿。

有三种方式可以帮助我们判断是否已经怀孕：

一是，根据自己身体的变化判断怀孕。怀孕以后，妇女的身体会出现一些反应，如月经停止，恶心，不喜欢吃油腻的食物，尿多，犯困、没劲，乳房胀痛等，如果出现这些症状，妇女就可以初步判断自己已经怀孕了。

二是，用早孕试纸自己检测是否怀孕。到市场上买早孕妊娠试纸或者试剂，按照使用说明操作，如果表现为阳性就证明可能已经怀孕。

三是，在出现有怀孕迹象之后，到医院妇产科接受检查，确定是否怀孕。这是最可靠的方法，也是确定怀孕最重要的方式。在医院检查确定怀孕后，就要采取措施保护自己、保护小生命了。



怀孕期间要做哪些检查

怀孕后，应该去医院接受以下检查：

产前初诊。在确定怀孕之后，要在怀孕第12个周时进行一次产前初诊，这次检查是对孕妇的全身情况、产科情况进行的全面检查。

产前随诊。产前随诊是定期的产前检查。一般在怀孕4~6个月期间，每个月检查一次；在怀孕7~8个月时，每半个月检查一次；怀孕9个月以后，每周检查一次。另外，在怀孕期间遇到一些特殊的情况，应该随时到医院检查。

每次产前随诊，检查的内容不太一样，胎儿的大小、胎位、胎心的变化、胎动等是必检的项目。产科情况、孕妇的血压、体重也是重点检查项目。

小·知识

胎儿是怎么在妈妈肚子里生长的

宝宝的生命从肉眼无法看见的精子和卵子结合的受精卵开始，受精卵从0.2毫米左右开始发育，在受精后7–11天左右到达子宫着床，然后逐渐长大。

孕早期胎儿的生长发育。在怀孕两个月时，胚胎体积只有20毫米，大概和一粒花生米差不多大，但是胎儿的一些主要器官，如大脑、眼睛、脊柱、肝脏、手臂和腿都已经开始了发育，心脏也开始了跳动。也就是说，胎儿虽然很小，但是，已经具备了一个人的基本形态和构造。


第1个月


第2个月


第3个月

孕中期胎儿的生长发育。孕中期是从13~24周（4–6个月），这个阶段胎儿的所有器官都已形成，现在只是增大，这个时期是胎儿生长发育较快的时期。胎儿5个月大时孕妇能明显感觉到胎动。


第4个月


第5个月


第6个月

孕晚期胎儿的生长发育。孕晚期，也就是25~40周（7~10个月），胎儿生长得特别快，胎儿的体重有一半都是这个阶段增加的，而且，此时也是胎儿大脑细胞繁殖旺盛的时期。胎儿的肺发育完善，为出生后的呼吸作好了准备。28周~31周，胎儿的神经系统进一步完善，肺及其他内脏已经基本发育完成，这个时期出生的早产儿，如果在暖箱里精心照料，已经能够存活。


第7个月


第8个月


第9个月

孕妇在日常生活中要注意什么

妇女怀孕后，随着孩子的发育，身体会发生一系列的变化。比如，皮肤上出现妊娠斑、妊娠纹，乳房增大、胀痛，腹胀或便秘，尿频，腰酸、腰痛等等。女性对于自身的这些身心变化要有足够的精神准备，别把正常的变化当作疾病。同时，孕妇要在生活方式上做出改变，以适应这种变化。



首先，穿衣服要宽松。随着怀孕时间的增加，孕妇的体形也在逐渐发生变化，腹部隆起，胸部增大，因此孕妇要穿宽松、简单的衣服，穿平底舒适的鞋子，胸罩也要根据乳房的大小调整尺寸，防止胸罩太紧限制乳房的增大。

其次，生活要有规律。吃饭、睡觉、运动都要有规律。要注意保证充足的睡眠，孕妇通常需要比平常更多的睡眠时间，保障更好的睡眠质量。良好的睡眠不仅有利于孕妇体力的恢复，还有助于胎儿的生长发育。适当的运动能缓解身体的不适，但是不要太累，更不要干重活。当身体感觉累时，要注意休息。不要长时间看电视。



再次，不要接触刺激性的化学药品。大量接触农药及刺激性强的化学药品，可能会导致胎儿发育畸形。在夏季，孕妇更不要接触和喷施农药、杀虫剂，以免中毒，从而危及母体及胎儿健康。

只要多吃就可以保证营养吗

老话说怀孕期间是：“一人吃，两人补”，所以，很多妇女在得知自己怀孕以后，就开始加大饭量，以此来满足胎儿的营养需要。其实，胎儿的营养是否足够，并不完全在于妈妈吃的多少，关键还是要科学地选择食物，注意营养的合理搭配。否则，妈妈太贪吃，营养过剩，很容易变得很胖，反而会引起一些产科合并症。

在怀孕期间，不同的阶段要适当地补充营养，注意营养均衡：

孕早期营养：怀孕的头三个月，吃的东西要以清淡、容易消化为主。在怀孕早期要注意补充叶酸，因为叶酸关系到胎儿的神经系统发育。维生素的补充要充足，要多吃水果、蔬菜、豆类、干果等富含维生素的食物。孕妇还要适当地吃一些奶类、蛋类、豆类和硬果类的食物，以补充身体所需要的蛋白质。

孕中期营养：怀孕4--6个月期间，饮食要避免挑食、偏食，荤素搭配，粗细粮搭配，食物的品种要多样化；不要吃太多油炸、油腻的食物和甜食。要注意补充含铁丰富的食物，以预防缺铁性贫血，含铁丰富的食物有：肝脏、肾脏、心脏、胃肠和海带、紫菜、黄豆、菠菜、枣等。孕妇对钙的吸收也有所增加，要多吃含钙多的食物，比如，虾皮、骨头汤、牛奶、虾、海带、芝麻等都是富含钙的食物。



孕晚期营养：怀孕7个月到孩子出生前，要少吃多餐，饿了就吃点东西；食物要以清淡为主，不要吃太多盐、油和糖；多吃新鲜的蔬菜和水果；少吃零食和方便食品；少吃腌菜和熏制的食品；不要喝碳酸饮料和可乐等刺激性的饮料；适量吃一些动物肝脏，多喝牛奶和奶制品。

孕妇可以吃药吗

在怀孕期间有可能生病，比如感冒、贫血等，有时需要吃药治疗。但是，孕妇服用的药物会经过胎盘进入胎儿的血循环，特别是在怀孕10周以内，是胎儿大脑、四肢、内脏等各种器官形成的时期，这时的胚胎对有害因素特别敏感，假如孕妇吃的是对胎儿不利的药，那么胎儿很容易受到药物的影响而导致发育畸形。

温馨提示

孕妇用药应该注意：

- 怀孕期间要少用或不用药；
- 服用任何药物必须根据医生的指导服用；
- 如果因为病情需要必须服用某种药物，而这种药物肯定是对胎儿的发育不利的，那就应该选择中止怀孕，实施流产。

孕期是不是要停止性生活

孕期性生活不必完全避免，但是性生活要适度。在怀孕早期，胚胎和胎盘正处在形成时期，胚胎着床还不稳定，性活动的刺激容易导致流产或者其他隐患，因此，怀孕早期的性生活应该尽量避免。到了怀孕中期，由于胎盘全部形成，胎儿处于相对稳定的时期，恢复正常性生活是完全可以的。在妊娠晚期，临近分娩，也不要进行性生活。

在怀孕期间进行性生活要有所节制，动作要轻柔，不要幅度过大，适度降低性生活的频率，并要注意不要过分压迫女方的腹部。否则，容易引起胎膜早破，发生早产，可能会造成不良的后果。

做个快乐的孕妈妈

孕妈妈保持愉快的情绪，不仅可以促进自己的身体健康，而且会使血液中分泌有利于健康发育的化学物质，促进胎儿的正常发育，生下的孩子就会更加健康、聪明。

如果妈妈长期处于紧张、焦虑、恐惧、忧郁、悲伤之中，妈妈不好的情绪会通过血液传递给胎儿，影响胎儿的正常发育，严重时还会造成胎儿畸形、早产等。比如，如果妈妈的情绪过度紧张，就有可能妨碍胎儿上颌的发育而造成腭裂（俗称“兔唇”）的可能。此外，妈妈的情绪不好，可能会影响食欲，造成营养不良，也会造成胎儿的体质下降。

要使肚子里的宝宝健康发育，孕妇必须保持精神充沛、心情开朗，要注意调节自己的情绪，保持心理的最佳状态。

怀孕后，伴随着身体的一些不适反应，妇女的情绪状态也会变得不稳定，主要表现为易怒、喜怒无常、焦虑、哭泣等等，因此，家人特别是丈夫在生活上要更加细致地照顾妻子，尽量多花些时间陪妻子，家人的体贴和关心能够让孕妇更加积极地去应对早孕带来的身体和心理上的不适。

此外，适当的参加一些活动，多与其他孕妈妈交流，也可以调整情绪。孕妇可以到儿童友好家园参加家园为孕妈妈组织的活动，与其他孕妈妈一起聊聊天，交流怀孕体验。看着儿童友好家园中游戏的小孩子生龙活虎的样子，也会令孕妈妈觉得开心。自己在怀孕中遇到的问题和困惑，也可以向家园的工作人员咨询，从而解除自己心中的疑虑。

（三）生孩子前要注意什么

学会推算预产期

一般来说，妇女的怀孕期平均是满40周，共280天，所以，怀孕满40周的那一天就是预产期。

事实上，孕妇的预产期虽然有预计日期，但对于每个具体的孕妇来说，由于种种原因，生产的日期往往会有所变动，有的孕妇的生产日期会提前，而有的孕妇的生产日期会推后。



小·知识

推算预产期的公式

主要是根据末次月经的月份和日期来推算。从末次月经第一天算起，在末次月经的月份上加9或者减3，为预产的月份，在末次月经的第一天上加7，所得的日子就是预产的日子。例如，末次月经是1月1日，预产期就是1+9=10月，1+7=8日，也就是10月8日。

如果末次月经记的是农历，最好把它换算成阳历，再按照上面的公式计算。

会识别分娩前的症状



如果出现以下症状，就说明孩子很快就要出生了，要尽快去医院：

规则性阵痛。当出现每10分钟一次的阵痛，或者一个小时出现6小时以上的阵痛时，孕妇就要随时准备去医院了；

破水。发生破水时，要抬高腰位，躺下休息，保持安静，并尽早到医院。如果破水后乱动的话，可能会造成脐带脱落，造成胎儿危险，尤其是胎位不正时，要更加小心；

突然出血，要赶紧去医院急诊。

孕妇临产的“五不要”

下面几个因素对生孩子有不利影响，因此，孕妇要注意避免：

① **不要怕**。有些孕妇由于对生孩子缺乏了解，对生产有恐惧感。

② **不要忧**。有些孕妇由于生活上遇到了困难，或者发生了意外的事件，临产前精神不振，忧虑苦闷。

③ **不要急**。有些孕妇还没到预产期就焦急地盼望着早日分娩。其实，预产期是一个不确定的期限，提前10天或者错后10天都是正常的。


④ **不要粗**。有些孕妇粗心大意，到了妊娠末期还不以为然。有的孕妇临近预产期还坐长途车外出，车船的颠簸，很容易造成途中意外分娩。

⑤ **不要累**。临产前，活动量要适当减少，劳动强度也要降低。临产前如果身体或者精神太疲惫，将会影响正常分娩。分娩前要养精蓄锐，保证分娩时有充足的体力。

生孩子前需要做好的物质准备

在怀孕38周左右，准妈妈要做好生孩子前的一些准备工作：

首先孕妇要为即将到来的小宝宝准备必要的生活用品，包括：必备的小衣服、小棉被、小包布、小绒毯、尿布等；还要准备一些为宝宝洗浴用的香皂、婴儿浴液、婴儿润肤霜、婴儿爽身粉、洗脸盆、洗澡用的大盆、尿盆，洗澡专用的毛巾等。



此外，孕妇也要做好入院分娩的物质准备。包括产妇用的牙刷、牙膏、洗脸毛巾、水杯、软底拖鞋、内衣内裤、喂奶胸罩、卫生巾、梳子、少许食品等。婴儿用的衣服一套、小被褥一条，小毛巾、尿布等，以及办理入院手续时所需的证件，《孕产妇保健手册》、怀孕期间检查治疗的病历和入院押金等。

在医院生孩子最安全



到医院生孩子是最安全、最适合的选择。因为在医院里有专门的医护人员，专门的医疗设备，能够比较准确地把握孕妇的身体和生产状况，并在遇到紧急情况时采取及时、恰当的措施，保证母子平安。

如果孕妇对于到哪家医院生产，如何去医院就医等信息不是很清楚的话，或者发生了临产前的一些紧急情况自己无法处理时，都可以到儿童友好家园寻求帮助。在儿童友好家园可以获得有关的医疗服务的信息，如有关医院的地址、联系方式、如何去医院等一些信息，在遇到紧急情况时，还可以请儿童友好家园的工作人员协助送医或联系医院急救。

二、0—2岁宝宝的日常护理与教育



0–2岁是人生的第一站，在生命的这头两年里，宝宝各方面的发展变化都是非常迅速的，需要适应这个全新的世界。对于父母来讲，全面了解宝宝的生长发育状况，了解照料孩子的基本知识，才能更好地养育宝宝，为孩子打好发展的基础。

你知道吗?

刚出生的宝宝有哪些本事?

从出生到2岁，宝宝会发生哪些重要的变化?

怎样合理地喂养宝宝呢?

应培养宝宝哪些良好的生活习惯?

怎样让宝宝变得更聪明呢?

核心信息

- 孩子一出生就有多种感觉能力和运动能力。要多和孩子说话、多逗孩子玩。
- 新生儿还很脆弱，需要精心的照顾和护理。
- 妈妈的奶是最适合孩子、营养最丰富的食物。要坚持母乳喂养。
- 1个月—1岁是宝宝出生后生长发育最为迅速的时期。
- 1—2岁的宝宝语言、思维能力增强，自主性和独立性不断发展。玩耍对孩子的发展很重要。
- 虽然还小，也可以培养孩子良好的生活、卫生习惯和自理能力。

（一）新生儿

宝宝出生第一个月，我们称作新生儿期。新生儿期的健康状况，是宝宝一生健康的基础。新生儿的爸爸妈妈在品尝初为人父、人母的喜悦的同时，也必须尽快熟悉新生儿时期宝宝的一些生理特点，学会护理新生儿的科学知识，帮助娇嫩的小生命适应母体外的生活环境。

1、了解我们的孩子

宝宝体重增长快



足月出生的孩子，出生时正常体重一般在5斤到8斤之间。一般来讲，不同的孩子之间存在差异，而且男孩比女孩稍重。出生后宝宝体重增长的规律是：

① 出生后第1周宝宝的体重会出现暂时性下降，之后迅速恢复并进入体重快速增长时期；

② 孩子年龄越小，体重增长越快。出生后的前6个月是宝宝体重增长的高峰期。

③ 出生后第6--12个月，孩子体重的增长速度减慢，每月平均增长300–400克；

④ 一般情况下，宝宝在出生后3--5个月时，体重会达到出生时的2倍，1岁时可达到出生时的3倍，2岁时可达到出生时体重的4倍。

小·知识

中国儿童体重身高标准表

年龄	男童		女童	
	体重(千克)	身高(厘米)	体重(千克)	身高(厘米)
初生	2.9–3.8	48.2–52.8	2.7–3.6	47.7–52.0
1月	3.6–5.0	52.1–57.0	3.4–4.5	51.2–55.8
2月	4.3–6.0	55.5–60.7	4.0–5.4	54.4–59.2
3月	5.0–6.9	58.5–63.7	4.7–6.2	57.1–59.5
4月	5.7–7.6	61.0–66.4	5.3–6.9	59.4–64.5
5月	6.3–8.2	63.2–68.6	5.8–7.5	61.5–66.7
6月	6.9–8.8	65.1–70.5	6.3–8.1	63.3–68.6
8月	7.8–9.8	68.3–73.6	7.2–9.1	66.4–71.8
10月	8.6–10.6	71.0–76.3	7.9–9.9	69.0–74.5
12月	9.1–11.3	73.4–78.8	8.5–10.6	71.5–77.1
15月	9.8–12.0	76.6–82.3	9.1–11.3	74.8–80.7
18月	10.3–12.7	79.4–85.4	9.7–12.0	77.9–84.0
21月	10.8–13.3	81.9–88.4	10.2–12.6	80.6–87.0
2岁	11.2–14.0	84.3–91.0	10.6–13.2	83.3–89.8

宝宝一出生就有多种感觉能力

新生儿已经具备了视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉多种感觉能力。

第一个月内，孩子的视力将发生许多变化。孩子刚出生时，只能看到身边的东西，但是到一个月大时，他就可以看见3米以外的东西了。同时，他的视线还会跟着物体移动。另外，孩子的视觉还表现出一定的偏爱，一般喜欢对比鲜明的图案，特别喜

欢看人脸。

新生儿的听力是很好的。当你在宝宝旁边说话时，他们会扭头寻找，认真听，并观察你说话的动作。新生儿不仅听力较好，还能记住他听到的声音。当然，他对噪音也很敏感，而且不喜欢噪音。

新生儿一出生就具备发达的触觉功能。出生后，新生儿的嘴一旦碰到妈妈的奶头，就会自动吸吮。嘴唇和手指是新生儿最灵敏的部位，对冷热的刺激特别敏感，比如，宝宝对牛奶和洗澡水的冷热会做出不同的反应。因此，宝宝一般会通过嘴和手去感知外部世界。

新生儿对于味道和气味很敏感，闻到牛奶、糖、香草等香味时，会深呼吸；当闻到醋和酒精的味道时，就会扭头。母乳喂养的宝宝会记住妈妈身上的味道。另外，对于酸、甜、苦、辣的味道也有一定的分辨能力了。



宝宝天生就有运动能力

刚出生的宝宝，身体是软软的，只会胡乱地踢蹬着小腿，看上去好像没有什么能力。其实，宝宝生下来就有许多天生的运动能力，这些天生的运动能力也叫做反射能力。比如，当你将手指头放在他的嘴边时，他的嘴会追着你的手指动，这是觅食反射；而把东西放入他嘴里时，他会吸吮，这是吸吮反射；当轻轻敲一下宝宝的手掌时，他会立即握住你的手指，并且握得很紧，这是掌握反射，除此之外，新生儿还有踏步反射、足握反射、游泳反射等多种反射能力。



这些反射有的是孩子生存所必需的，比如觅食反射和吸吮反射，能够帮助孩子寻找妈妈的乳头和吸吮乳汁，这些反射会逐渐发展成为宝宝的一种有意识的行为。而有些反射比如踏步反射、足握反射、游泳反射在孩子出生后不久会自行消失。

哭也是宝宝的交流方式

新生儿时期和婴儿时期，宝宝的语言能力还没有充分发展起来，但他们会用啼哭来表达自己，所以，啼哭成了他们和爸爸、妈妈及其他家人交流的主要方式。

宝宝可以用哭声表达饥饿、口渴、尿湿和生病等各种各样信息，年轻的爸爸妈妈一般通过2--3周的观察就可以慢慢摸索出宝宝的哭声所传递的信息，及时了解孩子的需要并恰当地照料孩子。

除了哭之外，宝宝还能通过行动与爸爸妈妈交流。例如宝宝心情舒畅时，即使没有人在身边，他们也能独自在床上安静地躺很长时间；如果宝宝饿了，只要碰到奶头就会使劲地吸吮起来，而停止哭泣；相反，如果孩子生病了，即使妈妈给他喂奶，宝宝还是哭个不停，没法安静下来。如果宝宝哭泣的方式听起来奇怪，声音比较尖锐，或者持续的时间比较长，可能是身体有什么问题，就要及时去看医生。

2. 帮助我们的孩子

精心护理宝宝的小肚脐

期盼已久的宝宝终于出生了，全身上下都白白嫩嫩，可爱极了!只有小肚脐上还有一小断残留在慢慢地恢复，这个敏感的位置更加需要妈妈的精心护理。

正常情况下，脐带在宝宝出生后1–2天自然干瘪，3–4天开始脱落，10–15天自行愈合。

新生儿的小肚脐很容易滋生病菌引发感染。所以，要注意精心护理小肚脐。

① 父母一定要有耐心，在保证新生儿一切正常的前提下，要等待脐带的自行脱落，千万不能着急去拉扯，甚至盲目地剪断；

② 要每天检查新生儿的小肚脐，保持脐部清洁干燥，不受尿和粪便的污染；

③ 脐带脱落前给孩子洗澡前，要注意尽量不要让脐带沾水；

④ 每天可用75%的医用酒精棉擦脐带根部。脐带脱落后，脐带凹陷部分可能还有分泌物，此时还需要用酒精消毒，或涂2%龙胆紫以促进小肚脐干燥；

⑤ 遇有结痂时，应去除痂皮，彻底清除底部；

⑥ 小肚脐不要随便涂痱子粉，以免感染。一旦发现有感染症状，要及时去医院找医生看。



此外，还应该注意新生儿容易出现的脐部异常现象，以便及早发现和治疗。新生儿脐部容易发生的异常现象有：脐带感染、肚脐肉芽肿和脐疝。

温馨提示

如果在月子里，宝宝或者妈妈的身体出现了一些问题，家人不确定该怎么办，妈妈又不方便带孩子去医院，可以向儿童友好家园的工作人员寻求帮助。儿童友好家园可以通过转介服务，帮助解决问题。

要让宝宝有充足的睡觉时间

小英刚刚做了妈妈，她发现孩子一天到晚好像总是在睡觉，自己也不知道正常情况下，这么大的孩子应该睡多少时间合适，担心孩子是不是有什么病。

实际上，刚刚出生的宝宝睡眠时间长，一天中大约有16–20小时都在睡觉，醒着的时间短。随着宝宝不断长大，睡眠的时间会逐渐减少。

新生儿每天大多数时间都在睡觉，只要每隔几个小时睡醒时吃奶吃得好，露出满意的表情，睡眠就是正常的。但是，如果孩子很少有清醒的时候，或者不能主动醒来吃奶，或看上去疲倦，甚至对吃奶都没有兴趣，就应该去看医生。因为，疲倦、贪睡常常是孩子身体有疾病的表现。

小·知识

0–2岁宝宝每日需要的睡眠时间

年龄	每天需要的睡眠时间（小时）
新生儿	16~20
6周	15~16
4个月	13~18
6个月	14~16
9个月	13~16
1岁	12~15
1岁半	14~17
2岁	13~14

怎样给宝宝喂奶

小袁以前看别的妈妈给孩子喂奶，好像很轻松，可是，轮到自己给孩子喂奶，却不那么容易了。尤其是宝宝吃着吃着奶睡了，任由他睡吧，又睡不踏实，过一会儿就醒。真不知道该怎么办。

刚出生的宝宝显示的第一个本领就是会吃奶，不仅会吃奶，还会知道什么时候该向妈妈要求吃奶了，饿了，饱了他们都会用自己的语言表达。

对于新生儿，喂奶的基本要求就是饿了就喂——只要宝宝饿了想吃奶，就可以喂，不必严格按照固定的时间喂奶。随着宝宝吃奶量的增加，渐渐地，宝宝自己就会拉大吃奶的间隔，慢慢建立起规律的吃奶时间。



给新生儿喂奶时要注意以下几个方面：

① 学会判断宝宝是否吃饱。如果吃妈妈奶的最初10分钟能够吃饱，他可能停止吃奶并开始睡觉。母乳喂养的宝宝，如果一次吃奶的时间超过20分钟以上，可能是母亲的乳汁分泌不足。

② 喂奶要采取正确的方式。每次喂奶前妈妈最好先用手挤掉几滴奶水，然后用一手的食指和中指夹住乳头送入宝宝的嘴中。宝宝吃奶时妈妈要用食指和中指轻轻压住乳房，这样既可以使宝宝吃奶时省力，又可以避免乳房堵住宝宝的鼻孔，影响宝宝呼吸。同时注意要让宝宝吸空一侧乳房后再吸另一侧。宝宝时常会吃着吃着就睡着了，你可以轻轻刺激一下宝宝的脸颊，他又会继续吃起来。

③ 要注意清洁卫生。对于母乳喂养的宝宝，喂奶前，妈妈要先洗净手，用毛巾或纱布擦干净乳房。母乳是最适合孩子、最有营养的食物，如果用配方奶喂宝宝，则要注意奶瓶的消毒。最好是每次喂奶前都要给奶瓶消毒。对于一般家庭来说，最常用的方法就是放在锅里煮沸消毒。消毒后的奶瓶如果不马上使用，应该倒掉水，放在锅中备用，或盖上消毒纱布，防止污染。

④ 尽量减少宝宝溢奶。为了减少宝宝溢奶，吃饱后要将宝宝竖着抱起，头靠在妈妈的肩上，轻轻地拍打宝宝的背部，使其“打嗝儿”，将胃内的气体排出。宝宝吃奶过急呛着时，也可以用同样的方法处理。

怎样给宝宝洗澡

对于健康的新生儿，只要条件允许，出生24小时后就可以每天进行擦拭和洗澡，每天早晚都要给宝宝头部、脸部和皮肤的褶皱处擦洗，夏季天气炎热，孩子出汗较多时，可以增加洗澡的次数。

给宝宝洗澡时，要注意以下几个方面：

① 洗澡前要注意调好水的温度。宝宝洗澡水的温度一般控制在37——40℃。比较简单的办法是，用胳膊肘来试试水温，感觉稍有热度就可以了。给宝宝准备洗澡水的时候，要特别记住先放凉水，后加热水，以免不小心烫伤宝宝。

② 洗澡时间一般应在5——6分钟内完成，最长不要超过10分钟。洗完澡后，用浴巾将宝宝的身体擦干，并迅速给宝宝穿好衣服。



③ 不能洗澡时，要给宝宝擦洗身体。对于早产儿、脐带未脱落的新生儿、身体状况较弱或正在患病的新生儿，家长不敢给他洗澡，这时可以用洁净细软的棉布、毛巾或清洁的海绵进行擦洗。

怎么选择和清洗宝宝的尿布、衣服

给宝宝选择的尿布最好是棉质的。棉质尿布在使用前，无论新旧，都要清洗。使用过的尿布在清洗之前要先去除上面的粪便，清洗时最好用中性洗涤剂，不要用刺激性较强的洗衣粉和洗衣皂。每次清洗尿布时一定要漂洗干净，不要残留洗涤剂或消毒剂。冲洗干净后的尿布放在通风处晒透，最好经过太阳曝晒。尿布不需要每次都进行消毒处理，可以在使用5——6次后进行1次消毒处理，可以用开水煮。但如果宝宝患有腹泻等消化道疾病或疱疹等皮肤病时，每次换下的尿布都要进行消毒。

家长为1——3个月的宝宝选择衣服时要慎重。首先，安全第一，为避免划伤宝宝娇嫩的皮肤，衣服上不应有金属钮扣，更不能有别针，最好用布扣或带子。其次，要舒适。宝宝的生长发育比较快，为了不影响孩子的生长发育，衣服应该宽大，质地应柔软、舒适，缝合处以及袖口、领口处要柔软。宝宝的衣服以柔软、吸水的棉织物最为理想。

宝宝的皮肤非常娇嫩，衣服必须保持清洁、柔软和干爽。所以，必须经常为宝宝换洗衣物，贴身衣服最好每天换。在清洗衣服时，最好不要用刺激性较强的洗衣粉或洗衣液，而且，要漂洗干净。洗好的衣服要在通风处晾晒，如果有条件的话要在太阳下曝晒。

为宝宝按摩的好处非常多

给宝宝换衣服的时候，小王喜欢摸一摸宝宝的胳膊和小腿，每当这个时候，宝宝就好像很高兴的样子。小王想是不是应该多给宝宝抚摸抚摸呀，可是到底该怎么抚摸呢，又不是很清楚。

大多数父母、长辈都会亲切、自然地抚摸新生儿的面颊、后背、小手或者脚丫，其实，这是一种最简单、最直接的按摩方式。按摩对宝宝的生长有很多好处，可以活动孩子的身体，可以增加孩子的安全感，

还可以增强宝宝与父母的交流。因此，可以在给孩子洗完澡和换衣服时有意识地给孩子按摩。



小·知识

按摩的注意事项

① 宝宝做按摩的时间最好应选择在喂奶1–1.5小时后，或者在洗澡后进行。

② 按摩时妈妈的手指直接接触到宝宝的皮肤，同时要做好保暖工作。

③ 按摩要循序渐进，刚开始可以只按摩身体的某些部位，等宝宝习惯后再增加按摩量和按摩时间。

④ 宝生病时不要按摩，当宝宝哭闹时应停止按摩。

⑤ 新生儿每次按摩最好保持在10–15分钟。时间的长短要根据孩子的需要，一旦感觉孩子表现出不耐烦了，就要停止。

⑥ 在按摩时可以加上一些轻松的背景音乐，这样既有利于宝宝放松心情，又有利于宝宝的智力发育。


要按时给宝宝打预防针

按时给孩子打预防针是最经济、也是最有效地预防一些传染病的的方法，家长要按时带孩子接种疫苗。接种疫苗时要向接种人员说明孩子的身体情况，如果孩子有过敏现象或正在生病，如发烧，可以不接种或推迟接种。要向接种人员了解接种后的注意事项。接种后，要注意观察孩子的反应，如有不适，如发烧要及时向医疗人员说明。

小·知识

疫苗的接种顺序

年龄	卡介苗	乙肝疫苗	脊灰疫苗	无细胞百白破疫苗	麻疹疫苗	麻风腮疫苗	乙肝减毒疫苗	流脑疫苗
出生	√	√						
1月龄		√						
2月龄			√					
3月龄			√	√				
4月龄			√	√				
5月龄				√				
6月龄		√						√
8月龄					√			
9月龄								√
1岁							√	
1.5岁				√		√		
2岁							√	



（二）1个月–1岁的宝宝

1、了解我们的孩子

运动能力发展迅速


俗话所说，三翻、六坐、八爬，其实讲的就是1岁以内的宝宝运动能力的发展非常迅速，会出现一些重要的变化：



1－3个月的宝宝趴着时能抬起头部和胸部；趴着时可以用胳膊支撑自己的身体；仰面躺着或趴着时可以两条腿同时伸开踢；当脚接触到一个坚硬的表面时会向下蹬；

4－7个月的宝宝会双向翻身（能从趴着翻到躺着、从躺着翻到趴着）；首先用手，随后不用手支撑时可以坐起来；能够用腿支撑身体全部重量；

8－12个月的宝宝没有别人的帮助可以坐起来；能够腹部着地向前爬行；能够完成从坐到爬的动作，或者从坐到趴下的动作；可以自己拉着东西站起来，扶着家具行走；最后能够发展到不需要支撑独立站一小会、不需要支撑独立走2–3步。



温馨提示

在运动能力的发展方面，不同的孩子之间会有比较大的差异，但是，如果孩子出现发育过度缓慢的情况，则应该引起注意，并及时到医院请医生诊断。下面这些情况就表明孩子的发育延迟了：

2–3个月，仍然无法支撑头部。

4–5个月，倚着东西坐起来时，头向后垂。不会两面翻身。

5–6个月， 不能在别人的帮助下坐起来。

8–9个月， 不会翻身，不会独立坐

9–10个月，双手扶着东西或者在有人保护时不能站立

11–12个月，爬行时不协调。

1岁半，不会走路。

小手越来越灵活

宝宝到4、5个月时开始有目的地用手去抓东西，在随后的几个月里，孩子的这种抓的能力发展很快。从4个月到12个月，孩子的抓的能力会经历以下四个发展阶段：

① 双手抓物。新生儿第一次试图抓的时候是在两眼紧盯一样东西的同时用双手的手掌心去抓，这种抓握方式又叫做“掌心抓物”。

② 单手抓物。6到7个月时，孩子能够用一只手抓

东西了。这时，孩子是用整只手去抓东西，单个手指头还不能单独抓东西。

③ 剪刀抓物。7–8个月时，孩子的拇指和食指之间可以抓小东西了，称之为“剪刀抓物”。

④ 钳子抓物。9–10个月时，孩子的拇指和食指可以抓细小的东西了。孩子1周岁时，已经能够非常熟练地用手抓东西了，但是扔东西还有点费劲，总是挥舞手臂乱扔。

咿呀学语

满月之后，宝宝就能够咿咿呀呀地说话了，但是，6个月之前宝宝的发音主要是他自发的，而半岁之后的发音主要来自于孩子对成人发音的模仿。

满月之后，宝宝开始越来越多地发出不同的音节，比如“o（喔）”“a(啊)”等音。百天后，小家伙能够像唱歌似地发出一些音，宝宝还会用非常有特点的喊叫来表达自己的喜悦和高兴的情绪。3个月之后，宝宝经常自言自语，比如在清晨或者喝奶后，他会独自躺在小床上，咿咿呀呀地说个不停。在最初的5个月里，孩子的发音不受他所成长的文化环境的影响，不同文化背景的孩子能够发出同样的音。



6个月以后，宝宝的发音能力有了进步，他能够发出一些“o（喔）”“a(啊)”的音，还能够发出“g(鸽)”“m(摸)”的音，还能够进行组合，发出“go（高）”“me(美)”。

7–8个月时，宝宝开始直接模仿他熟悉的音。8–10个月时，宝宝就能发出更多的组合音，比如“ta”“ma”“ba”“pa”等组合音。但是，这个时候孩子的发音还没有称谓，也就是通常说的叫人的意思，他只是会发“mama”“baba”的音，还没有把它们当作一种称呼。不过，用不了多久，孩子就真的会叫“妈妈”“爸爸”了。但是，孩子会叫“爸爸”“妈妈”的年龄也是有差异的，有的孩子叫得早，有的孩子叫得晚，这都是正常的现象。

值得注意的是，孩子6个月之后，如果发音能力减弱或者逐渐丧失，则要引起重视，及早去医院进行诊断。

“认生”说明宝宝长本事了

蒙蒙是个特别可爱的孩子，邻居们见了都喜欢逗逗她。以前，谁抱都可以，逗逗她，她就会笑。可是，半岁以后突然像换了个人似的，别人一抱她，她就哭。蒙蒙的妈妈很苦恼，这孩子怎么越大越胆小了呢?

半岁以后，孩子与父母还有他们所信赖的人之间的关系发生了一些变化，主要的表现就是他怕与自己信赖和熟悉的人分开，这也叫做“分离焦虑”。

与分离焦虑相联系的还有一个表现，那就是“认生”。孩子半岁以后，会明显地表现出害怕陌生人的

特点，拒绝陌生人抱，看到陌生人的脸会哭。

孩子能够认生，表明孩子能够把自己熟悉的人和陌生人区分开来了，并愿意把自己托付给所信赖的人。

2、帮助我们的孩子

除了吃奶，宝宝还能吃什么

欣欣5个月了，看着大人吃饭，她总是盯着看，好像也很眼馋，妈妈就给她一点米糊或者软面条，她吃得有滋有味。欣欣的妈妈觉得应该给她添加一些吃的东西了，可是究竟应该给她吃些什么呢?

从4个月—6个月，宝宝除了吃母乳以外，也开始



对其他的食物感兴趣，并能够接受一些食物了。为了满足孩子的营养需要，如果母乳不能完全满足孩子的需要，从这个阶段开始就可以在宝宝两次喝奶之间给宝宝添加一些食物了。

给宝宝添加食物要注意一些问题：

在品种上，要从一样到多样。开始时宝宝对食物的适应能力还比较差，不可以将多种食物一起添加，应一样一样测试，等宝宝适应了一种后，2~3周后再添加另一种，如果宝宝拒绝某种食物或者出现消化不良，就要及时更换，千万不要勉强。

在数量上，要由少到多。添加辅食时应从少量开始，逐渐增加。一旦出现大便性状异常、腹泻等症状要减少辅食数量或停止喂食，等宝宝恢复正常后再从小量试喂。

在质量上，要由稀到稠，由软到硬。宝宝半岁前添加的辅食主要是米糊、蛋羹和肉泥等软烂的食物，半岁以后，宝宝开始长牙了，食物可以不用做得那么细、软、烂，但是也不能太硬，可以在食物中加入碎菜叶、肉末，主食可以吃面条、饺子、馒头等。在宝宝出牙的时期，还可以给宝宝小饼干和馒头片，让他练习咀嚼。

在喂食方式上，应以匙为主，这样宝宝可以逐步适应日常餐具的使用，减少对乳头的依赖，而且，可以避免宝宝吃得过多，出现超重的问题。

在口味上，要以清淡为主。宝宝的消化和排泄功能还比较娇嫩，辅食中最好不要添加盐，以免增加肝、肾的负担。



油脂	不超过10–15g (2–3钱)
糖	10–20g (2–4钱)
奶 (或豆浆)	250g (半斤)
豆类及制品	25–50g (半两–1两)
鱼、禽、肉类	75–100g (1两半–2两)
蛋	50g (1两)
蔬菜	75–100g (1两半–2两)
水果	50–100g (1–2两)
谷类	125–175g (2两半–3两半)

在给宝宝添加辅食的时候，要注意营养均衡，蔬菜和水果搭配，不要让孩子养成偏食的坏习惯。

小·知识

营养美味的宝宝食谱

蛋黄泥

原料：鸡蛋1个

做法：

将鸡蛋煮熟，用筛碗或勺子碾成泥，加入适量开水或配方奶调匀即可。最初要从1/8个蛋黄开始，根据宝宝的接受程度逐步添加至1/4、1/3。

鱼泥胡萝卜泥米粉

原料：河鱼或是海鱼，胡萝卜

做法：

选择河鱼或是海鱼，蒸熟，取出肉，并小心将鱼刺全部除去，压成泥即可。将做好的少量鱼泥，连同胡萝卜泥一起拌在米粉里。

菠菜土豆肉末粥

原料：菠菜，土豆，蒸熟肉末，适量高汤，熬熟植物油。

做法：

·菠菜洗净开水烫过后剁碎；土豆蒸熟压成泥备用。

·将厚粥、熟肉末、菠菜泥、土豆泥、及适量高汤放入锅内，小火烧开煮烂后，加入熬熟的植物油和少量盐即成。

番茄鸡蛋什锦面

原料：鸡蛋半个，儿童营养面条适量，番茄、黄花菜、花生油、葱丝、盐适量

做法：

·将黄花菜用温水泡软，择洗干净，切寸段；番茄洗净切块；鸡蛋打散。

·锅中淋少许油，稍热，放葱丝煸香，再依次放入黄花菜、番茄煸炒片刻，加入清水。

·水沸后放入面条，快熟时淋上打散的鸡蛋液、少许盐。

虾蓉小馄饨

原料：大明虾，小馄饨皮，小葱，紫菜，盐、麻油少许

做法：

·取明虾仁用刀拍碎，拣出虾肠，剁碎，淋入麻油少许、撒上一点盐花，搅成泥蓉。

·用筷子挑指盖大小的虾蓉包进馄饨皮中，入锅煮熟，撒上小葱末和紫菜。

八宝粥

原料：糯米，红枣、红豆、桂圆肉、莲子、花生、核桃各适量

做法：将原料洗净后一起放入锅内熬煮成粥，放入冰糖即可。

宝宝按时睡觉很重要

睡眠对于婴儿的成长和发育具有非常重要的意义，因此，父母应该根据婴儿的睡眠特点，参照各年龄段婴儿需要的睡眠时间，引导宝宝形成良好的睡眠习惯。

总的来说，随着宝宝逐渐长大，睡眠的时间逐渐缩短，醒着的时间逐渐变长。一岁左右的宝宝，白天睡眠的次数需要2–3次。父母应该根据这个特点，让宝宝定时上床睡觉，养成良好的生活规律。每次睡觉之前，父母可以和宝宝轻声地说，“宝宝，我们要睡觉了，快把眼睛闭上。”然后，把宝宝抱上床，轻轻拍着他，给他哼轻柔的歌曲，让他自己入睡。不要养成抱着宝宝睡，摇晃着睡，这些都是不良的睡眠习惯。在父母的引导下，宝宝会逐渐养成定时睡觉、自己睡觉的良好习惯。



多带宝宝到户外玩

户外活动能让宝宝呼吸到新鲜的空气，阳光能促进孩子对钙质的吸收，而且，户外活动时可以让宝宝接触到其它的同伴和成人，有利于孩子的社会交往能力的发展，也能开阔宝宝的眼界，增长宝宝的见识。因此，在天气适宜的时候，要保证孩子有充足的户外活动。

1–2个月的宝宝就可以带到户外，晒晒太阳，呼吸一下新鲜的空气，但是，时间不要太长，而且，出门前一定要根据天气的需要给宝宝穿好衣服。在让宝宝晒太阳的时候，要注意不能让太阳直射孩子的眼睛，这样对孩子的眼睛有害。

3–4个月的宝宝户外活动的时间可以适当延长，每天至少在1个小时左右。



而到了6个月以上，宝宝就可以坐在婴儿车上出去散步和晒太阳了。在户外活动的时候，可以让宝宝看看红花、绿树和各种各样的东西，这样对宝宝的成长是十分有利的。

虽然宝宝不会说，也要多“聊天”

乐乐的妈妈发现小家伙还挺喜欢跟妈妈说话的，给他换尿布、换衣服的时候，宝宝都咿咿呀呀说个不停。妈妈也想跟孩子说说话，可是，这么小的孩子该怎么跟他说话呢?

白天，大人会有很多机会和孩子对话：给他喂奶、换尿布、洗澡或者把孩子放在床上睡觉的时候，宝宝非常喜欢这样的“聊天”活动。

在和较小的宝宝说话时，因为宝宝对语言的理解能力还非常有限，因此应该采用一种独特的方式，采用“放慢、夸大、重复”的方式。也就是说，说话时，放慢说话的速度，夸大表达的方式，并重复所说的话。除了语言之外，父母的表情和动作也要遵循这个原则，因为，这些表情和动作是一种非语言的交流方式。但是，要注意，宝宝很小的时候，注意力维持

的时间非常有限，如果孩子感到累了，就不要再和他说话了。

而在半岁之后，宝宝能够听懂一些话了，父母和宝宝交流的时候，就要有意识地让孩子去了解一些事物的名称和含义了。也就是说，在父母和宝宝一起活动的时候，要配合一些语言，比如，给孩子穿衣服的时候，就告诉他，宝宝穿“衣服”，伸“胳膊”，戴“帽子”等。宝宝会看到、听到并感受到父母所说的一切。

会玩的孩子更聪明

宝宝一来到这个世界上就会玩，虽然很小的孩子也能够自己玩，但是，他们更乐意和妈妈、爸爸和家庭中的其他成员、周围的人共同玩耍。因此，父母要孩子尽可能地给孩子提供一些玩具，并和孩子一起游戏，这样他们发展的会更好。

小·知识

适合孩子的玩具和游戏

（1）适合1~3个月孩子的玩具与游戏：

- 色彩鲜艳、形状各异的玩具；
- 铃铛和其他能发出声响的玩具；
- 给孩子唱歌、听音乐、讲故事；

（2）适合4–7个月孩子的玩具和游戏

- 可以用手指握的玩具；
- 可以发出声音的铃铛玩具；
- 拨浪鼓；
- 供孩子翻阅的图像鲜明的旧杂志和小人书；并每天给孩子阅读书籍或者念唱儿歌；
- 与孩子一起从事节律性的运动，例如随着音乐一起跳舞；
- 做一些简单的模仿动作游戏，如挥手、拱手等；

(3) 适合8~12个月孩子的玩具与游戏：

- 不同大小、形状和颜色的积木；
- 漂浮、喷水枪和盛水容器等洗澡时的玩具；
- 可以推动、打开、发出声音和运动的复杂盒子；
- 发出声音的玩具；
- 没有尖锐的边缘和运动部分的由壳弯曲的塑料制成的小汽车、卡车或其他车辆；
- 各种大小的球（除了他可以吞下去的以外）
- 带音乐的玩具；
- 推拉玩具；
- 纸管、空盒子、旧杂志和清洗干净的空饮料瓶。
- 配有大图案的大开本图书，每天和孩子一起读书；
- 和孩子一起玩躲猫猫的游戏；
- 和孩子一起做一些节律性运动，如随着音乐一起跳舞。
- 做一些简单动作的模仿游戏；
- 爬行游戏；
- 照镜子游戏。

带宝宝去儿童友好家园玩耍

儿童友好家园专门为0–2岁的宝宝准备了丰富的玩具，并会组织家长和孩子共同参加的亲子游戏。家长可以带着孩子一起在家园玩玩具，做游戏。

这样的亲子活动可以增进爸爸妈妈和孩子的感情。在家园工作人员的带领下，爸爸妈妈和宝宝一起快乐地做游戏，工作人员还会告诉爸爸妈妈如何跟孩子平等地交流，如何和孩子互动。掌握了正确的方式，爸爸妈妈就能在游戏中带给孩子快乐，而不只是急着去纠正和教育孩子，这样一来，孩子就会很喜欢和爸爸妈妈玩，无形中增进了亲子的感情。

亲子活动能够扩大孩子的社会交往范围。小宝宝也需要有朋友和玩伴，可是，平时，和他一起玩的人可能就是邻居的几个孩子，而在家园组织的亲子活动中，很多父母和孩子都会来参加活动。小宝宝也会见到更多的朋友，大家一起玩，会更加开心。



亲子活动能够让宝宝找到适合自己的玩具。每个家庭为孩子准备的玩具毕竟是有限的，平时孩子可以玩耍的东西可能比较少。在儿童友好家园中，为0–2岁的孩子准备了丰富的、适合他们年龄段的玩具，比如，拖拉玩具，简单的绘画用具，发声的物品及乐器，手偶，扮演游戏的道具，拼图游戏用材料，积木，还有适合这个年龄的图书等。这些丰富的游戏材料，可以充分调动孩子玩耍的积极性，在这里孩子不仅玩的开心，还会玩的更聪明。

对宝宝的大小便训练不能过早

天天的奶奶说，要早点给孩子练习把尿，所以，从天天6个月开始，天天的妈妈就开始给天天把尿。可是，这个天天就是不配合，有的时候把半个小时都不尿，可是，刚一放下，他就尿了，真拿他没办法。



有很多家长从孩子几个月时就开始训练孩子有规律地大小便，其实，这是不恰当的做法。因为1岁以内的宝宝还不具备控制自己的大小便的主动意识，也不能用语言明确地表达自己要大小便了，因此，大小便的训练基本上没有什么效果。

但是，成人可以通过细致地观察，掌握孩子排便的规律，尤其是孩子大便的规律比较容易掌握。因为孩子一天大便的次数比较少，一般来说昨天晚上大便过了，今天早上就不会有了，多数宝宝在吃奶后容易大便。另外，还可以看表情。需要大便时，宝宝会有出现发呆、小脸发红、用力的神情，可以通过这些信号来判断孩子的大便需要。

同时，在孩子大小便的时候，大人可以用“嘘嘘”和“嗯嗯”的声音，时间久了，就能让宝宝建立起这些声音和大小便训练的条件反射关系，更有利于以后的大小便训练。

温馨提示

什么时间开始大小便训练才是适宜的呢?

一般来说，宝宝从1岁开始，才具有大小便控制的能力，也就是说，1岁到1岁半时，开始对孩子进行大小便训练是合适的。

（三）1–2岁的宝宝

当孩子进入第2个年头，开始蹒跚学步时，他会劲头十足地练习走路，甚至能说一点话，这个时期，我们称他为学步儿。

学步儿的独立能力逐渐增强，自主意识也在萌芽。因此，这个时期，应该鼓励孩子独立进行一些活动，并开始在饮食、排便、游戏方面培养孩子的良好习惯和自理能力；这个时期也是孩子语言和智力发展的重要时期，为孩子提供良好的环境，丰富的刺激，让孩子参与各种各样的游戏、多接触大自然、开始读一些简单的书，多与同伴交往，对于孩子的发展都是非常重要的。另外，学步儿的好奇心很强，喜欢探索，因此，要格外注意孩子的安全，从孩子的眼光出发，消除环境中的危险因素，同时在孩子游戏的时候要加强监护。

1、 了解我们的孩子

孩子特别喜欢走路

一般来说，孩子在一岁左右就能够独立走路了。不过，在学会走路的时间上，不同的孩子之间还是存在差异的，有的孩子要到一岁半才能学会独立走路，这些都是正常的现象，家长不必紧张。

随着年龄的增长，孩子走路已经非常稳了，走路的姿势也好看多了，手臂的摇摆和走路的节奏也能够配合起来了。速度也越来越适当了，转身也越来越好看了。这时候，孩子非常喜欢玩那些能“拖”或者“推”着走的玩具。

走得比较稳了之后，孩子又开始练习跑、上下楼梯、踢和跳的动作。接近两岁时，孩子已经能够独立地上下楼梯，开始跑，能够踢球，但是，跳的时候，不能两脚同时起跳和着地。

随着孩子会走路了，他们的活动范围扩大了，于是，在锻炼自己的运动能力的同时，也更热衷地去探索周围的世界，所以，这个时期的孩子总是停不下来，不知疲倦地忙个不停。



孩子有自己的主意了

很多父母发现孩子一岁以后变得越来越有主意了，总是坚持自己的想法，有的时候不满足他的要求，就会耍赖，哭，甚至躺在地上打滚。这让家长不免觉得怎么孩子越大越难管了。

其实，这个时候孩子的这些行为表现是孩子发展的一种特点 ，随着孩子自我意识的萌发，他们越来越希望能表达自己的意愿了。

那么，这么大的孩子的自我发展有什么特点呢?

首先，认识自我。孩子在1岁以前也喜欢照镜子，但是那个时候他还不能认识到镜子中的人就是自己。一岁以后，孩子甚至还会出现对镜子中的人害怕，躲避的现象。到了1岁半以后，孩子就能够在镜子中观察自己，并且知道镜子中的人就是自己了。

其次，表达自己的愿望。一岁以后的孩子开始越来越想表达自己的愿望。他希望能够自己作出决定和行动。如果受到了现实的限制而不能实现自己的意愿，就会表现出生气，大哭大闹等行为。

第三，逆反心理。固执地坚持自己的要求，而对大人的要求说“不”。孩子的逆反心理最早从1岁就开始了，2岁时表现的比较明显，有的孩子的逆反心理会一直持续到幼儿园时期。



孩子的语言需要“翻译”

大多数孩子从在1岁到1岁半时，才开始说出第一个单词。一般来说，女孩说话比男孩早，也快。很多女孩在一周岁的时候就开始说话了，而男孩就要晚一些。

虽然刚开始说话的时候，宝宝的发音不是很清楚，但是，父母一般还是能够理解孩子的语言的，因为，他们的话具有很大的情境性，但是，对于外人而言，则很难听懂孩子的话。所以，孩子的话经常是需要“翻译”，别人才能听懂。

一般要到15–18个月时，孩子才会使用两个单词的组合，能用两个单词组合之后，孩子表达的东西就更为丰富了，比如，孩子会说“我喝”。

这个阶段的孩子对于物品的名称特别感兴趣 ，他会指着很多东西，希望大人能够告诉他那种东西的名称是什么。

喜欢堆一堆、摆一摆

1岁到2岁的孩子很喜欢堆一堆、摆一摆的游戏，从这些游戏中我们可以看出孩子的理解能力在发展。这些游戏包括：

“填满倒空”游戏。12–16个月的孩子对于在一个容器里填满东西再倒出来很感兴趣。最初，孩子不会把容器反过来倒东西，而只是摇晃容器，到了15个月，孩子就能够把容器反过来把东西倒出来。

“垂直堆叠东西”。15个月之前，孩子对于用积木堆叠玩具不感兴趣。从18个月开始，孩子对垂直堆

叠东西感兴趣了，孩子喜欢将小方块和积木等堆叠起来。



“横着摆放”。两周岁时，孩子对于垂直堆叠的兴趣减弱，开始喜欢将积木横着摆开。

这些游戏活动表现出孩子对于空间概念和物体间关系的理解能力已经有了很大的发展。

能把不同的东西分开

18个月到24个月的孩子已经具备了一些分类的概念，比如他会把玩具汽车放在一边，把塑料小人放在另一边；小椅子放在一边，盘子放在另一边。这些行为并不是表明孩子想要整理家务，而是表明孩子逐渐认识到了物体的某些特征是相同的，或者是不相同的。根据玩具或者物品的某一个特征，孩子可以进行分组。

这种分类能力能够让2岁的孩子认识一些简单的图形，如2岁的孩子能够正确地将圆形、三角形和正方形区分开来，所以，孩子喜欢玩一些图形对应的玩具。

2、帮助我们的孩子

不要急着给孩子断奶

盈盈已经一岁半了，盈盈的妈妈还在给孩子喂母乳。很多人都告诉她，该给孩子断奶了，孩子越大断奶越难。可是，盈盈的妈妈觉得自己还有奶水，断了奶有点可惜。那么，究竟孩子多大的时候断奶合适呢?

世界卫生组织建议母乳喂养最好可以到宝宝2岁。尽量延长母乳喂养不仅方便又经济，能够满足宝宝部分的营养需求，而且对于促进宝宝身心的全面发育还有重要意义。

虽然随着孩子逐渐长大，母乳的量会减少，乳汁也会变稀，但是，依然可以继续给孩子喂养母乳。只要宝宝吃饭比较正常，没有因为过分依恋母乳而不吃其他食物，或者每天喂母乳的量已经很少的情况下，妈妈都可以坚持喂母乳。

对于半岁以后的宝宝，单纯母乳喂养已经不能够满足宝宝的营养需求，需要合理添加其他的食物。而母乳的量逐渐减少，也已经不能满足宝宝全天的喝奶量，这时也可以给孩子添加配方奶。

避免孩子挑食和偏食

在这个阶段，孩子需要从饮食中吸取大部分身体所需要的营养，因此要注意饮食的搭配和营养的均衡。为孩子设计的菜单应该包括以下四种类别的食物，1、肉、鱼、家禽、鸡蛋；2、奶制品；3、水果、蔬菜；4、谷类、马铃薯、大米、面包、面食。如果在孩子的饮食中注意了这些种类的搭配，那么，他的饮食应该是营养均衡的。同时，让他摄入各种颜色和类别的食物，防止孩子挑食和偏食。

1岁以后的宝宝因为生长速度放慢，又比较贪玩，会出现食欲降低，对吃饭没有兴趣的现象，如果出现这种情况，也不要强迫孩子吃饭，可以暂时把饭

收起来，等孩子饿了再给他吃。但是，在这期间不要给他提供饼干、甜点和其他零食，零食中的热量一般比较高，吃过了甜食、零食，孩子又会拒绝吃正餐。这样会造成孩子对营养的摄入量不够，长此下去，还会影响孩子的生长发育。

自己吃，饭更香

吃饭的时候，兰兰对小勺子很感兴趣，总是要自己拿着勺子自己吃饭，可是，她勺子还拿不好，有的时候勺子还没有送到嘴里，饭已经洒了。兰兰的妈妈看着真着急，让孩子自己吃吧，她总是把饭洒得到处都是，不让她自己吃吧，她还着急呢。究竟应该怎么做呢?

1~2岁的宝宝，很喜欢模仿大人，看到大人自己吃饭，他们也想试一试。那就让他们自己吃吧，虽然吃的哪儿都是，但是，只要他有兴趣，吃得也会更香。

在刚开始自己吃饭时，孩子还不能平稳地把勺子里的饭送到嘴里，拿杯子喝水的时候也容易洒掉。因此，需要家长耐心细致地引导他，多鼓励孩子，多给他一些锻炼的机会，逐渐培养孩子用勺子自己吃饭，以及用杯子喝水和牛奶的技能。



小·知识

让孩子自己吃饭、喝水时要注意什么

1、 先洗干净手。吃饭前，先帮宝宝把小手洗干净，这是培养他良好健康习惯的一个好办法。

2、 选一把合适的椅子。让宝宝自己吃饭，最好给孩子选择一个合适的椅子。椅子和餐桌间的高度要适度，椅子要稳当、安全。

3、 戴上小围嘴。吃饭的围嘴是必备的。选择柔软、防水的围嘴，在吃饭的时候给孩子戴上，可以避免宝宝把衣服弄得太脏。

4、 手把手教他。宝宝第一次拿小勺子吃饭，你可以把着孩子的手，教他怎么舀食物：先舀起饭，然后放进嘴里，吃完后再舀、再吃。当然，宝宝的手还不太听指挥，东西可能会送到鼻子和脸上，像个小花猫。

5、 喝水杯也有讲究。带把的、底座比较宽的杯子比较适合这个年龄的宝宝用，拿着也方便，放在桌子上也不容易倒。杯子里的水不能太满，要不孩子的手不稳，很容易洒掉。

6、 用手当餐具。如果宝宝还不习惯用勺，总是想用手拿东西吃，那也没有关系，可以把蔬菜和水果切成条，就让他用手抓着吃好了。

宝宝初学吃饭时，往往会把饭和汤洒的到处都是，家长不要有急躁情绪，更不要怕孩子弄脏而喂他吃，这样都不利于培养孩子的进餐能力。只要在饭前做好准备，给孩子穿上围兜，把饭桌下面铺上报纸，注意及时清理就可以了。

让宝宝养成独立大小便的习惯

孩子在接近2岁时，一般就做好了大小便训练的准备，判断孩子是否做好了大小便训练的准备可以参照以下指标：

（1）孩子能相当准确地预感到自己要大小便；

（2）尿布不总是湿的，这表明他的膀胱能够储存尿液了；

（3）能够听从指导；

（4）通过说话、面部表情和动作告诉你他什么时候想要大小便了。

如果孩子已经做好大小便训练的准备了，就可以进行如厕训练了。最初可以先训练孩子学会在小孩子的尿盆上大小便。通过榜样示范的方法可以很快让孩子明白尿盆是用来做什么的，以及怎样坐在尿盆上大小便，同时，家长要给孩子做简单的说明。经过这样的教育和一段时间的适应之后，孩子就能够在白天有规律地使用尿盆了。

一定要多和孩子说话

父母应该尽可能多地给孩子倾听和表达的机会，在日常生活中、和孩子玩耍的时候，多让孩子和父母以及其他照顾他的人说话，那么，父母就是最好地促进了孩子的语言表达能力。



父母对于孩子的语言发展有着重要的促进作用，正确的做法有以下几种：

① 父母对孩子说的话采取认可的态度，认真地倾听孩子的说话；

② 只要孩子说的话不影响理解，就不要急于纠正孩子表达上的错误；

③ 父母可以用正确的方式重复孩子的话，来示范语言的正确表达方式；

④ 不要用“儿语”来和孩子说话，比如有的父母喜欢模仿孩子的说话方式，用“吃饭饭”“看书书”这样的儿语和孩子说话，这是不正确的，孩子这样说话，是因为他的表达能力还不发达，而父母跟孩子说话时应该用标准的语言表达方式，这样才能给孩子一种正确的语言示范，有利于孩子模仿。

和宝宝一起玩的好处很多

玩耍是孩子的天性，这个年龄的孩子非常喜欢和大人一起玩，选择适合的玩具，和孩子一起玩，不仅



有利于孩子动作、智力、语言的发展，而且可以密切父母和孩子之间的感情。和孩子一起玩，还可以帮助父母了解孩子的发展水平和兴趣爱好。

适合1~2岁孩子的玩具：



- 大图画和简单故事制作的大开本图书；
- 积木；
- 插塑玩具；
- 简单的益智拼图玩具；
- 过家家类的玩具；
- 挖掘类的玩具；
- 各类汽车玩具；
- 各种不易破碎的容器；
- 能推拉的玩具；
- 室外玩具（滑梯、秋千、砂箱）；
- 儿童三轮车；
- 相互连接的玩具（连环、大的串珠、S形物体）；
- 长蜡笔；
- 玩具电话；

适合1–2岁孩子的游戏活动

- 每天给孩子读书。选择鼓励触摸、操作或可以指认物体的图画书，看书时鼓励、孩子积极参与。
- 和孩子一起玩过家家等游戏；
- 和孩子一起玩沙、玩水；



- 和孩子一起画画；
- 和孩子一起用积木玩堆叠或者拼插游戏；
- 和孩子一起玩抓、握、捏、扔、跑、跳等各种运动游戏，促进孩子运动技能的发展；
- 和孩子一起玩配合儿童歌曲的表演游戏；
- 鼓励孩子交朋友，和其他小伙伴一起玩。

这个年龄段的爸爸妈妈可以带宝宝去儿童友好家园参加多姿多彩的亲子活动，让宝宝尽情地在家园玩耍。（详情：参见“1个月–1岁宝宝”部分中的“和宝宝一起去友好家园玩耍”的相关内容。）

时时刻刻关注孩子的安全

学步儿现在已经学会了跑、跳和骑三轮车。强烈的好奇心将驱使他继续探索许多新鲜的事物，包括一些危险的地方。但由于自控能力和自救能力还没有发育成熟，因此特别需要成人的保护。为了孩子的安全，要注意以下事项：

- 给任何危险的地方——如厨房、放药品的抽屉等上锁并收好钥匙；
- 安装窗户防护设施；
- 远离厨房用具、熨斗和加热器；
- 在室外搭建炉灶做饭的家庭，要教育孩子不要在炉灶周围玩耍，并注意看管；
- 装有热粥/汤的锅不要放在地面上，防止孩子跌入其中或碰翻被烫伤；
- 保温水瓶、热水杯要放到孩子碰不到的地方；
- 覆盖所有的电源插孔；
- 将所有的药物放在孩子打不开的容器中并放在



孩子够不到的地方；

- 只储存一些家用化学品或药品，并保存在上锁的橱柜中；
- 不要用饮料瓶、饼干盒、糖果罐等，存放消毒剂、清洁剂、杀虫剂这些有毒物品；
- 在孩子靠近街道玩耍时要密切注意孩子；
- 不要让孩子玩硬币、钮扣等小东西，防止孩子吞食或吸入气管；
- 不要让孩子长时间看电视；
- 家长要教育并看管好孩子不要和猫、狗亲密接触；
- 家长不要让幼儿单独到河边、池塘边、粪池边玩耍；
- 告诉孩子在路上行走或跑时要看清道路，以防跌入下水道或没有井盖的下水井；
- 不要把婴儿单独放在小板凳上、椅子上或高出地面的物体上；
- 不要把幼儿单独留在房间内，孩子的活动范围要在成人的视线范围内；
- 要记住急救电话号码。