

## FEUILLE D'EXERCICES N°2 &amp; 3

## APPLICATIONS ET FORMES LINÉAIRES

## Rappels et compléments

**Exercice 1 :**

a) Montrer que l'application  $\varphi$  définie par  $\varphi(P) = P + P'$  est un automorphisme de  $\mathbb{K}[X]$ .

b) En est-il de même de l'application  $P \mapsto \psi_\lambda(P) = \lambda P - XP'$ , où  $\lambda \in \mathbb{R}$  (discuter) ?

**Exercice 2 :**

Soit  $\Delta : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X]$  l'application définie par :  $\Delta(P) = P(X + 1) - P(X)$ .

a) Montrer que  $\Delta$  est un endomorphisme et que pour tout polynôme  $P$  non constant  $\deg(\Delta(P)) = \deg P - 1$ .

b) Déterminer  $\text{Ker } \Delta$  et  $\text{Im } \Delta$ .

c) Soit  $P \in \mathbb{C}[X]$  et  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que :

$$\Delta^n(P) = (-1)^n \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} P(X + k)$$

d) En déduire que si  $\deg P < n$  alors :  $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} P(k) = 0$ .

**Exercice 3 :**

Dans  $\mathbb{K}_n[X]$ , soit  $u$  l'application qui a tout polynôme  $P$  associe le polynôme  $(X - a)[P'(X) + P'(a)] - 2[P(X) - P(a)]$  (où  $a \in \mathbb{K}$  est donné).

Montrer que  $u$  est un endomorphisme de  $\mathbb{K}_n[X]$ . Déterminer son image et son noyau (on pensera à utiliser une base convenable de  $\mathbb{K}_n[X]$ ).

**Exercice 4 :**

Dans  $\mathbb{K}[X]$ , soit  $\varphi$  l'application qui a tout polynôme  $P$  associe le polynôme  $(1 - nX)P + X^2P'$  (où  $n \in \mathbb{N}^*$  est donné).

Montrer que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathbb{K}[X]$ . Est-il injectif ? surjectif ?

**Exercice 5 :**

Soit  $\varphi$  l'application qui a tout polynôme  $P \in \mathbb{R}[X]$  associe  $\varphi(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} p^{(k)}$ .

a) Démontrer que  $\varphi$  est un endomorphisme injectif de  $\mathbb{R}[X]$  et que  $\varphi(\mathbb{R}_n[X]) = \mathbb{R}_n[X]$ .

b) En déduire :

$$\forall Q \in \mathbb{R}_n[X] \quad , \quad \exists ! P \in \mathbb{R}_n[X] \quad \text{tq} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} p^{(k)} = Q$$

Simplifier alors  $Q - Q'$  ; en déduire que  $\varphi$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}[X]$  et déterminer  $\varphi^{-1}$ .

**Exercice 6 :**

On considère l'application

$$u : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto \frac{1}{3}(x + 2y + 2z, 2x + y - 2z, 2x - 2y + z) \end{cases}$$

Montrer que  $u$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ . Est-ce un projecteur, une symétrie ? Si oui, en déterminer les éléments caractéristiques.

**Exercice 7 :**

Soit  $p$  un projecteur d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ , et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrer que  $u \circ p = p \circ u$  si et seulement si  $\text{Im } p$  et  $\text{Ker } p$  sont stables par  $u$ .

### Exercice 8 :

Soient  $p, q$  deux projecteurs d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ .

Montrer que, si  $p$  et  $q$  commutent, alors  $p \circ q$  est un projecteur, et en déterminer l'image et le noyau.

### Exercice 9 :

Soient  $p$  et  $q$  deux projecteurs d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ , tels que  $p \circ q = 0$ . Soit  $r = p + q - q \circ p$ .

Montrer que  $r$  est un projecteur, et en déterminer l'image et le noyau.

### Exercice 10 :

Soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie, et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $f^n = \text{Id}_E$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ).

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$ , et  $p$  un projecteur de  $E$  tel que  $\text{Im } p = F$ .

Montrer que :  $q = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f^k \circ p \circ f^{n-k}$  est un projecteur de  $E$ , d'image  $F$

(on pourra remarquer que, pour tout  $\ell \in \mathbb{Z}$ ,  $p \circ f^\ell \circ p = f^\ell \circ p$ ).

### Exercice 11 :

Soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On suppose qu'il existe un projecteur  $p$  de  $E$  tel que  $u = p \circ u - u \circ p$ .

- Montrer que  $u(\text{Ker } p) \subset \text{Im } p$  et  $\text{Im } p \subset \text{Ker } u$ .
- En déduire  $u^2 = 0$ .
- Réciproque ?

### Exercice 12 :

Soient  $p$  et  $q$  deux projecteurs d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ .

a) Montrer que  $p$  et  $q$  ont même noyau si et seulement si  $p \circ q = p$  et  $q \circ p = q$ .

b) Énoncer une condition nécessaire et suffisante similaire pour que  $p$  et  $q$  aient même image.

### Exercice 13 :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$ , tel que  $u^2 - 3u + 2\text{Id}_E = 0$ .

a) Montrer que  $u$  est inversible et exprimer son inverse en fonction de  $u$ .

b) Montrer que  $E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(u - 2\text{Id}_E)$ .

c) On note  $p$  (resp.  $q$ ) le projecteur sur  $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$  (resp.  $\text{Ker}(u - 2\text{Id}_E)$ ) parallèlement à  $\text{Ker}(u - 2\text{Id}_E)$  (resp.  $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$ ).

Montrer que  $u = p + 2q$ .

d) Calculer  $u^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  puis pour  $n \in \mathbb{Z}$  en fonction de  $p$  et  $q$ .

### Exercice 14 :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$ , tel que  $u^3 = u^2 + 2u$ . Soient :  $E_1 = \text{Ker}(u)$ ,  $E_2 = \text{Ker}(u + \text{Id}_E)$ ,  $E_3 = \text{Ker}(u - 2\text{Id}_E)$ .

a) Montrer que  $E = E_1 \oplus E_2 \oplus E_3$ .

b) On note  $p_1, p_2, p_3$  les projecteurs associés à cette somme directe ( $p_1$  projection sur  $E_1$  de direction  $E_2 \oplus E_3$ , etc...).

Montrer qu'il existe des réels  $a_n, b_n$  et  $c_n$ , que l'on déterminera, tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u^n = a_n p_1 + b_n p_2 + c_n p_3.$$

c) Montrer qu'il existe des réels  $a'_n, b'_n$  et  $c'_n$ , que l'on déterminera, tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u^n = a'_n \text{Id}_E + b'_n u + c'_n u^2.$$

### Exercice 15 :

Soient  $f_1, \dots, f_n$  des endomorphismes d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  vérifiant :

$$f_1 + \dots + f_n = \text{Id}_E \text{ et } f_i \circ f_j = 0 \text{ si } i \neq j.$$

- a) Montrer que chaque  $f_i$  est une projection vectorielle.  
 b) Montrer que  $\bigoplus_{i=1}^n \text{Im} f_i = E$ .

**Exercice 16 :**

Soient  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$  et  $v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$  tels que  $u \circ v$  soit un projecteur de rang 2 de  $\mathbb{R}^3$ .

Comparer  $\text{Im}(u \circ v)$  et  $\text{Im} u$  et en déduire  $v \circ u = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ .

**Exercice 17 :**

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n$ . Soient  $f, g \in \mathcal{L}(E)$  tels que

$$f + g = \text{Id}_E \text{ and } rgf + rgg \leq n.$$

Montrer que  $f$  et  $g$  sont des projecteurs.

**Exercice 18 :**

Déterminer une base du noyau et de l'image des applications linéaires suivantes :

- a)  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  définie par  $f(x, y, z) = (y - z, z - x, x - y)$ .  
 b)  $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  définie par  $f(x, y, z, t) = (2x + y + z, x + y + t, x + z - t)$ .  
 c)  $f : C \rightarrow C$  définie par  $f(z) = z + iz$  ( $C$  est ici vu comme un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel).

**Exercice 19 :**

Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et  $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Montrer que  $\text{Im}(u+v) \subset \text{Im} u + \text{Im} v$  et  $\text{Ker} u \cap \text{Ker} v \subset \text{Ker}(u+v)$ .

Montrer par des exemples que ces inclusions peuvent être strictes.

**Exercice 20 :**

Soit  $E = \mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$  et  $T$  l'application définie sur  $E$  par :

$$\forall x \in [0; 1], T(f)(x) = \int_0^x f(4(t - t^2)) dt.$$

- a) Montrer que  $T$  est un endomorphisme de  $E$ .  
 b) Déterminer  $\text{Ker } T$ .

- c)  $T$  est-il surjectif ?

**Exercice 21 :**

Soient  $u$  et  $v$  deux endomorphismes d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ , qui commutent ( $u \circ v = v \circ u$ ).

Montrer que  $\text{Im } u$  et  $\text{Ker } u$  sont stables par  $v$ .

**Exercice 22 :**

Soient  $f$  et  $g$  deux endomorphismes d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  tels que  $f \circ g \circ f = f$  et  $g \circ f \circ g = g$ .

a) Montrer que  $E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } g = \text{Ker } g \oplus \text{Im } f$ .

b) Montrer que  $f(\text{Im } g) = \text{Im } f$ .

**Exercice 23 :**

Soient  $E, F, G$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies.

1. Soient  $u \in \mathcal{L}(E, G)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ .

Démontrer :  $\exists w \in \mathcal{L}(E, F)$  tq  $u = v \circ w \iff [\text{Im } u \subset \text{Im } v]$ .

2. Soient  $u \in \mathcal{L}(E, G)$  et  $w \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Démontrer :  $\exists v \in \mathcal{L}(F, G)$  tq  $u = v \circ w \iff [\text{Ker } w \subset \text{Ker } u]$ .

\*(Indication : penser à utiliser le théorème d'isomorphisme)\*.

**Exercice 24 :**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, E)$  tels que  $u \circ v = \text{Id}_F$ .

Montrer que :  $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } v$ .

**Exercice 25 :**

Soit  $u$  un endomorphisme d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $E$ .

Démontrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i)  $\text{Im } u = \text{Im } u^2$  ;

(ii)  $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2$  ;

(iii)  $E = \text{Im } u \oplus \text{Ker } u$ . Contre-exemple si  $E$  n'est pas de dimension finie ?

**Exercice 26 :**

Soit  $f$  un endomorphisme d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  vérifiant  $f^3 = \text{Id}$ .

Montrer que :  $\text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Im}(f - \text{Id}) = E$ .

**Exercice 27 :**

Soit  $E$  un  $C$ -espace vectoriel, et  $f$  un endomorphisme de  $E$  tel que  $f^3 = \text{Id}_E$ . Pour tout  $\lambda \in C$  on note  $E_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$ .

Montrer que  $E = E_1 \oplus E'_1 \oplus E'_2$ .

**Exercice 28 :**

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie  $n$ .

Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i)  $\dim F + \dim G = n$  ;
- (ii) il existe  $u \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $\text{Im} u = F$  et  $\text{Ker} u = G$ .

**Exercice 29 :**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \geq 1$  et  $f$  un endomorphisme de  $E$ . Pour tout  $p \in \mathbb{N}$ , on pose  $I_p = \text{Im} f^p$  et  $N_p = \text{Ker} f^p$ .

a) Montrer que la suite  $(I_p)_{p \geq 0}$  est décroissante (pour l'inclusion) et que la suite  $(N_p)_{p \geq 0}$  est croissante.

b) Montrer qu'il existe  $s \in \mathbb{N}$  tel que  $I_{s+1} = I_s$  et  $N_{s+1} = N_s$ .

c) Soit  $r$  le plus petit des entiers  $s$  ci-dessus considérés. Montrer que

$$\forall s \geq r, I_s = I_r \text{ et } N_s = N_r.$$

d) Montrer que  $I_r$  et  $N_r$  sont supplémentaires dans  $E$ .

En déduire qu'il existe une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  dans laquelle la matrice  $A$  de  $u$  s'écrit, par blocs :

$$A = \begin{bmatrix} A' & 0 \\ 0 & N \end{bmatrix},$$

où  $A'$  est une matrice carrée inversible et  $N$  une matrice carrée nilpotente.

**Exercice 30 :**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$ , et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $f^3 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

Montrer que  $\text{rg}(f^2) \leq \frac{n}{2}$ .

**Exercice 31 :**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$  tels que  $u \circ v = 0$  et  $u + v$  est inversible.

Montrer que  $n = \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$ .

**Exercice 32 :**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Soient  $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ . Démontrer l'équivalence suivante :

$$\text{rg}(u + v) = \text{rg} u + \text{rg} v \iff \begin{cases} \text{Im} u \cap \text{Im} v = \{0\} \\ \text{et} \\ E = \text{Ker} u + \text{Ker} v. \end{cases}$$

**Exercice 33 :**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies, et  $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ . Montrer que :

$$|\text{rg} u - \text{rg} v| \leq \text{rg}(u + v) \leq \min(\dim E, \dim F, \text{rg} u + \text{rg} v).$$

**Exercice 34 :**

Soient  $E, F, G$  trois  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies,  $u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G)$ . Établir :

a)  $\dim(\text{Im} u \cap \text{Ker} v) = \text{rg} u - \text{rg}(v \circ u)$ .

b)  $\dim(\text{Ker}(v \circ u)) \leq \dim(\text{Ker} u) + \dim(\text{Ker} v)$ .

c)  $\text{rg} v + \text{rg} u - \dim F \leq \text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg} u, \text{rg} v)$ .

\*(Indication : appliquer le théorème du rang à la restriction de  $v$  à  $\text{Im } u$ )\*.

### Exercice 35 :

Soient  $E$  et  $F$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On se donne  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ , une famille  $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$  de sous-espaces vectoriels de  $E$  et une famille  $(F_j)_{1 \leq j \leq p}$  de sous-espaces vectoriels de  $F$ .

- Montrer que :  $f(\sum_{i=1}^n E_i) = \sum_{i=1}^n f(E_i)$ .
- Montrer que si  $f$  est injective et si la somme des  $E_i$  est directe, alors la somme des  $f(E_i)$  est directe.
- Montrer que :  $f^{-1}(\sum_{j=1}^p F_j) \supset \sum_{j=1}^p f^{-1}(F_j)$ . Montrer que cette inclusion peut être stricte.

Donner une condition suffisante pour qu'il y ait égalité.

### Exercice 36 :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et soient  $f, g \in \mathcal{L}(E)$  tels que :  $f^2 + f \circ g = \text{Id}_E$ . Montrer que  $f$  et  $g$  commutent (\*on pourra commencer par démontrer que  $f$  est bijective\*).

### Exercice 37 :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \geq 1$  et  $f$  un endomorphisme nilpotent non nul de  $E$ . Soit  $p$  le plus petit entier tel que  $f^p = 0$ .

- Soit  $x \notin \text{Ker } f^{p-1}$ .  
Montrer que la famille  $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{p-1}(x))$  est libre.
- En déduire que  $f^n = 0$ .
- Soient  $u, v$  deux endomorphismes de  $E$  tels que  $(u \circ v)^n = 0$ . Montrer que  $(v \circ u)^n = 0$ .

### Exercice 38 :

Soient  $E, F, G$  trois  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G)$  et  $w = v \circ u$ .

Montrer que  $w$  est un isomorphisme si et seulement si :  $u$  est in-

jective,  $v$  est surjective et  $\text{Im } u \oplus \text{Ker } v = F$ .

### Exercice 39 :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

- On suppose que pour tout  $x \in E$ , la famille  $\{x, u(x)\}$  est liée.
  - Justifier que pour tout  $x \in E$ , il existe  $\lambda_x \in \mathbb{K}$  tel que  $u(x) = \lambda_x x$ .
  - Montrer que pour tout couple de vecteurs non nuls  $x$  et  $y$ , on a  $\lambda_x = \lambda_y$  (on pourra distinguer les cas :  $(x, y)$  liée ou  $(x, y)$  libre.)
  - Conclure que  $u$  est une homothéte vectorielle.
- En déduire le centre de  $\mathcal{L}(E)$ , c'est-à-dire l'ensemble des endomorphismes  $v \in \mathcal{L}(E)$  tels que :

$$\forall u \in \mathcal{L}(E), u \circ v = v \circ u.$$

### Exercice 40 :

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et soient  $a_0, a_1, \dots, a_n$   $n+1$  scalaires deux à deux distincts. On considère les polynômes d'interpolation de Lagrange :

$$\forall j \in [0; n], \quad L_j = \prod_{i=0}^n \left( \frac{X - a_i}{a_j - a_i} \right).$$

Déterminer le polynôme  $\sum_{j=0}^n a_j^k L_j$  lorsque  $k \in [0; n]$ , puis pour  $k = n+1$ .

### Exercice 41 :

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et soient  $a_0, a_1, \dots, a_n$   $n+1$  scalaires deux à deux distincts.

Pour  $P \in \mathbb{K}[X]$ , déterminer le reste dans la division euclidienne de  $P$  par  $\prod_{i=1}^n (X - a_i)$ .

### Exercice 42 :

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et soient  $a_0, a_1, \dots, a_n$   $n+1$  scalaires deux à deux distincts.

Soit  $E$  l'espace vectoriel des applications de  $\mathbb{K}$  dans  $\mathbb{K}$ , et  $F$  le sous-ensemble formé des applications  $f$  telles que :

$$f(a_0) = f(a_1) = \dots = f(a_n) = 0.$$

Montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , et en déterminer un supplémentaire.

### Exercice 43 :

On considère  $n + 1$  nombres complexes deux à deux distincts  $x_0, \dots, x_n$  et  $2n + 2$  nombres complexes  $y_0, y'_0, \dots, y_n, y'_n$ .

Montrer qu'il existe un unique polynôme  $H \in \mathbb{C}_{2n+1}[X]$  vérifiant :

$$\forall k \in [0; n], \quad H(x_k) = y_k \text{ et } H'(x_k) = y'_k$$

(c'est le polynôme d'interpolation de Hermite).

### Exercice 44 :

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $r$  un réel  $> 0$  fixé.

Démontrer qu'il existe un et un seul polynôme  $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$  tel que  $P(k) = r^k$  pour tout  $k \in [1; n]$ , puis calculer  $P(n + 1)$  (Indication : utiliser un résultat de l'exercice 2).

### Exercice 45 :

Soit  $H$  un hyperplan d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  (pas nécessairement de dimension finie!). Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  contenant  $H$ . Montrer que  $F = H$  ou  $F = E$ .

### Exercice 46 :

Montrer que les formes linéaires  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$  définies sur  $\mathbb{R}^3$  par :

$$\varphi_1(x, y, z) = 2x - y + 2z, \quad \varphi_2(x, y, z) = 3x - 5y + z,$$

$$\varphi_3(x, y, z) = 4x - 7y + z$$

forment une base de  $(\mathbb{R}^3)^*$ .

### Exercice 47 :

Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une famille de vecteurs d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que

$$\forall f \in E^*, f(e_1) = \dots = f(e_n) = 0 \Rightarrow f = 0.$$

Montrer que  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ .

### Exercice 48 :

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $(f_1, f_2, \dots, f_n)$  une famille de formes linéaires sur  $E$ . On suppose qu'il existe un vecteur  $x \in E$  non nul tel que pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $f_i(x) = 0$ .

Montrer que la famille  $(f_1, f_2, \dots, f_n)$  est liée dans  $E^*$ .

