



msu.eps

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Отчёт по практикуму

«Быстрое преобразование Фурье»

Студент 315 группы
В. А. Сливинский

Руководители практикума
к.ф.-м.н., доцент И. В. Рублёв
к.ф.-м.н., доцент П. А. Точилин

Москва, 2017

Содержание

1	Постановка задачи	3
1.1	Общая формулировка задачи	3
1.2	Формальная постановка задачи	3
2	Вычисление аналитических преобразований Фурье	4
2.1	Некоторые необходимые обозначения и соотношения	4
2.2	Вычисление аналитического преобразования Фурье функции $f_1(t) = e^{-2 t } \cos(t)$	6
2.3	Вычисление аналитического преобразования Фурье функции $f_2(t) = \frac{e^{- t }-1}{t}$	6

1 Постановка задачи

1.1 Общая формулировка задачи

Дана система функций (всюду далее, если не сказано противное, предполагается, что $f(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и функция суммируема и обладает достаточной гладкостью)

$$\begin{cases} f_1(t) = e^{-2|t|} \cos(t) \\ f_2(t) = \frac{e^{-|t|} - 1}{t} \\ f_3(t) = \frac{\operatorname{arctg} t^2}{1 + t^4} \\ f_4(t) = t^3 e^{-t^4} \end{cases} \quad (1.1)$$

Для каждой функции из системы (1.1) требуется:

1. Получить аппроксимацию преобразования Фурье $F(\lambda)$ для каждой функции $f(t)$ из заданного набора при помощи быстрого преобразования Фурье (**БПФ** / **FFT**), выбирая различные шаги дискретизации исходной функции и различные окна, ограничивающие область определения $f(t)$
2. Построить графики $F(\lambda)$
3. Для функций $f_1(t)$ и $f_2(t)$ из заданного набора вычислить аналитически преобразование Фурье

$$\mathfrak{F}(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt \quad (1.2)$$

и сравнить графики $\mathfrak{F}(\lambda)$ с графиками $F(\lambda)$, полученного из аппроксимации через **БПФ**

1.2 Формальная постановка задачи

1. Реализовать на языке MATLAB функцию `plotFT(hFigure, fHandle, fFTHandle, step, inpLimVec, outLimVec)` со следующими параметрами:

- **hFigure** — указатель на фигуру, в которой требуется отобразить графики
- **fHandle** — указатель на функцию (**Function Handle**), которую требуется преобразовывать ($f(t)$)
- **fFTHandle** — указатель на функцию (**Function Handle**), моделирующую аналитическое преобразование Фурье (1.2) функции $f(t)$ (может быть пустым вектором, в таком случае график аналитического преобразования строить не требуется)
- **step** — положительное число, задающее шаг дискретизации Δt

- **inpLimVector** — вектор-строка, задающая окно $[a, b]$ для функции $f(t)$, первый элемент вектора содержит a , второй b , причём $a < b$, но не обязательно $a = -b$
- **outLimVector** — вектор-строка, задающая окно $[c, d]$ для вывода графика преобразования Фурье (пределы осей абсцисс). В случае, если передаётся пустой вектор, следует брать установленные в фигуре пределы или определять свои разумным образом

Данная функция строит графики вещественной и мнимой частей численной аппроксимации преобразования Фурье (1.2) функции $f(t)$, заданной в **fHandle** (и, при необходимости, соответствующие графики аналитического преобразования Фурье $\mathfrak{F}(\lambda)$)

Кроме того, данная функция, должна возвращать структуру, содержащую следующие параметры:

- **nPoints** — число вычисляемых узлов сеточной функции, рассчитываемое по формуле:

$$nPoints = \left\lfloor \frac{(b-a)}{step} \right\rfloor$$

- **step** — поправленное значение шага дискретизации Δt , рассчитываемое по формуле:

$$step = \frac{(b-a)}{nPoints}$$

- **inpLimVec** — окно $[a, b]$ для функции $f(t)$
- **outLimVec** — окно для вывода графика преобразования Фурье $F(\lambda)$

2. Построить, используя написанную функцию **plotFT**, для каждой из функций системы (1.1) графики $F(\lambda)$ для разных значений входных параметров (окон **inpLimVec**, **outLimVec** и частоты дискретизации **step**).

В частности, для некоторых функций подобрать параметры так, чтобы проиллюстрировать эффекты *наложения спектра, появления ряби и их устранения* (в случае ряби — в точках непрерывности $F(\lambda)$)

3. Для функций $f_1(t)$ и $f_2(t)$ из системы (1.1) вычислить аналитически их преобразования Фурье $\mathfrak{F}(\lambda)$ и построить их графики вместе с графиками численной аппроксимации $F(\lambda)$

2 Вычисление аналитических преобразований Фурье

2.1 Некоторые необходимые обозначения и соотношения

Напомним, что преобразование Фурье $\mathfrak{F}(\lambda)$ функции $f(t)$ задаётся формулой (1.2):

$$\mathfrak{F}(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt$$

Впредь, будем для краткости писать:

$$\boxed{f(t) \rightarrow \mathfrak{F}(\lambda)}$$

Напомним также следующие свойства преобразования Фурье:

Свойство 2.1. Пусть

$$f(t) = \alpha \cdot f_1(t) + \beta \cdot f_2(t) , \text{ и } \begin{cases} f_1(t) \rightarrow \mathfrak{F}_1(\lambda) \\ f_2(t) \rightarrow \mathfrak{F}_2(\lambda) \end{cases}$$

Тогда:

$$f(t) \rightarrow \alpha \cdot \mathfrak{F}_1(\lambda) + \beta \cdot \mathfrak{F}_2(\lambda)$$

Свойство 2.2. Пусть

$$f(t) = f_1(t) \cdot f_2(t) , \text{ и } \begin{cases} f_1(t) \rightarrow \mathfrak{F}_1(\lambda) \\ f_2(t) \rightarrow \mathfrak{F}_2(\lambda) \end{cases}$$

Тогда:

$$2\pi f_1(t) \cdot f_2(t) \rightarrow (\mathfrak{F}_1 * \mathfrak{F}_2)(\lambda) , \text{ где } (\mathfrak{F}_1 * \mathfrak{F}_2)(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} [\mathfrak{F}_1(\lambda - s) \cdot \mathfrak{F}_2(s)] ds$$

Отметим некоторые тривиальные преобразования Фурье:

$$\delta(\lambda) \rightarrow 1 \tag{2.1}$$

$$1 \rightarrow 2\pi\delta(\lambda) \tag{2.2}$$

$$e^{iat} \rightarrow 2\pi\delta(\lambda - a) \tag{2.3}$$

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \rightarrow \pi(\delta(\lambda - 1) + \delta(\lambda + 1)) \tag{2.4}$$

$$\frac{1}{t} \rightarrow -i\pi \operatorname{sgn}(t) \tag{2.5}$$

Где $\delta(t) = \begin{cases} +\infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$ — дельта-функция Дирака, а соотношение (2.4) вытекает из свойства 2.1, с учётом (2.3).

Установим также важные отношения для свёртки дельта-функции с произвольной функцией $\varphi(t)$:

$$\boxed{(\delta * \varphi)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(s - \tau) \cdot \varphi(\tau) d\tau = \varphi(s)} \tag{2.6}$$

Докажем следующее соотношение:

Лемма 2.1.

$$e^{-A|t|} \rightarrow \frac{2A}{A^2 + \lambda^2} \quad (2.7)$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-A|t|} \cdot e^{-i\lambda t} dt &= \int_{-\infty}^0 e^{(A-i\lambda)t} dt + \int_0^{+\infty} e^{-(A+i\lambda)t} dt = \\ &= \left[e^{(A-i\lambda)t} \cdot \frac{1}{A-i\lambda} \right]_{t=-\infty}^0 - \left[e^{-(A+i\lambda)t} \cdot \frac{1}{A+i\lambda} \right]_{t=0}^{+\infty} = \\ &= \frac{1}{A-i\lambda} + \frac{1}{A+i\lambda} = \frac{2A}{A^2 + \lambda^2} \end{aligned}$$

■

2.2 Вычисление аналитического преобразования Фурье функции $f_1(t) = e^{-2|t|} \cos(t)$

Преобразование Фурье $\mathfrak{F}_1(\lambda)$ функции $f_1(t) = e^{-2|t|} \cos(t)$ задаётся формулой:

$$\mathfrak{F}_1(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2|t|} \cos(t) e^{-i\lambda t} dt$$

Утверждение.

$$\boxed{\mathfrak{F}_1(\lambda) = \frac{4(\lambda^2 + 5)}{\lambda^4 + 6\lambda^2 + 25}} \quad (2.8)$$

Доказательство: Заметим, что $f_1(t)$ представима в виде:

$$f_1(t) = g_1(t) \cdot g_2(t), \text{ где } g_1(t) = e^{-2|t|}, g_2(t) = \cos(t) \quad (2.9)$$

Пользуясь этим соотношением, выражениями для преобразований Фурье $g_1(t)$ (2.7) и $g_2(t)$ (2.4), установленным свойством 2.2 и соотношением (2.6) для свёртки с дельта-функцией, получим:

$$\begin{aligned} \mathfrak{F}_1(\lambda) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4}{4 + \tau^2} \cdot \pi(\delta(\lambda - \tau - 1) + \delta(\lambda + 1 - \tau)) d\tau = \\ &= \frac{2}{4 + (\lambda - 1)^2} + \frac{2}{4 + (\lambda + 1)^2} = \frac{4(\lambda^2 + 5)}{\lambda^4 + 6\lambda^2 + 25} \end{aligned}$$

■

2.3 Вычисление аналитического преобразования Фурье функции $f_2(t) = \frac{e^{-|t|}-1}{t}$

Преобразование Фурье $\mathfrak{F}_2(\lambda)$ функции $f_2(t) = \frac{e^{-|t|}-1}{t}$ задаётся формулой:

$$\mathfrak{F}_2(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-|t|}-1}{t} e^{-i\lambda t} dt$$

Утверждение.

$$\boxed{\mathfrak{F}_2(\lambda) = i(\pi \operatorname{sgn}(\lambda) - 2 \operatorname{arctg}(\lambda))} \quad (2.10)$$

Доказательство: Аналогично (2.9) представим $f_2(t)$ в виде:

$$f_2(t) = g_1(t) \cdot g_2(t) \text{ где } g_1(t) = (e^{-|t|} - 1), g_2(t) = \frac{1}{t} \quad (2.11)$$

Пользуясь установленными свойствами 2.1, 2.2, выражениями для преобразований Фурье $g_1(t)$ (2.7), (2.2) и $g_2(t)$ (2.5) и соотношением (2.6) для свёртки с дельта-функцией, получим:

$$\begin{aligned} f_2(t) \rightarrow \mathfrak{F}_2(\lambda) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-|t|} - 1}{t} e^{-i\lambda t} dt = \frac{1}{\pi} \left[\left(\frac{1}{1 + (\cdot)^2} - \pi \delta(\cdot) \right) * (-i\pi \operatorname{sgn}(\cdot)) \right](\lambda) = \\ &= -i \int_{\lambda}^{+\infty} \frac{1}{1 + \tau^2} d\tau + i \int_{-\infty}^{\lambda} \frac{1}{1 + \tau^2} d\tau + \pi i \operatorname{sgn}(\lambda) = \\ &= i(\pi \operatorname{sgn}(\lambda) + 2 \operatorname{arctg}(\lambda)) \end{aligned}$$

■