


<b>plan</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
$a_0$	(0,0)	(1,0)	(2,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)
$a_2$	(0,0)	(1,0)	(2,0)
$a_3$	(0,0)	(1,0)	(2,0)




$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

$$spt_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

**Algorithm 1** An algorithm with caption

[illegible]

---

**Algorithm 2** An algorithm with caption

[illegible]



Figure 3: West rance psychologist authors gravitate to the cat thinks o the Sea