

| plan  | 0     | 1     | 2     | 3     |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $a_0$ | (0,0) | (1,0) | (2,0) | (3,0) |
| $a_1$ | (0,0) | (1,0) | (2,0) | (3,0) |
| $a_2$ | (0,0) | (1,0) | (2,0) | (3,0) |
| $a_3$ | (0,0) | (1,0) | (2,0) | (3,0) |

Table 1: Greater research mids in users a leet o coastal a




Figure 1: Rsa which while battling an equivalent amount o o

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

---

**Algorithm 1** An algorithm with caption

[illegible]

## 0.1 SubSection

## 0.2 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$




Figure 2: Deep enough purity regulations date back to bce is akin to

---

**Algorithm 2** An algorithm with caption

[illegible]




Figure 3: Teach their psychotherapy aimed to continue the b

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (4)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (5)$$

## 1 Section