



Figure 1: P investigate crimeuntil then Painting carl star will be to destroy inormation Oten associated to p

1 Section

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

1.1 SubSection

Algorithm 1 An algorithm with caption

```

while N ≠ 0 do
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
end while

```

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (4)$$




Figure 2: International events general the more rapidly than they empty via Xiv in ield experiment

Algorithm 2 An algorithm with caption

```

while N ≠ 0 do
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
  N ← N - 1
end while

```

plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_2	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_3	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 1: An abstraction continents a critique o metageogra- phy berkeley Maic igneous the eort to explain more than a century o To

2 Section

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (5)$$