




plan	0	1	2	3
$a_0$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_2$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_3$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$



<b>plan</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
$a_0$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_2$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_3$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 2: The crescent chile across the Asian weekly and mi

---

**Algorithm 1** An algorithm with caption

**while**  $N \neq 0$  **do**
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$

end while

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (4)$$