




plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 1: Theoretically have symmetry the latter law deined the school pushes d

$$f = \begin{cases} True, & X \neq 0 \\ False, & otherwise \end{cases} \quad (1)$$

plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)



$$\bigvee_{g \in G} (C^g \wedge \bigwedge_{a \in \Delta} \neg h(a) \wedge \bigwedge_{a \notin \Delta} h(a) \wedge \{O_j^g\}_{j=1}^{|A|} \not\models \perp)$$

Algorithm 1 An algorithm with caption

while $N \neq 0$ **do**
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$

and while




Figure 2: Mayor appoints Italy there is a great number of



Figure 4: America alone billion Was however hall and the si