

Первые эпидемиологические данные по венотоникам при беременности (EFEMERIS)

Авторы:

Lacroix I, Beau AB, Hurault-Delarue C, Bouilhac C, Petiot D, Vayssiere C, Vidal S, Montastruc JL, Damase-Michel C.

Оригинальное название:

First epidemiological data for venotonics in pregnancy from the EFEMERIS database.

Журнал:

Phlebology. 2016 Jun; 31(5): 344-348. Epub 2015 Jun 9.

PMID: 26060062 | DOI: 10.1177/0268355515589679

PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26060062/>

Дизайн исследования

Эпидемиологическое когортное исследование.

Источник: база данных EFEMERIS (Франция, 2004–2007).

Популяция

- 8 998 женщин (24%) получали хотя бы один рецепт на венотоники во время беременности
- 1 200 из них — экспозиция в период органогенеза
- Контрольная группа: 27 963 неэкспонированных женщины

Наиболее часто использовались: гесперидин, диосмин, троксерутин.

Ключевые результаты безопасности

Параметр	Экспонированные	Контроль
Живорождение	98.4%	93.6%
Прерывание беременности	1.6%	6.4%

- Риск прерывания беременности НИЖЕ у экспонированных:
HR = 0.71 (95% ДИ: 0.60–0.84)
- Риск преждевременных родов НИЖЕ у экспонированных:
HR = 0.82 (95% ДИ: 0.73–0.93)
- Мальформации при экспозиции в период органогенеза:
3.4% vs 3.0% — ORa = 1.134 (0.873–1.472) — нет значимой разницы

- Неонатальные заболевания при экспозиции в III триместре:
4.9% vs 6.1% — ORa = 1.07 (0.95-1.20) — нет значимой разницы

Вывод: «Не выявлено увеличения риска неблагоприятных исходов беременности у женщин, получавших венотоники, по сравнению с неэкспонированными беременными.»

Значимость

Крупнейшее эпидемиологическое исследование безопасности венотоников (включая диосмин и гесперидин) при беременности. Почти 37 000 женщин. Подтверждает безопасность для матери и плода.