

Вульварный и промежностный варикоз у беременных

Авторы:

Дженина О.В., Богачев В.Ю., Боданская А.Л.

Журнал:

Амбулаторная хирургия. 2019; 1-2: 14-18.

DOI: 10.21518/1995-1477-2019-1-2-14-18

Полный текст PDF: <https://pdfs.semanticscholar.org/7166/a2a3a37d09d82fe52ad3f306c0abc46a9020.pdf>

Популяция

192 беременных женщины с вульварным и промежностным варикозом во II и III триместрах беременности.

Препарат

Диосмин с гесперидином 600 мг/сут.

Данные EFEMERIS (цитируемые в обзоре)

8 998 женщин принимали диосмин, троксерутин и гесперидин во время беременности. Результат: отсутствие негативного влияния на течение беременности, родоразрешение, послеродовой период и развитие плода.

Ключевые результаты

Параметр	Результат
Полное купирование боли	47.29%
Уменьшение боли на ≥ 2 балла	27%
Осложнения беременности/родов	0 из 192
Разрыв вариксов при родах	Не отмечалось
Пороки развития у детей	Не отмечено

Вывод: Современные препараты диосмина с гесперидином безопасны при беременности и целесообразны при болевом синдроме на фоне вульварного/промежностного варикоза.