

# Влияние комбинации гесперидина и диосмина на ремоделирование венозной стенки (исследование «СТАНДАРТ»)

## Авторы:

Сучков И.А., Мжаванадзе Н.Д., Калинин Р.Е., Щулькин А.В., Камаев А.А., Никифоров А.А., Никифорова Л.В., Поваров В.О., Маркитан Г.С., Назимова Е.Ю.

## Журнал:

Флебология. 2024; 18(4): 293-301.

DOI: 10.17116/flebo202418041293

Полный текст: <https://www.mediasphera.ru/issues/flebologiya/2024/4/1199769762024041293>

## Дизайн

Проспективное контролируемое исследование «СТАНДАРТ».

## Препарат

| Компонент  | Значение            |
|------------|---------------------|
| Гесперидин | 100 мг              |
| Диосмин    | 900 мг              |
| Общая доза | 1000 мг/сут (1 раз) |
| Курс       | 6 месяцев           |

## Маркеры ремоделирования венозной стенки (через 6 мес)

| Маркер                         | Снижение    | p      |
|--------------------------------|-------------|--------|
| PAI-1 (ингибитор плазминогена) | >6-кратное  | <0.001 |
| Фибронектин (FN)               | >22-кратное | <0.001 |
| Виментин (VIM)                 | 2-кратное   | 0.042  |
| vWF (фактор фон Виллебранда)   | 3-кратное   | 0.001  |
| PECAM-1 (CD31)                 | 1.5-кратное | <0.001 |

## Симптомы и качество жизни

| Показатель                | Улучшение            |
|---------------------------|----------------------|
| ВАШ (боль)                | 4-кратное снижение   |
| VCSS (тяжесть ХЗВ)        | 3-кратное снижение   |
| CIVIQ-20 (качество жизни) | >4-кратное (p<0.001) |

*Примечание: беременность и лактация были критериями невключения.*

*Исследование демонстрирует молекулярный механизм действия комбинации диосмина с гесперидином на венозную стенку.*