

Domande (qualcuna capziosa e artificiale) per verificare la comprensione del significato di p-valore (ed implicitamente anche del FWER).

N.B. Spesso le domande contengono informazioni irrilevanti.

Quesito 1. Ripetiamo 2 volte lo stesso T-test a due code con campioni di dimensione $n = 25$. Assumendo vera H_0 , qual è la probabilità che in almeno uno di questi test il p-valore risulti ≤ 0.05 ?

Si scelga tra le seguenti opzioni la più opportuna.

1. La probabilità è $= \dots$ (specificare)
2. La probabilità è $< \dots$ (specificare)
3. La probabilità è $> \dots$ (specificare)
4. Non ci sono sufficienti informazioni per stimare questa probabilità.

Risposta 1. La probabilità è $= 1 - (0.95)^2 = 0.0975$.

Quesito 2. Abbiamo fatto un T-test a due code con un campione di dimensione $n = 25$ e abbiamo ottenuto come p-valore 0.05. Assumendo vera H_0 , qual è la probabilità che, ripetendo il test una seconda volta con un campione di dimensione doppia, il p-valore risulti ≤ 0.1 ?

Si scelga tra le seguenti opzioni la più opportuna.

1. La probabilità è $= \dots$ (specificare)
2. La probabilità è $< \dots$ (specificare)
3. La probabilità è $> \dots$ (specificare)
4. Non ci sono sufficienti informazioni per stimare questa probabilità.

Risposta 1. La probabilità è $= 1 - 0.1 = 0.9$.

Quesito 3. Abbiamo fatto un T-test a due code con un campione di dimensione $n = 25$ e abbiamo ottenuto come p-valore 0.05. Assumendo vera H_A , qual è la probabilità che ripetendo il test una seconda volta con un campione della stessa dimensione il p-valore risulti di nuovo ≤ 0.05 ?

Nel caso non sia possibile determinare il valore esatto ma solo un limite superiore/inferiore. Si scelga tra le seguenti opzioni la più opportuna.

1. La probabilità è $= \dots$ (specificare)
2. La probabilità è $< \dots$ (specificare)
3. La probabilità è $> \dots$ (specificare)
4. Non ci sono sufficienti informazioni per stimare questa probabilità.

Risposta 4. Non ci sono sufficienti informazioni per stimare questa probabilità.

Quesito 4. Abbiamo fatto un T-test coda inferiore con un campione di dimensione $n = 25$ e abbiamo ottenuto come p-valore 0.05. Assumendo vera H_A , qual è la probabilità che ripetendo il test una seconda volta con un campione della stessa dimensione il p-valore risulti di nuovo ≤ 0.05 ?

Nel caso non sia possibile determinare il valore esatto ma solo un limite superiore/inferiore. Si scelga tra le seguenti opzioni la più opportuna.

1. La probabilità è $= \dots$ (specificare)
2. La probabilità è $< \dots$ (specificare)
3. La probabilità è $> \dots$ (specificare)
4. Non ci sono sufficienti informazioni per stimare questa probabilità.

Risposta 3. La probabilità è > 0.05 .

Quesito 5. Preleviamo un campione di rango $n = 4$ da una popolazione con distribuzione $N(\mu, \sigma^2)$. Sappiamo che la deviazione standard è $\sigma = 2$. La media μ invece potrebbe avere uno qualsiasi dei tre valori 2, 4, o 7. Vogliamo testare $H_0 : \mu = 4$ contro $H_A : \mu \in \{2, 7\}$.

1. Che test facciamo?
2. Se la media del campione di cui sopra è $\bar{x} = 5$, quant'è il p-valore?
3. Dato questo risultato, la probabilità di $\mu \in \{2, 7\}$ è \dots (si scelga la risposta corretta tra le seguenti)
(a) = p-valore; (b) = $1 - \text{p-valore}$; (c) $2/3$; (d) Non ci sono sufficienti informazioni per rispondere.

Esprimere il risultato numerico tramite (solo) le funzioni elencate in calce.

Risposta

Facciamo uno z-test a due code.

Risposta 1

$$\begin{aligned} \Pr(|\bar{X}| \geq 5) &= \Pr\left(\left|\frac{\bar{X} - 4}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq \frac{|5 - 4|}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Pr(|Z| \geq 1) \\ &= 2 * \text{norm.cdf}(-1) = 0.317 \end{aligned}$$

Risposta 2

(d) Non ci sono sufficienti informazioni per rispondere.

Risposta 3

Quesito 6. Preleviamo un campione di rango $n = 25$ da una popolazione con distribuzione $N(\mu, \sigma^2)$. Sappiamo che la deviazione standard è $\sigma = 5$. La media μ invece potrebbe avere uno qualsiasi dei tre valori 1, 4, o 5.

Vogliamo testare $H_0 : \mu = 1$ contro $H_A : \mu \in \{4, 5\}$.

1. Che test facciamo?
2. Se la media del campione di cui sopra è $\bar{x} = 3$, quant'è il p-valore?

Esprimere il risultato numerico tramite (solo) le funzioni elencate in calce.

Risposta

Facciamo uno z-test coda superiore.

Risposta 1

$$\Pr(\bar{X} \geq 3) = \Pr\left(\frac{\bar{X} - 1}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{3 - 1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Pr(Z \geq 2)$$

$$= 1 - \text{norm.cdf}(2) = 0.046$$

Risposta 2

Quesito 7. Abbiamo un dado con 4 facce numerate da 1 a 4. Sospettiamo che il dado non sia perfettamente equilibrato. Quindi per $i = 1, \dots, 4$ testiamo le seguenti ipotesi: $H_0^{(i)} : p_i = 1/4$ contro $H_A^{(i)} : p_i > 1/4$.

Fissiamo una significatività α e, per $X \sim B(100, 1/4)$, sia k_α tale che $\alpha \approx \Pr(X > k_\alpha)$.

Lanciamo il dado 100 volte e registriamo la frequenza assoluta k_i dell' i -esima faccia. Se per qualche i osserviamo $k_i > k_\alpha$ dichiariamo il dado difettato. Qual è (in funzione di α) la probabilità che il dado venga dichiarato difettato anche se equilibrato? Si risponda per i seguenti 2 scenari

1. I test di ipotesi per $i = 1, \dots, 4$ vengono fatti ciascuno con una serie diversa di 100 lanci
2. La stessa serie di 100 lanci viene usata per tutti test (trascuriamo la possibilità che due test possano essere contemporaneamente positivi).

Risposta

$$1 - (1 - \alpha)^4$$

Risposta 1

$$4\alpha$$

Risposta 2

Quesito 8. Assume the null hypothesis is true and denote by P the random variable that gives the p-value you would get if you ran a test.

1. What is the probability that $\Pr(P < 0.05)$?
2. If we run 4 independent tests, what is the probability of incorrectly rejecting at least one of the null hypotheses with a significance $\alpha = 5\%$?
3. If we run 4 independent tests, how small do we have to make the cutoff (α above) to lower to 5% the probability of incorrectly rejecting at least one of the null hypotheses?

Risposta

$$\Pr(P < 0.05) = 0.05$$

Risposta 1

$$1 - \left(1 - \frac{1}{20}\right)^4 = 0.1855$$

Risposta 2

$$1 - \left(1 - \frac{x}{100}\right)^4 = \frac{1}{20}, \quad \text{risolvendo}$$

$$x = 100 \left(1 - \sqrt[4]{\frac{19}{20}}\right)$$

$$= 1.2741\%$$

Risposta 3

Si assuma noto il valore delle seguenti funzioni della libreria `scipy.stats`

`norm.cdf(z)` = $\Pr(Z < z)$ per $Z \sim N(0, 1)$

`norm.ppf(α)` = z_α dove z_α è tale che $\Pr(Z < z_\alpha) = \alpha$ per $Z \sim N(0, 1)$