

Domande per verificare la comprensione del significato di probabilità condizionata; dei termini che descrivono l'attendibilità dei test diagnostici; della regola di Bayes.

Quesito 1. Tra le persone di cui A è causa del decesso il 40% è fumatore. La percentuale dei fumatori in tutta la popolazione è del 20% e quella dei decessi dovuti ad A è del 5%. Calcolare la probabilità che un fumatore ha di morire per A .

Risposta

F insieme dei fumatori

A insieme persone decedute per A

$\Pr(A) = 5\%$ prevalenza di A nella popolazione

$\Pr(F) = 20\%$ frazione di fumatori nella popolazione

$\Pr(F|A) = 40\%$ prevalenza di A tra i fumatori

$$\Pr(A|F) = \frac{\Pr(F|A) \cdot \Pr(A)}{\Pr(F)} = 10.0\% \quad \text{Risposta}$$

Quesito 2. Tra le persone di cui A è causa del decesso il 60% è fumatore. La percentuale dei fumatori in tutta la popolazione è del 15% e quella dei decessi dovuti ad A è del 10%. Calcolare la probabilità che un *non* fumatore ha di morire per A .

Risposta

F insieme dei fumatori

A insieme persone decedute per A

$\Pr(A) = 10\%$ prevalenza di A nella popolazione

$\Pr(\neg F) = 100\% - \Pr(F) = 85\%$ frazione di fumatori nella popolazione

$\Pr(\neg F|A) = 100\% - \Pr(F|A) = 40\%$ prevalenza di A tra i fumatori

$$\Pr(A|\neg F) = \frac{\Pr(\neg F|A) \cdot \Pr(A)}{\Pr(\neg F)} = 0.05\% \quad \text{Risposta}$$

Quesito 3. A common blood test indicates the presence of a disease 96% of the time when the disease is actually present in an individual and 1% of the time when the disease is not present. The prevalence of the disease is 6%.

1. What is the sensitivity of the test?
2. What is the specificity of the test?
3. What is the positive predictive value of the test?

Risposta

| | | |
|--|--|----------------------------|
| A | insieme delle persone affette | |
| T_+ | insieme delle persone positive al test | |
| T_- | insieme delle persone negative al test | |
| $\Pr(A) = 6\%$ | prevalenza | |
| $\Pr(\neg A) = 1 - \Pr(A) = 94\%$ | | |
| $\Pr(T_+ A) = 96\%$ | sensitività | Risposta 1 |
| $\Pr(T_+ \neg A) = 1\%$ | probabilità falsi positivi | |
| $\Pr(T_- \neg A) = 1 - \Pr(T_+ \neg A) = 99\%$ | specificità | Risposta 2 |
| $\Pr(T_+) = \Pr(T_+ A) \Pr(A) + \Pr(T_+ \neg A) \Pr(\neg A) = 6.7\%$ | | |
| $\Pr(A T_+) = \frac{\Pr(T_+ A) \Pr(A)}{\Pr(T_+)} = 86.0\%$ | valore predittivo positivo | Risposta 3 |

Quesito 4. A common blood test indicates the presence of a disease 96% of the time when the disease is actually present in an individual and 1% of the time when the disease is not present. The prevalence of the disease is 5%.

1. What is the probability that a person that is chosen at random from the general population is positive to the test?
2. What is the positive predictive value of the test?

Risposta

| | | |
|--|--|----------------------------|
| A | insieme delle persone affette | |
| T_+ | insieme delle persone positive al test | |
| $\Pr(A) = 5\%$ | prevalenza | |
| $\Pr(\neg A) = 1 - \Pr(A) = 95\%$ | | |
| $\Pr(T_+ A) = 96\%$ | sensitività | |
| $\Pr(T_+ \neg A) = 1\%$ | | |
| $\Pr(T_+) = \Pr(T_+ A) \Pr(A) + \Pr(T_+ \neg A) \Pr(\neg A) = 5.8\%$ | | Risposta 1 |
| $\Pr(A T_+) = \frac{\Pr(T_+ A) \Pr(A)}{\Pr(T_+)} = 83.5\%$ | | Risposta 2 |

Quesito 5. Marie is getting married tomorrow at an outdoor ceremony in the desert. In recent years it has rained only 8 days each year. But the weatherman has predicted rain for tomorrow. When it actually rains, the weatherman correctly forecasts rain 85% of the time. When it doesn't rain, he incorrectly forecasts rain 5% of the times. What is the probability that it will rain on the day of Marie's wedding?

Risposta

R event: it rains on Marie's wedding

T_+ event: the weatherman predicts rain

$\Pr(R) = 8/365 = 2.2\%$ it rains 8 days out of 365

$\Pr(T_+|R) = 85\%$ when it rains, rain is predicted

$\Pr(T_+|\neg R) = 5\%$ when it does not rain, rain is predicted

$\Pr(T_+) = \Pr(T_+|R) \cdot \Pr(R) + \Pr(T_+|\neg R) \cdot \Pr(\neg R) = 6.8\%$

$\Pr(R|T_+) = \frac{\Pr(R) \cdot \Pr(T_+|R)}{\Pr(T_+)} = 27.6\%$ Risposta

Quesito 6. Abbiamo 35 monete di cui 28 sono equilibrate, le altre sono difettose e hanno probabilità 0.6 di dare come risultato **Testa**. Scegliamo a caso una di queste 35 monete. Per decidere se è equilibrata o no, la lanciamo 30 volte. Se otteniamo ≥ 18 volte **Testa** diremo che è equilibrata. Qual è la probabilità di dichiarare equilibrata una moneta che non lo è? Dei seguenti dati si usino quelli pertinenti

$\Pr(X \geq 18) = 0.181$ se $X \sim B(30, 0.5)$

$= 0.578$ se $X \sim B(30, 0.6)$

$= 0.5$ se $X \sim B(35, 0.5)$

$= 0.886$ se $X \sim B(35, 0.6)$

Risposta

D insieme degli esperimenti fatti con monete sbilanciate

$T_{\geq 18}$ insieme degli esperimenti con risultato ≥ 18

$\Pr(D) = 0.2$ prevalenza

$\Pr(\neg D) = 1 - \Pr(D) = 0.8$


$\Pr(T_{\geq 18}|\neg D) = 0.181$

$\Pr(T_{\geq 18}|D) = 0.578$

$\Pr(T_{\geq 18}) = \Pr(T_{\geq 18}|D) \Pr(D) + \Pr(T_{\geq 18}|\neg D) \Pr(\neg D) = 0.26$

$\Pr(\neg D | T_{\geq 18}) = \frac{\Pr(T_{\geq 18}|\neg D) \Pr(\neg D)}{\Pr(T_{\geq 18})} = 0.444$ Risposta

Quesito 7. Un rospo vive in uno stagno e passa le sue giornate su tre foglie di ninfea che indichiamo con a, b, e c. Ogni ora salta da una all'altra con probabilità riassunte nel diagramma sottostante (la probabilità di restare nello stesso punto è lasciata implicita).



Se guardiamo in un momento qualsiasi troveremo il rospo in a, b, o c con probabilità rispettivamente $\frac{11}{28}$, $\frac{25}{112}$, e $\frac{43}{112}$. Supponiamo di osservare il rospo in a al tempo $t = 1$.

1. Qual è la probabilità che al tempo $t = 2$ il rospo si trovi in b ?
2. Qual è la probabilità che al tempo $t = 0$ il rospo fosse in c ?

Risposta

Siano R_t le variabili aleatorie che danno la posizione del rospo al tempo t .

Dal testo leggiamo $\Pr(R_t = a) = 11/28$, $\Pr(R_t = b) = 25/112$, e $\Pr(R_t = c) = 43/112$

Dal diagramma leggiamo

$$\Pr(R_{t+1} = a \mid R_t = b) = 1/5$$

Risposta 1

$$\Pr(R_{t+1} = c \mid R_t = a) = 2/5$$

Quindi

$$\begin{aligned} \Pr(R_0 = c \mid R_1 = a) &= \frac{\Pr(R_1 = a \mid R_0 = c) \cdot \Pr(R_0 = c)}{\Pr(R_1 = a)} = \frac{(2/5) \cdot (43/112)}{11/28} \\ &= 43/110 \end{aligned}$$

Risposta 2