Domande per verificare la comprensione del significato di errori del II tipo e di potenza.

N.B. Spesso le domande contengono informazioni irrilevanti.

Quesito 1. Consideriamo una popolazione normale con $\sigma = 6$ e media $\mu \in \{2, 5, 9\}$ ignota.

Vogliamo testare $H_0: \mu = 5$ contro $H_A: \mu \in \{2, 9\}$. Preleviamo un campione di rango n = 16 e decidiamo di rifiutare H_0 se la media campionaria \bar{x} non appartiene all'intervallo [4, 6].

- 1. Qual è la significatività del test?
- 2. Qual è la potenza del test?

Esprimere il risutato numerico tramite (solo) le funzioni elencate in calce.

Risposta

$$norm.cdf(4/3) + norm.cdf(-8/3)$$
 Risposta 2

Quesito 2. Preleviamo un campione di rango n=9 da una popolazione con distribuzione $N(\mu, \sigma^2)$. Sappiamo che la deviazione standard è $\sigma=3$. La media μ invece potrebbe avere uno qualsiasi valori dei nell'intervallo [1, 4].

Vogliamo testare $H_0: \mu = 1$ contro $H_A: \mu \in (1,4]$. Fissiamo come significatività $\alpha = 0.1$ otteniamo che per uno z-test a coda superiore l'intervallo critico è $[2.282, +\infty)$.

- 1. Nel caso $H_A: \mu \in (3, 4]$ qual'è la massima probabilità β di non rigettare H_0 (errore II tipo)?
- 2. Calcolare la potenza del test con l'effect-size suggerito nel punto precedente.

Esprimere il risutato numerico tramite (solo) le funzioni elencate in calce.

Risposta

$$\beta = \text{norm.cdf}(-0.718)$$
 Risposta 1

1 - norm.cdf(-0.718)

Risposta 2

Quesito 3. Vogliamo testare $H_0: \mu = \mu_0$ contro $H_A: \mu > \mu_0$ per una popolazione distribuita normalmente con deviazione standard nota σ . Fissiamo una significatività α e una potenza $1 - \beta$. L'effect-size che ci interessa è δ . Esprimere, in funzione dei parametri che assumiamo noti, le condizioni cui deve soddisfare il rango n del campione.

Risposta

Il rango necessario è il minimo ntale che $\Pr\left(Z<\frac{x_\alpha-\mu_0-\delta}{\sigma/\sqrt{n}}\right)\leq \beta$

dove
$$x_{\alpha}$$
 tale che $\Pr\left(Z \geq \frac{x_{\alpha} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \alpha$

Risposta

Si assuma noto il valore delle seguenti funzioni della libreria scipy.stats

$$\mathtt{norm.cdf(z)} = \Pr \left(Z < \mathtt{z} \right) \, \mathrm{per} \, \, Z \sim N(0,1)$$

 $\operatorname{\mathtt{norm.ppf}}(lpha) = z_lpha \ \operatorname{dove} z_lpha \ \operatorname{\grave{e}} \ \operatorname{tale} \ \operatorname{che} \Pr ig(Z < z_lpha ig) = lpha \ \operatorname{per} \, Z \sim N(0,1)$