

Теорвер. Домашнее задание №3

Случайные величины

Латыпов Владимир

1 марта 2023 г.

1. Каким идти на экзамен

У первого: $\frac{n}{N}$.

У второго:

$$p_{\text{first is lucky}} \cdot \frac{n-1}{N-1} + p_{\text{first isn't lucky}} \cdot \frac{n}{N-1} = \frac{n}{N} \cdot \frac{n-1}{N-1} + \frac{N-n}{N} \cdot \frac{n}{N-1} = \frac{n}{N} \quad (1.1)$$

Аналогично — у третьего. Странно, если было бы иначе, ведь каждая перестановка равновероятна (обсуждали ещё на дискретке), а количество перестановок с хорошим билетом на месте: $n \cdot (N-1)!$ из всех $N(N-1)!$.

Note: частный случай следующей задачи для $k = -1$...

2. Случайное копирование

Исходное Ω — битовые векторы выборов (ака ветки в полном бинарном дереве выбора), у каждого своя вероятность, однако суммарная вероятность = 1.

Нужно найти суммарную вероятность тех веток длины s , в которых последний шаг равен нулю (белый шар).

Однако заметим, что, если знать матожидание *процента белых шаров после $s-1$ -го шага* (назовём этот процент — случайную величину), то это и будет искомая вероятность.

$$E[W_{s-1}] = \sum_{\omega \in \Omega_{s-1}} W_{s-1}(\omega) p(\omega) \quad (2.1)$$

$$p(s \text{ th is white}) = \sum_{\omega \in \Omega_s} [\omega_{n-1} = \text{White}] p(\omega) = \sum_{\omega' \in \Omega_{s-1}} 1 \cdot W_{s-1}(\omega') p(\omega') + 0 \cdot p(\omega') (1 - W_{s-1}(\omega')) \quad (2.2)$$

Попробуем выразить $E[W_s]$, зная $E[W_{s-1}]$.

По формуле полного матожидания (разделим все исходы на два события: выпал в s -ый раз белый шар или нет):

$$\begin{aligned}
E[W_s] &= \sum_{\omega \in \Omega_s} W_s(\omega) p(\omega) = \\
&= \sum_{\omega \in \Omega_s} \frac{M(\omega)}{N(\omega) + M(\omega)} p(\omega) = \\
&= \sum_{\omega \in \Omega_{s-1}} \frac{M(\omega \# \# 0)}{N(\omega \# \# 0) + M(\omega \# \# 0)} p(\omega \# \# 0) + \frac{M(\omega \# \# 1)}{N(\omega \# \# 1) + M(\omega \# \# 1)} p(\omega \# \# 1) = \\
&= \sum_{\omega \in \Omega_{s-1}} \frac{M(\omega) + k}{N(\omega) + M(\omega) + k} p(\omega) \frac{M(\omega)}{N(\omega) + M(\omega)} + \frac{M(\omega) + k}{N(\omega) + M(\omega) + k} p(\omega) \frac{N(\omega)}{N(\omega) + M(\omega)} = \\
&= \sum_{\omega \in \Omega_{s-1}} \frac{N(\omega)}{N(\omega) + M(\omega)} p(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega_{s-1}} W_{s-1}(\omega) p(\omega) = E[W_{s-1}] \quad (2.3)
\end{aligned}$$

В предпредпоследнем переходе мы воспользовались <https://www.wolframalpha.com/input?i=%28m+%2B+k%29+%2F+%28n+%2B+m+%2B+k%29+m%2F%28n+%2B+m%29+%2B+%28m%29+%2F+%28n+%2B+m+%2B+k%29+n%2F%28n+%2B+m%29>.

$$p(\text{s th is white})E[W_s | \text{s th is white}] + (1 - p(\text{s th is white}))E[W_s | \text{s th isn't white}] = E[W_{s-1}]E[W_s | \text{s th is white}] \quad (2.4)$$

3. Случайный диодный мост с замыканием

Убьём двух зайцев, разделив Ω на события « E открыто» (E) и « E закрыто» (\bar{E}).

S — success.

$$P(S|E) = P(A \cup C) \cdot P(B \cup D) = (1 - P(\overline{AC}))^2 = (1 - (1 - p)^2)^2 = 4p^2 - 4p^3 + p^4 \quad (3.1)$$

$$P(S|\bar{E}) = P(AB \cup CD) = P(AB) + P(CD) - P(ABCD) = 2p^2 - p^4 \quad (3.2)$$

$$P(S) = P(E)P(S|E) + P(\bar{E})P(S|\bar{E}) = p(4p^2 - 4p^3 + p^4) + (1 - p)(2p^2 - p^4) = 2p^5 - 5p^4 + 2p^3 + 2p^2 \quad (3.3)$$

$$P(E|S) = \frac{P(E)P(S|E)}{P(S)} = \frac{p(4p^2 - 4p^3 + p^4)}{2p^5 - 5p^4 + 2p^3 + 2p^2} \quad (3.4)$$

4. Диффур потребления

4.1. Для случая одного механизма

$$p = P_1, (1 - p) = P_0.$$

Записав условие задачи, получим определение дифференцируемости:

$$p(t + \Delta t) = p(t) - p(t)(\alpha \Delta t + o(\Delta t)) + (1 - p(t))(\beta \Delta t + o(\Delta t)) \quad (4.1)$$

То есть диффуз: $p' = -\alpha p + \beta(1 - p) = (-\alpha - \beta)p + \beta$

4.2. Общий случай

Случаи, когда мутировало больше одного механизма случаются с вероятностью $o(\Delta t)$, их конечное количество, так что и сумма такова.

$$\begin{aligned} P_r(t + \Delta t) &= P_r(t) + \sum_{k=0}^n P_k(t) p_{kr} - P_r(t) \left(\alpha \binom{r}{1} \Delta t + o(\Delta t) \right) \\ &= P_r(t) - P_r(t) \alpha r \Delta t + P_{r-1}(t) \beta (n - r + 1) \Delta t + P_{r+1}(t) \alpha (n - r + 1) \Delta t + o(\Delta t) \end{aligned} \quad (4.2)$$

(Полагаем $P_i(t) = 0$ для $i \notin [0, n]$)

Получаем систему диффузов:

$$P'_r(t) = P_r(t)((n - r)\beta - r\alpha) + P_{r-1}(t)\beta(n - r + 1) + P_{r+1}(t)\alpha(n - r + 1) \quad \forall r \in [0..n] \quad (4.3)$$

ЛОС с разреженной матрицей

5. Независимость случайных величин

Интуитивно: какие же они независимые, они чётко выражаются одна через другую, то есть одна даёт полную информацию о другой.

Проверим определение: $f_{\xi, \nu}(x, y) = f_{\xi}(x)f_{\nu}(y)$ (опять интуитивно: не-ноль на пути не представим в виде тензорного произведения).

Но это уже гарантированно неправда: например, для $x = \frac{1}{2}, y = \cos(1)$: $f_{\xi, \nu}(x, y) = 0$, ведь эти условия несовместны в окрестности.

С другой стороны, оба $f_{\xi}(x), f_{\nu}(y)$ не нули, так как в окрестности функции дифференцируемы, производная обратной функции не ноль, функция плотности очень даже не ноль.




Рис. 1: Случайные величины

В силу возрастания синуса на Ω :

$$P(a \leq \sin(\omega) \leq b) = P(\arcsin(a) \leq \omega \leq \arcsin(b)) \quad (5.1)$$

6. Парадокс Монти Холла

На самом деле, он должен был понять про апостериорные вероятности помилования для трёх заключённых следующее: у него — $1/3$, у названного — 0 , у не названного $2/3$.

В терминах шоу — вопрошающему стоит сменить тело, а не оставаться в своём.

Если формально:

Назовём их R_1 (названный), R_2 (оставшийся), R_3 (он).

$\Omega = (R_i, S_j)$

$$p(R_2|S_1) = \frac{p(R_2S_1)}{p(S_1)} = \frac{p(R_2)p(S_1|R_2)}{p(R_2)p(S_1|R_2) + p(R_3)p(S_1|R_3)} = \frac{1/3 \cdot 1}{1/3 \cdot 1 + 1/3 \cdot 1/2} = \frac{2}{3} \quad (6.1)$$

В чём не прав заключённый? Почему он решил, что $1/2$? Если есть несколько событий, это ещё не значит, что они равновероятны.

Информации о себе он действительно не получил, так как в любом случае услышал бы неизвестную фамилию.

А вот об оставшемся человеке — информации добавилось: если бы он был помилован, вероятность, что стражник об этом скажет — 100% , а если помилован был автор, то лишь 50% . Вероятность помилования от обоих незнакомцев распределилась к нему.

Доп. вопрос Когда ξ и ξ^2 независимы?

$$p_{\xi, \xi^2}(x, y) = p_{\xi}(x)p_{\xi^2}(y) \quad (6.2)$$

Для отрицательных y это тривиально. Рассмотрим, например, положительные ξ . Упорядочим по возрастанию и занумеруем в этом порядке $\xi(\Omega) = x_1, \dots, x_n$.

Тогда $\xi^2(\Omega) = x_1^2, \dots, x_n^2$.

Совместный график будет выглядеть как парабола на прямоугольнике.

$$p_{\xi, \xi^2}(x, y) = \begin{cases} p_{\xi}(x) & x^2 = y \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (6.3)$$

Если найдутся два разных значения ξ^2 : $y_1 = x_1^2, y_2 = x_2^2$, принимаемые с ненулевой вероятностью (на множестве ненулевой меры Лебега-Стилтьеса) то найдутся и два различных значения ξ с тем же свойством: x_1, x_2 .

Тогда равенство 6.2 нарушается при $x = x_1, y = y_2$.

Иначе (если все значения, принимаемые ξ с положительной вероятностью, одинаковы) ξ^2 независима с чем угодно.

7. Выпускной

Элементарные исходы: случайные векторы выборов — для каждого студента — то, куда он пошёл. Вероятность каждого: $\frac{1}{n^k}$.

По линейности матожидания достаточно посчитать матожидание количество пролетевших студентов в одном заведении:

$$E[N_{\text{fail}}] = E\left[\sum_{i=1}^n \text{failed}_i\right] = \sum_{s=1}^n E[\text{failed}_i] = nE[\text{failed}_i] \quad (7.1)$$

$$P([N_i = x]) = [\text{vec with } N(i) = x] = \frac{\binom{k}{x} \cdot (n-1)^{k-x}}{n^k} \quad (7.2)$$

$$\begin{aligned} E[\text{failed}_i] &= E\left[\begin{cases} N_i - r & N_i \geq r, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}\right] = -r + \sum_{x=r}^k xP([N_i = x]) = -r + \sum_{x=r}^k xP([N_i = x]) = \\ &= -r + \frac{1}{n^r} \sum_{x=r}^k x \binom{k}{x} \cdot (n-1)^{k-x} \end{aligned} \quad (7.3)$$

$$E[N_{\text{fail}}] = E\left[\sum_{i=1}^n \text{failed}_i\right] = \sum_{s=1}^n E[\text{failed}_i] = nE[\text{failed}_i] = -rn + \frac{1}{n^{r-1}} \sum_{x=r}^k x \binom{k}{x} \cdot (n-1)^{k-x} \quad (7.4)$$

Рассмотрим студента и заведение, которое он выбрал p_s — вероятность, что туда

8. Оптимизация

$$\begin{cases} 3(p - p^2) \leq 1 \\ 2p^2 \leq p \end{cases} \quad (8.1)$$

$1/2$ — достигается при $\{a, b, c, d\}$; $P(x) = 1/4$; $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c\}$, $D = \{c, a\}$

9. Три вещи несовместные — как ты да я

$$0 = P(AB) \neq P(A)P(B) > 0 \quad (9.1)$$

Чтобы AB и $A \cup B$ были независимы:

$$p(AB \cap (A \cup B)) = p(ABA \cup ABB) = p(AB) = [\text{independence}] = p(AB)p(A \cup B) \quad (9.2)$$

То есть события должны быть либо несовместными, либо вместе составлять всё пространство.