

Сжатый гиперКонспект по математическому анализу (2-й семестр)

Латыпов Владимир (конспектор)

t.me/donRumata03, github.com/donRumata03, donrumata03@gmail.com

Виноградов Олег Леонидович (лектор)

olvin@math.spbu.ru

12 апреля 2022 г.

Содержание

1	Введение	3
2	Интегральное исчисление	3
3	Заметки с практики	4

1. Введение

Никогда не замечали, что при изучении нового материала по математическому анализу забываются не только доказательства теорем из прошлых разделов, но даже и их формулировки? Обидно, правда?

Даже если бы учебник «Математический анализ Вингоградов О. Л.» обладал системой гиперссылок, которые бы приводились при каждой отсылке на обсуждённый выше факт, это бы всё равно не решило бы проблему, так как эти ссылки указывали бы на подробно и формальную раскрытую тему и пришлось бы опять вникать в эти тонны текста и загагулины.

Нужен максимально сжатый конспект для запоминания пула изученных сущностей и упрощения ориентирования по материалу курса.

Именно его я и создаю. Работая с этим конспектом, вы будете ощущать весь материал как орёл, парящий над ним и больше не сможете сузить гордый взгляд до частных случаев!

Caution: В конспекте в немалом количестве могут встречаться МатАналЛизы, но в целом это безопасно, почти не страшно и даже приятно.

Изложение ведётся в порядке затрагивания тем в учебнике \equiv на лекциях. Пока здесь только материал второго семестра: интегралы, ряды, дифференциальное исчисление в Евклидовых пространствах.

Также предусмотрен особый раздел Заметки с практики: там можно вспомнить/узнать, чем мы/они занимались рано утром в 10:00 каждый понедельник.

2. Интегральное исчисление

Первообразная f — функция F , т.ч. $F' = f$. Всё это на промежутке любого типа.

Легко доказать, что все первообразные отличаются друг от друга на константу, причём любую.

Первообразные функции имеют первообразную на каждом промежутке области определения, так как они непрерывны (что этого достаточно для интегрируемости, доказываем через определённый интеграл позже).

Неопределённый интеграл на промежутке — множество всех первообразных.

Нетрудно составить таблицу интегралов основных элементарных функций.

Вот некоторые предприимчивые люди и составили: https://ru.onlinschool.com/math/formula/integral_table/.

3. Заметки с практики

Здесь можно вспомнить, чем мы всё это время занимались на практике.

- Использование первой и второй производной для построения картины функции и её поведения у себя в голове и последующего её перенесения на бумагу, а именно:
 - Находим область определения
 - Смотрим поведение на границах области определения (значения, предел, асимптоты)
 - Первая производная \Rightarrow делаем вывод о промежутках возрастания/убывания, экстремумах
 - Вторая производная \Rightarrow выпуклость, точки перегиба
- Оптимизация функций через поиск и проверку критических точек с помощью производной, например, параметры геометрических фигур
- Символьное вычисление неопределённых интегралов
 - Таблица интегрирования основных элементарных функций
 - Базовые приёмы интегрирования: замена переменной, интегрирование по частям
 - Тригонометрические и гиперболические подстановки
 - Интегрирование по индукции, если функция содержит целочисленный параметр
 - Сведение интеграла самого к себе, например, $\sqrt{x^2 + a^2} \rightarrow \frac{t}{\sqrt{x^2 + a^2}}t + \dots \rightarrow$ по частям.

- Выделение полного квадрата под корнем или не под корнем в знаменателе, избавление от линейного члена
- Если есть подвыражения вида $x + a$, замена переменной $t = \frac{1}{x+a}$
- Выделение в числителе производной знаменателя, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%7F'%22%60UNIQ--postMath-0000007E-QINU%60%22'%7F.
- Рациональные функции: разложение на простейшие, далее элементарно, больше второй степени не получится
- Функции вида $R\left(x, \sqrt[N]{\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}}\right)$ через замену переменной на весь корень.
- Подстановки Эйлера: $R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right)$. В зависимости от коэффициентов нужно выбрать правильное t .
- Интегрирование дифференциальных биномов (3 случая интегрируемости)
- Тригонометрические подстановки в рациональных функциях $R(\cos x, \sin x)$:
 - * Если $R(-\cos x, \sin x) = -R(\cos x, \sin x)$ (нечётно относительно \cos), можно $t = \sin x$
 - * Если $R(\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$ (нечётно относительно \sin), можно $t = \cos x$
 - * Если $R(-\cos x, -\sin x) = R(\cos x, \sin x)$ (чётно по обоим вместе), можно $t = \operatorname{tg} x$
 - * Наконец, универсальное, $t = \tan \frac{x}{2}$ работает всегда, через неё легко выражаются \sin , \cos , $\frac{dt}{dx}$.
- Похожая шняга получается и с $R(\operatorname{ch} x, \operatorname{sh} x)$

- Линейное выражение числителя через знаменатель и его производную, решение системы уравнений
- Определённые интегралы
 - Формула Ньютона-Лейбница
 - Взятие предела для несобственных интегралов
 - Рассмотрение «особенных» точек, их может быть несколько
 - Замена переменной, если особые точки не появляются, ничего не портит
 - При интегрировании по частям надо смотреть, чтобы сумма частей имела смысл в $\overline{\mathbb{R}}$.
 - Анализ сходимости: сначала проверяем абсолютную, потом относительную
 - Критерий Коши (если любое значение после некоторого A не превышает ни на каком промежутке в \mathbb{R}).
 - Использование асимптотического анализа для определения абсолютной сходимости
 - Разбиение промежутка на несколько
 - Дирихле и Абель