

Типовик по линейной алгебре модуль 1:
Задание 7 «Каноническая форма
кривых второго порядка»

Латыпов Владимир Витальевич,
ИТМО КТ М3138, **вариант 12**

11 января 2022 г.

Содержание

1	Формулировка условия	3
2	Решение	3
2.1	Поворот системы координат	3
2.2	Параллельный перенос	7
3	Итоговое преобразование координат	9
4	Иллюстрации	9

1. Формулировка условия

Утверждение 1. Условие таково:

Выполнив последовательно преобразования координат: поворот, а затем параллельный перенос координатных осей, преобразовать к каноническому виду уравнение кривой второго порядка и построить ее в канонической и исходной системе координат, а также найти параметры кривой.

$$12. 7\sqrt{5}x^2 + \sqrt{5}y^2 + 8\sqrt{5}xy + 72x + 36y + 27\sqrt{5} = 0$$

2. Решение

2.1. Поворот системы координат

Для начала найдём такой поворот, чтобы член $x'y'$ исчез.

$$\begin{cases} x = \cos(\alpha)x' - \sin(\alpha)y' \\ y = \sin(\alpha)x' + \cos(\alpha)y' \end{cases} \quad (1)$$

Тогда уравнение превращается в:

$$\begin{aligned} & 7\sqrt{5}(\cos(\alpha)x' - \sin(\alpha)y')^2 \\ & + \sqrt{5}(\sin(\alpha)x' + \cos(\alpha)y')^2 \\ & + 8\sqrt{5}(\cos(\alpha)x' - \sin(\alpha)y')(\sin(\alpha)x' + \cos(\alpha)y') \\ & + 72(\cos(\alpha)x' - \sin(\alpha)y') \\ & + 36(\sin(\alpha)x' + \cos(\alpha)y') \\ & + 27\sqrt{5} \end{aligned} \quad (2)$$

После expansion получается:

$$\begin{aligned}
& 7\sqrt{5}x'^2 \cos^2(\alpha) \\
& \quad + \sqrt{5}x'^2 \sin^2(\alpha) \\
& + 8\sqrt{5}x'^2 \cos(\alpha) \sin(\alpha) \\
& \quad + 8\sqrt{5}x'y' \cos^2(\alpha) \\
& \quad - 8\sqrt{5}x'y' \sin^2(\alpha) \\
& - 12\sqrt{5}x'y' \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\
& \quad + 72x' \cos(\alpha) \\
& \quad + 36x' \sin(\alpha) \\
& \quad + 7\sqrt{5}y'^2 \sin^2(\alpha) \\
& \quad + \sqrt{5}y'^2 \cos^2(\alpha) \\
& - 8\sqrt{5}y'^2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\
& \quad - 72y' \sin(\alpha) \\
& \quad + 36y' \cos(\alpha) \\
& \qquad \qquad \qquad + 27\sqrt{5} \quad (3)
\end{aligned}$$

Выделяем члены с $x'y'$:

$$+ 8\sqrt{5}x'y' \cos^2(\alpha) - 8\sqrt{5}x'y' \sin^2(\alpha) - 12\sqrt{5}x'y' \sin(\alpha) \cos(\alpha) \quad (4)$$

Тогда коэффициент перед $x'y'$ будет:

$$\begin{aligned}
& 7\sqrt{5}(-2\cos(\alpha)\sin(\alpha)) + 8\sqrt{5}(\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)) + \sqrt{5}(2\cos(\alpha)\sin(\alpha)) = \\
& \sqrt{5}(\cos(\alpha)\sin(\alpha)(7 \cdot -2 + 2) + 8\cos^2(\alpha) - 8\sin^2(\alpha)) \quad (5)
\end{aligned}$$

Этот коэффициент должен быть равен нулю. Тогда:

$$-12\cos(\alpha)\sin(\alpha) + 8\cos^2(\alpha) - 8\sin^2(\alpha) = 0 \quad (6)$$

$$-12tg(\alpha) + 8 - 8tg^2(\alpha) = 0 \quad (7)$$

$$4\xi^2 + 6\xi - 4 = 0 \quad (8)$$

$$\xi_{1,2} = \left\{-2, \frac{1}{2}\right\} \quad (9)$$

Для любого α с одним из этих тангенсов (таких α всего 4) исчезнет перекрёстный член в новой системе координат.

Возьмём, например, $tg(\alpha) = \frac{1}{2}$ и $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$. Будет $\alpha = arctg(\frac{1}{2})$ Тогда $sin, cos > 0$

$$sin(\alpha) = \frac{tg(\alpha)}{\sqrt{1 + tg^2(\alpha)}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\frac{5}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad (10)$$

$$cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1 + tg^2(\alpha)}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{5}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad (11)$$

Тогда старые координаты так выражаются через новые:

$$\begin{cases} x = \frac{2\sqrt{5}}{5}x' - \frac{\sqrt{5}}{5}y' \\ y = \frac{\sqrt{5}}{5}x' + \frac{2\sqrt{5}}{5}y' \end{cases} \quad (12)$$

И новая система координат будет выглядеть вот так относительно старой:




Рис. 1: Система координат (X', Y') относительно исходной

Тогда перепишем уравнение в новой системе координат:

$$\begin{aligned}
 &7\sqrt{5} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}x' - \frac{\sqrt{5}}{5}y' \right)^2 + \\
 &\quad \sqrt{5} \left(\frac{\sqrt{5}}{5}x' + \frac{2\sqrt{5}}{5}y' \right)^2 + \\
 &8\sqrt{5} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}x' - \frac{\sqrt{5}}{5}y' \right) \left(\frac{\sqrt{5}}{5}x' + \frac{2\sqrt{5}}{5}y' \right) + \\
 &\quad 72 \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}x' - \frac{\sqrt{5}}{5}y' \right) + \\
 &\quad 36 \left(\frac{\sqrt{5}}{5}x' + \frac{2\sqrt{5}}{5}y' \right) + \\
 &\quad 27\sqrt{5} \\
 &= 0 \quad (13)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{28x'^2}{\sqrt{5}} - \frac{28x'y'}{\sqrt{5}} + \frac{7y'^2}{\sqrt{5}} + \\
& \quad \frac{x'^2}{\sqrt{5}} + \frac{4x'y'}{\sqrt{5}} + \frac{4y'^2}{\sqrt{5}} + \\
& \quad \frac{16x'^2}{\sqrt{5}} + \frac{24x'y'}{\sqrt{5}} - \frac{16y'^2}{\sqrt{5}} + \\
& \quad \frac{144x'}{\sqrt{5}} - \frac{72y'}{\sqrt{5}} + \\
& \quad \frac{36x'}{\sqrt{5}} + \frac{72y'}{\sqrt{5}} + \\
& \quad 27\sqrt{5} \\
& = 0 \quad (14)
\end{aligned}$$

Получили:

$$9x'^2 + 36x' - y'^2 + 27 = 0 \quad (15)$$

2.2. Параллельный перенос

Выделим полные квадраты:

$$9x'^2 + 36x' - y'^2 + 27 = 9(x'^2 + 4x' + 4) - y'^2 - 9 = 9(x' + 2)^2 - y'^2 - 9 = 0 \quad (16)$$

Назовём, получив выражение координат системы (X', Y') через (X'', Y'') и наоборот:

$$\begin{cases} x'' = x' + 2 \\ y'' = y' \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x'' - 2 \\ y' = y'' \end{cases} \quad (17)$$

Тогда уравнение в системе координат «два штриха» будет таким:

$$9x''^2 - y'^2 = 9 \quad (18)$$

$$\frac{x''^2}{1^2} - \frac{y'^2}{3^2} = 1 \quad (19)$$

То есть это гипербола, главная полуось: $a = 1$, мнимая полуось: $b = 3$, $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$. Ещё параметры гиперболы:

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{10}}{1} = \sqrt{10} \quad (20)$$

$$F_1, F_2 = (0; \mp c) = (0; \mp \sqrt{10}) \quad (21)$$

$$D_1, D_2 : y'' = \mp \frac{a}{\varepsilon} = \mp \frac{1}{\sqrt{10}} = \mp \frac{\sqrt{10}}{10} \quad (22)$$

И выглядеть она будет:




Рис. 2: Система координат (O'', X'', Y'') относительно СК (O', X', Y')

3. Итоговое преобразование координат

Таким образом, координаты для системы «один штрих» будут выражаться как:

$$\begin{cases} x' = x'' - 2 \\ y' = y'' \end{cases} \quad (23)$$

(То есть сдвиг влево относительно двух штрихов на 2)

А для изначальной СК:

$$\begin{cases} x = \cos(\alpha)x' - \sin(\alpha)y' = \cos(\alpha)(x'' - 2) - \sin(\alpha)y'' \\ y = \sin(\alpha)x' + \cos(\alpha)y' = \sin(\alpha)(x'' - 2) + \cos(\alpha)y'' \end{cases} \quad (24)$$

4. Иллюстрации

Тогда нарисуем картинки (в обратном порядке):

(сейчас нет возможности сдать типовик в на руки, поэтому рисунки пока в электронном формате...)




Рис. 3: Чертёж в системе координат 2 штриха




Рис. 4: Чертёж в системе координат 1 штрих




Рис. 5: Чертёж в изначальной системе координат