

Практика 9

(теория чисел)

Владимир Латыпов
donrumata03@gmail.com

Vladimir Latypov
donrumata03@gmail.com

Содержание

5	Число решений	3
13	Выражение через линейные комбинации	4

5 Число решений

Напоминалочка 5.1 (Класс решений):

$$(x_0 + k \cdot dx, y_0 + k \cdot dy)$$

$$, \text{ где } dx = \frac{b}{\gcd(a,b)}, dy = -\frac{a}{\gcd(a,b)}$$

Условие 1: Найдите число решений диофантового уравнения $ax + by = c$, в которых $|x|, |y| \leq M$.

Найдём отрезок $[l_x, r_x]$ значений k , при которых $-M \leq x_0 + k \cdot dx \leq M$:

$$l_x = \frac{\lceil -M - x_0 \rceil}{dx}$$
$$r_x = \frac{\lfloor M - x_0 \rfloor}{dx}$$

PS: если dx отрицательный, \rightarrow поставим минусы

Аналогично для y получаем $[l_y, r_y]$.

Тогда ответом будет $\max(0, \min(r_x, r_y) - \max(l_x, l_y) + 1)$.

13 Выражение через линейные комбинации

Условие 2: Есть массив a_i . Найти максимальное y , для которого существуют x и b_i такие, что $a_i = x + y \cdot b_i$.

Теорема 1 (Эквивалентная переформулировка): Нужно найти максимальный модуль, по которому a_i сравнимы

Доказательство: Если зафиксирован y , то существование $x, \{b_i\} \iff a_i \equiv a_j \equiv a_0 \pmod y$, так как

- Если нашли, $x, \{b_i\}$, то $\forall i : x \bmod y \equiv a_i = x + y \cdot b_i$
- Если $\forall i : c \equiv a_i \pmod y$, то для $a_i = x + y \cdot b_i$ возьмём

$$\begin{cases} x := c \\ b_i = \frac{a_i - c}{y} \end{cases}$$

□

Введём $a'_i = a_i - a_0$

Очереная переформулировка: нужно найти максимальный модуль, по которому a'_i сравнимы с 0, aka делятся на этот модуль.

Тогда ответом будет $\gcd(\{a'_i\})$.