

Конспект к экзамену по билетам  
(математический анализ)  
(1-й семестр)

Латыпов Владимир (конспектор)

[t.me/donRumata03](https://t.me/donRumata03), [github.com/donRumata03](https://github.com/donRumata03), [donrumata03@gmail.com](mailto:donrumata03@gmail.com)

Виноградов Олег Леонидович (лектор)

[olvin@math.spbu.ru](mailto:olvin@math.spbu.ru)

19 января 2022 г.

## Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Названия билетов (ровно как в оригинале)</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Термины, незнание которых приводит к неуде по экзамену</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Указания к билетам</b>	<b>10</b>
4.1	Множества и операции над ними. . . . .	10
4.2	Аксиомы вещественных чисел. . . . .	11
4.3	Метод математической индукции. Бином Ньютона. . . . .	11
4.4	Существование максимума и минимума конечного множества, следствия. . . . .	11
4.5	Целая часть числа. Плотность множества рациональных чисел. . . . .	12
4.6	Две теоремы о „бедности” счетных множеств. . . . .	12
4.7	Теорема об объединении не более чем счетных множеств (с леммой). . . . .	12
4.8	Счетность множества рациональных чисел. . . . .	12
4.9	Несчетность отрезка. . . . .	13
4.10	Единственность предела последовательности. Ограниченность сходящейся последовательности. . . . .	13
4.11	Предельный переход в неравенстве. Теорема о сжатой последовательности. . . . .	13
4.12	Бесконечно малые. Арифметические действия над сходящимися последовательностями. . . . .	13
4.13	Свойства скалярного произведения. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца. Норма, порожденная скалярным произведением. . . . .	14
4.14	Неравенства Коши-Буняковского в $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ . Сходимость и покоординатная сходимость. . . . .	15
4.15	Бесконечно большие и бесконечно малые. Арифметические действия над бесконечно большими. . . . .	15
4.16	Свойства открытых множеств. Открытость шара. Внутренность. . . . .	15
4.17	Предельные точки. Связь открытости и замкнутости. Свойства замкнутых множеств. Замыкание. . . . .	16
4.18	Открытость и замкнутость относительно пространства и подпространства. . . . .	17

4.19	Компактность относительно пространства и подпространства. . . . .	17
4.20	Компактность, замкнутость и ограниченность. . . . .	18
4.21	Две леммы о подпоследовательностях. . . . .	18
4.22	Лемма о вложенных параллелепипедах. Компактность куба. . . . .	18
4.23	Характеристика компактов в $\mathbb{R}^m$ . Принцип выбора. . . . .	19
4.24	Сходимость и сходимости в себе. Полнота $\mathbb{R}^m$ . . . . .	19
4.25	Теорема о стягивающихся отрезках. Существование точной верхней границы. . . . .	19
4.26	Предел монотонной последовательности. . . . .	19
4.27	Неравенство Я. Бернулли, $\lim z^n$ , число $e$ . . . . .	19
4.27.1	Неравенство Я. Бернулли . . . . .	19
4.27.2	$\lim z^n$ . . . . .	19
4.27.3	число $e$ . . . . .	19
4.28	Верхний и нижний пределы последовательности. . . . .	20
4.29	Равносильность определений предела отображения по Коши и по Гейне. . . . .	20
4.30	Простейшие свойства отображений, имеющих предел (единственность предела, локальная ограниченность, арифметические действия). . . . .	20
4.31	Предельный переход в неравенстве для функций. Теорема о сжатой функции. . . . .	20
4.32	Предел монотонной функции. . . . .	20
4.33	Критерий Больцано - Коши для отображений. . . . .	20
4.34	Двойной и повторные пределы, примеры. . . . .	20
4.35	Непрерывность. Точки разрыва и их классификация, примеры. . . . .	20
4.36	Арифметические действия над непрерывными отображениями. Стабилизация знака непрерывной функции. . . . .	20
4.37	Непрерывность и предел композиции. . . . .	20
4.38	Характеристика непрерывности отображения с помощью прообразов. . . . .	21
4.39	Теорема Вейерштрасса о непрерывных отображениях, следствия. . . . .	21
4.40	Теорема Кантора. . . . .	21
4.41	Теорема Больцано-Коши о непрерывных функциях. . . . .	21
4.42	Сохранение промежутка (с леммой о характеристике промежутков). Сохранение отрезка. . . . .	21
4.43	Теорема Больцано-Коши о непрерывных отображениях. . . . .	21
4.44	Разрывы и непрерывность монотонной функции. . . . .	21

4.45	Существование и непрерывность обратной функции. . .	21
4.46	Степень с произвольным показателем. . . . .	21
4.47	Свойства показательной функции и логарифма. . . . .	21
4.48	Непрерывность тригонометрических и обратных тригонометрических функций. . . . .	21
4.49	Замечательные пределы. . . . .	21
4.50	Замена на эквивалентную при вычислении пределов. Асимптоты. . . . .	22
4.51	Единственность асимптотического разложения. . . . .	22
4.52	Дифференцируемость и производная. Равносильность определений, примеры. . . . .	22
4.53	Геометрический и физический смысл производной. . . .	23
4.54	Арифметические действия и производная. . . . .	23
4.55	Производная композиции. . . . .	23
4.56	Производная обратной функции и функции, заданной параметрически. . . . .	23
4.57	Производные элементарных функций. . . . .	24
4.58	Теорема Ферма. . . . .	24
4.59	Теорема Ролля. . . . .	24
4.60	Формулы Лагранжа и Коши, следствия. . . . .	24
4.61	Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$ примеры. . . . .	24
4.62	Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей вида $\frac{\inf}{\inf}$ примеры. . . . .	24
4.63	Теорема Дарбу, следствия. . . . .	24
4.64	Вычисление старших производных: линейность, правило Лейбница, примеры. . . . .	24
4.65	Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. .	24
4.66	Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. .	24
4.67	Тейлоровские разложения функций .... . . . .	24
4.68	Иррациональность числа $e$ . . . . .	24
4.69	Применение формулы Тейлора к раскрытию неопределенностей. . . . .	25
4.70	Критерий монотонности функции. . . . .	25
4.71	Доказательство неравенств с помощью производной, примеры. . . . .	25
4.72	Необходимое условие экстремума. Первое правило исследования критических точек. . . . .	26
4.73	Второе правило исследования критических точек. Производные функции . . . . .	26

4.74 Лемма о трех хордах и односторонняя дифференцируе- мость выпуклой функции. . . . .	26
4.75 Выпуклость и касательные. Опорная прямая. . . . .	26
4.76 Критерии выпуклости функции. . . . .	26
4.77 Неравенство Иенсена. . . . .	26
4.78 Неравенства Юнга и Гёльдера. . . . .	26
4.79 Неравенство Минковского и неравенство Коши между средними. . . . .	26
4.80 Метод касательных. . . . .	26

## 1. Введение

Максимально сжатый матанал: для каждого билета будет список сущностей (определений, теорем, замечаний, следствий и т.д.), о которых надо рассказать, а также указания к доказательствам (в тех случаях, когда это не очевидно).

## 2. Названия билетов (ровно как в оригинале)

1. Множества и операции над ними.
2. Аксиомы вещественных чисел.
3. Метод математической индукции. Бином Ньютона.
4. Существование максимума и минимума конечного множества, следствия.
5. Целая часть числа. Плотность множества рациональных чисел.
6. Две теоремы о „бедности” счетных множеств.
7. Теорема об объединении не более чем счетных множеств (с леммой).
8. Счетность множества рациональных чисел.
9. Несчетность отрезка.
10. Единственность предела последовательности. Ограниченность сходящейся последовательности.
11. Предельный переход в неравенстве. Теорема о сжатой последовательности.
12. Бесконечно малые. Арифметические действия над сходящимися последовательностями.
13. Свойства скалярного произведения. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца. Норма, порожденная скалярным произведением.
14. Неравенства Коши-Буняковского в  $\mathbb{R}$  и  $\mathbb{C}$ . Сходимость и покоординатная сходимость.
15. Бесконечно большие и бесконечно малые. Арифметические действия над бесконечно большими.

16. Свойства открытых множеств. Открытость шара. Внутренность.
17. Предельные точки. Связь открытости и замкнутости. Свойства замкнутых множеств. Замыкание.
18. Открытость и замкнутость относительно пространства и подпространства.
19. Компактность относительно пространства и подпространства.
20. Компактность, замкнутость и ограниченность.
21. Две леммы о подпоследовательностях.
22. Лемма о вложенных параллелепипедах. Компактность куба.
23. Характеристика компактов в  $\mathbb{R}^m$ . Принцип выбора.
24. Сходимость и сходимость в себе. Полнота  $\mathbb{R}^m$ .
25. Теорема о стягивающихся отрезках. Существование точной верхней границы.
26. Предел монотонной последовательности.
27. Неравенство Я. Бернулли,  $\lim z^n$ , число  $e^n$ .
28. Верхний и нижний пределы последовательности.
29. Равносильность определений предела отображения по Коши и по Рейне.
30. Простейшие свойства отображений, имеющих предел (единственность предела, локальная ограниченность, арифметические действия).
31. Предельный переход в неравенстве для функций. Теорема о сжатой функции.
32. Предел монотонной функции.
33. Критерий Больцано - Коши для отображений.
34. Двойной и повторные пределы, примеры.
35. Непрерывность. Точки разрыва и их классификация, примеры.
36. Арифметические действия над непрерывными отображениями. Стабилизация знака непрерывной функции.
37. Непрерывность и предел композиции.

- 38. Характеристика непрерывности отображения с помощью прообразов.
- 39. Теорема Вейерштрасса о непрерывных отображениях, следствия.
- 40. Теорема Кантора.
- 41. Теорема Больцано-Коши о непрерывных функциях.
- 42. Сохранение промежутка (с леммой о характеристике промежутков). Сохранение отрезка.
- 43. Теорема Больцано-Коши о непрерывных отображениях.
- 44. Разрывы и непрерывность монотонной функции.
- 45. Существование и непрерывность обратной функции.
- 46. Степень с произвольным показателем.
- 47. Свойства показательной функции и логарифма.
- 48. Непрерывность тригонометрических и обратных тригонометрических функций.
- 49. Замечательные пределы.
- 50. Замена на эквивалентную при вычислении пределов. Асимптоты.
- 51. Единственность асимптотического разложения.
- 52. Дифференцируемость и производная. Равносильность определений, примеры.
- 53. Геометрический и физический смысл производной.
- 54. Арифметические действия и производная.
- 55. Производная композиции.
- 56. Производная обратной функции и функции, заданной параметрически.
- 57. Производные элементарных функций.
- 58. Теорема Ферма.
- 59. Теорема Ролля.
- 60. Формулы Лагранжа и Коши, следствия.



61. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей вида примеры.
62. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей вида примеры.
63. Теорема Дарбу, следствия.
64. Вычисление старших производных: линейность, правило Лейбница, примеры.
65. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано.
66. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.
67. Тейлоровские разложения функций ....
68. Иррациональность числа  $e$ .
69. Применение формулы Тейлора к раскрытию неопределенностей.
70. Критерий монотонности функции.
71. Доказательство неравенств с помощью производной, примеры.
72. Необходимое условие экстремума. Первое правило исследования критических точек.
73. Второе правило исследования критических точек. Производные функции
74. Лемма о трех хордах и односторонняя дифференцируемость выпуклой функции.
75. Выпуклость и касательные. Опорная прямая.
76. Критерии выпуклости функции.
77. Неравенство Иенсена.
78. Неравенства Юнга и Гёльдера.
79. Неравенство Минковского и неравенство Коши между средними.
80. Метод касательных.

### **3. Термины, незнание которых приводит к неуде по экзамену**

1. Виды отображений (инъекция, сюръекция, биекция), образ, прообраз, обратное отображение

2. Предел последовательности, функции, отображения (в разных ситуациях и на разных языках)
3. Метрическое, векторное, нормированное пространства, неравенство Коши - Буняковского
4. Внутренние и предельные точки, открытые, замкнутые и компактные множества, компактность в евклидовом пространстве;
5. Сходимость в себе, полнота метрического пространства
6. Ограниченность множества, точные границы
7. О-символика
8. Непрерывность, теоремы Больцано - Коши и Вейерштрасса о непрерывных функциях, равномерная непрерывность, теорема Кантора
9. Замечательные пределы
10. Дифференцируемость и производная
11. Формулы и правила дифференцирования
12. Формула Лагранжа, формула Тейлора с остатками в форме Пеано и Лагранжа, основные тейлоровские разложения
13. Сравнение логарифмической, степенной и показательной функций
14. Точки экстремума и их отыскание, определение и критерии выпуклости
15. *Умение дифференцировать обязательно*

## 4. Указания к билетам

*☞ Указания составлены в соответствии с учебником  
Виноградова ☞*

### 4.1. Множества и операции над ними.

Задание множеств, обозначения, подмножества, обозначения числовых множеств

Утверждения, кванторы

Семейства множеств, пересечения, объединения, разность, универсум, дополнение

Законы Де-Моргана (вычесть объединение  $\Leftrightarrow$  пересечь частичные разности и то же для пересечения  $\Leftrightarrow$  объединение)

Ещё теорема: пересечение с объединением  $\Leftrightarrow$  объединение пересечений и наоборот

#### **4.2. Аксиомы вещественных чисел.**

Поле: абелева группа по сложению, абелева группа по умножению (кроме обратимости нуля)

Добавляем аксиомы для упорядоченности: 3 для линейного порядка + можно прибавлять к неравенствам + умножать неравенства с нулём (Вводим значки  $>$ ,  $<$ ,  $\geq$  через  $\leq$ )

Вводим промежутки, отрезки, интервалы, полуинтервалы, лучи.

Вводим  $\overline{\mathbb{R}}$ , добавляя  $\pm\infty$

Добавляем аксиому Архимеда (но всё ещё  $\mathbb{Q}$  удовлетворяет)

Аксиома Кантора о вложенных отрезках (пересечение даже бесконечного количества в  $\mathbb{R}$  непусто, но только для замкнутых) Пример: в  $\mathbb{Q}$  можно сделать, чтобы они сходились в  $\sqrt{2}$ .

#### **4.3. Метод математической индукции. Бином Ньютона.**

Определение ММИ для последовательности утверждений (следствие следующего утверждения из предыдущего)

Индуктивное подмножество  $\mathbb{R}$

Определение  $\mathbb{N}$  как минимального по включению индуктивного.

Доказываем Бином Ньютона по индукции.

#### **4.4. Существование максимума и минимума конечного множества, следствия.**

Ограниченность сверху, снизу  $M \subset \mathbb{R}$ ,  $\Leftrightarrow$  ограниченность по модулю

Верхняя граница, минимум, максимум

Существование минимума и максимума конечного множества по индукции по количеству элементов.

Полная упорядоченность  $\mathbb{N}$  по отношению  $\leq$

#### **4.5. Целая часть числа. Плотность множества рациональных чисел.**

Через аксиому Архимеда,  $c = \frac{[na]+1}{n}$ .

$\Rightarrow$  в любом промежутке найдётся  $\infty$  рациональных.

#### **4.6. Две теоремы о „бедности” счетных множеств.**

Эквивалентность по мощности: существует биекция (это отношение эквивалентности)

Счётное, если  $\mathbb{N}$ .

Сами теоремы о бедности:

- Любое бесконечное подмножество содержит счётное подмножество
- Бесконечное подмножество счётного — счётно (расположим в виде последовательности, нумеруем в порядке появления)

#### **4.7. Теорема об объединении не более чем счетных множеств (с леммой).**

Счётное, если  $\mathbb{N} \Leftrightarrow$  можно расположить в виде последовательности  $\Leftrightarrow$  в виде таблицы  $\Leftrightarrow$  можно составить биекцию с  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Не более чем счётно объединение не более чем счётных не более чем счётно

#### **4.8. Счетность множества рациональных чисел.**

Счётность рациональных как таблицы (отдельно рассмотреть отрицательные и ноль)

#### 4.9. Несчетность отрезка.

Несчётность отрезка  $[0; 1]$  (по аксиоме Кантора: пусть расположили в виде последовательности, бесконечное деление на 3 части, последовательность вложенных, не содержащих  $n$ -ную точку  $\Leftrightarrow$  пересечение не пусто  $\Leftrightarrow$  она не занумерована. Противоречие), гипотеза Континуума.

#### 4.10. Единственность предела последовательности. Ограниченность сходящейся последовательности.

По определению (обе — в произвольных метрических пространствах).

#### 4.11. Предельный переход в неравенстве. Теорема о сжатой последовательности.

Обе — для  $\mathbb{R}$

При переходе важно не забыть про неверность в случае перехода от строгого к строгому.

Про двух милиционеров — по определению.

#### 4.12. Бесконечно малые. Арифметические действия над сходящимися последовательностями.

Бесконечно малые — в нормированном ( $\Rightarrow$  линейном) пространстве.

Note: метрика может быть не «равномерной»  $\Rightarrow \rho(x, 0)$  может быть не нормой.

Арифметические действия:

для нормированного пространства: сумма, умножение на последовательность скаляров, разность, сходимость нормы к норме предела. для числовых последовательностей: ещё и частное последовательностей (если знаменатель не принимает ноль и его предел не ноль) через предел  $\frac{1}{y_n}$  через ограниченность  $\frac{1}{y_n}$ .

#### 4.13. Свойства скалярного произведения. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца. Норма, порожденная скалярным произведением.

Метрика: тождественность (ноль только у равных), симметричность, неравенство треугольника

Норма (в векторных): положительная определённость (ноль у нуля и только), положительная однородность, неравенство треугольника.

Скалярное произведение (в векторных): Линейность по первому аргументу, Эрмитова симметричность (то есть  $\langle x, x \rangle \in \mathbb{R}$ ), положительная определённость (для одинаковых не меньше нуля, ноль у нуля и только).

Свойства: аддитичность по второму аргументу, «эрмитова» (но не положительная) однородность по второму аргументу, хотя бы при одном нуле — ноль.

КБШ:

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \quad (1)$$

Доказываем, отдельно рассмотрев  $y = 0$ , иначе  $\lambda = -\frac{\langle x, x \rangle}{\langle y, y \rangle}$ .

Раскладываем по линейности и  $\lambda \bar{\lambda} = |\lambda|^2$ :

$$\langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle$$

Получаем:  $\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle - |\langle x, y \rangle|^2 = \langle y, y \rangle \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle \geq 0$

Обращается в равенство только для коллинеарных векторов.

Умеем порождать норму как  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Проверяем аксиомы, треугольник:

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \leq \langle x, x \rangle + 2|\langle x, y \rangle| + \langle y, y \rangle \leq p^2(x) + 2p(x)p(y) + p^2(y) = \|p(x)\|^2$$

Нер-во треугольника обращается в равенство только для **сонаправленных** векторов.

#### 4.14. Неравенства Коши-Буняковского в $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ . Сходимость и покоординатная сходимость.

Нер-ва КБШ и треугольника просто приводим в частом случае для евклидовой нормы.

Покоординатная сходимость равносильна в  $\mathbb{R}^m$  сходимости по Евклидовой норме. (ограничиваем друг друга с обеих сторон (разность по любой координате меньше нормы меньше корня из размерности на максимальную разность), производим поределный переход)

#### 4.15. Бесконечно большие и бесконечно малые. Арифметические действия над бесконечно большими.

Определяем стремление к просто бесконечности (если с какого-то момента норма всегда больше любого заданного значения)

Для  $\mathbb{R}$  также определяем для  $+\infty$  и  $-\infty$ .

NOTE: НЕограниченная — не обязательно бесконечно большая.

Предел в  $\overline{\mathbb{R}}$  единственен.

Бесконечно большая  $\Leftrightarrow \frac{1}{x_n}$  бесконечно малая и не равна нулю никогда.

Арифметические действия с ББ (некоторые можно и в  $\mathbb{C}$ ):

1. Можно суммировать с ограниченными правильным образом (3 штуки).
2. Можно умножать на отделимую от нуля правильным образом (3 штуки).
3. Можно делить на бесконечно малую и бесконечно большую, а ещё стремящуюся к обычному пределу делить на ББ (ещё 3 штуки).

#### 4.16. Свойства открытых множеств. Открытость шара. Внутренность.

Внутренняя точка: найдётся окрестность, целиком содержащаяся во множестве.

Открытое: все точки множества — внутренние.

1. Объединение **любого** количества открытых множеств открыто

## 2. Пересечение **конечного** количества открытых множеств открыто.

Первое очевидно, второе доказывается через минимум множества радиусов.

Внутренность — множество внутренних точек ( $\overset{\circ}{D}$  или  $\text{Int } D$ ).

Также это:

- Объединение всех открытых подмножеств
- Максимальное по включению открытое подмножество

Доказывается: рассмотрим множество  $G$  в виде объединения всех открытых подмножеств. Оно удовлетворяет второму критерию, открыто (как объединение открытых). Докажем, что любая внутренняя точка принадлежит  $G$  (действительно, внутренняя  $\Rightarrow$  есть окрестность, содержащаяся в  $D$ , но она открытое мн-во  $\Rightarrow x \in V_x \subset G$ ) и что все точки  $G$  — внутренние (очевидно).

«Открытый шар» является открытым множеством. Доказывается через неравенство треугольника.

## 4.17. Предельные точки. Связь открытости и замкнутости. Свойства замкнутых множеств. Замыкание.

Предельная точка = точка сгущения множества: в любой **проколотовой** окрестности найдётся точка ( $\Rightarrow$  найдётся и бесконечное количество точек). Можно также переформулировать как «предельная, если существует последовательность точек множества, **отличных** от  $a$  стремящаяся к  $a$ ». (Равносильность очевидна).

Изолированная точка: принадлежит множеству, но не является точкой сгущения.

Точка прикосновения: В любой **не проколотовой** окрестности точки найдётся точка множества. «коснулось как-то: возможно — за счёт густоты, возможно — за счёт наличия в себе». Можно переформулировать как «существует последовательность точек множества (может быть и просто стационарная последовательность из  $a$ ), стремящаяся к  $a$ ».

Замкнутое множество: Содержит все свои точки сгущения

Теорема: Множество замкнуто  $\iff$  его дополнение открыто Доказывается легко по определениям.



Можно и сформулировать как «множество открыто  $\iff$  его дополнение замкнуто».

Свойства

1. **Пересечение любого** количества замкнутых множеств замкнуто.
2. **Объединение конечного** количества замкнутых множеств замкнуто

(Доказывается через соответствующие свойства открытых множеств, по предыдущей теореме, а также — через законы Де-Моргана)

**Замыкание:** все точки прикосновения ( $\bar{D}$  или  $\text{Cl } D$ )

Замыкание множества — это также (теорема):

- Пересечение всех замкнутых **надмножеств**
- Минимальное по включению замкнутое **надмножество**

Доказательство: Берём пересечение всех замкнутых **надмножеств**. (Конечно, оно соответствует второму критерию). Оно замкнуто по предыдущей теореме.

Если  $x \in D$ , то есть  $x$  — точка прикосновения  $D$ , то тем более  $x$  — точка прикосновения  $F$ , а тогда  $x \in F$  в силу замкнутости  $F$ . С другой стороны, если  $x \notin \bar{D}$ , то у точки  $x$  существует окрестность  $V_x$ , содержащаяся в  $D^c$ . Тогда ее дополнение  $V_x^c$  замкнуто и содержит  $D$ , поэтому  $F \subset V_x^c$ , то есть  $V_x \subset F^c$  и, в частности,  $x \notin F$ .

Множество замкнуто  $\iff$  оно совпадает со своим замыканием.

#### 4.18. Открытость и замкнутость относительно пространства и подпространства.

Пусть  $D \subset Y \subset X$ .

1.  $D$  открыто в  $Y \iff \exists G$ , открытое в  $X$ , такое, что  $D = G \cap Y$ .
2.  $D$  закрыто в  $Y \iff \exists F$ , закрытое в  $X$ , такое, что  $D = F \cap Y$ .

#### 4.19. Компактность относительно пространства и подпространства.

Свойства компактности равносильны в метрическом пространстве и в его подпространстве.

#### 4.20. Компактность, замкнутость и ограниченность.

1. Компактность  $\Rightarrow$  замкнутость и ограниченность.
2. Замкнутое подмножество компакта компактно компактно.

#### 4.21. Две леммы о подпоследовательностях.

Лемма 1: Всякая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к тому же пределу  $(a)$ .

Док-во: возьмем  $\xi > 0$ , по определению предела существует такой номер, что  $\rho(x_n, a) < \xi \Rightarrow \rho(x_{n_k}, a) < \xi$

Лемма 2: Если есть две последовательности  $\{x_{n_k}\}, \{x_{m_l}\}$ , такие, что объединение их индексов дает равно  $\mathbb{N}$ . Если обе стремятся к  $a$ , то и  $\{x_n\}$  стремится к  $a$

Док-во: выберем  $\xi > 0$ , найдем в двух последовательностях индексы, после которых расстояние до  $a < \xi$ , выберем максимум. Тогда  $\{x_n\}$  стремится к  $a$ .

#### 4.22. Лемма о вложенных параллелепипедах. Компактность куба.

Во-первых, их пересечение непусто. Рассмотрим по каждой координате, сведем к теореме о вложенных отрезках.

Пусть  $K$  - замкнутый параллелепипед. Тогда  $K$  - компактно.

Док-во: от противного. Половинным делением найдем область, которую нельзя покрыть конечным подпокрытием.

Получится система вложенных параллелепипедов, их диаметр стремится к нулю. Значит, пересечение содержится в шаре, их можно покрыть конечным подпокрытием. Противоречие

**4.23. Характеристика компактов в  $\mathbb{R}^m$ . Принцип выбора.**

**4.24. Сходимость и сходимости в себе. Полнота  $\mathbb{R}^m$ .**

**4.25. Теорема о стягивающихся отрезках. Существование точной верхней границы.**

**4.26. Предел монотонной последовательности.**

Можно проиллюстрировать примером формулы Герона для  $\sqrt{x}$ .

**4.27. Неравенство Я. Бернулли,  $\lim z^n$ , число  $e$ .**

**4.27.1. Неравенство Я. Бернулли**

Доказываем по индукции по  $n$ , домножая обе части на  $1 + x$  и группируя.

**4.27.2.  $\lim z^n$**

Для  $|z| < 1$  оно сходится к нулю (Так как модуль (а он норма) делает то же самое).

**4.27.3. число  $e$**

Она ограничена снизу нулём. Докажем убывание последовательности. Для этого докажем, что отношение соседних меньше единицы. Для этого юзанём нер-во Бернулли.

**4.28. Верхний и нижний пределы последовательности.**

**4.29. Равносильность определений предела отображения по Коши и по Гейне.**

**4.30. Простейшие свойства отображений, имеющих предел (единственность предела, локальная ограниченность, арифметические действия).**

**4.31. Предельный переход в неравенстве для функций. Теорема о сжатой функции.**

**4.32. Предел монотонной функции.**

Доказываем, что супремум множества значений является супремумом. Но это слезует из характеристики супремума через  $\varepsilon\delta$ .

**4.33. Критерий Больцано - Коши для отображений.**

**4.34. Двойной и повторные пределы, примеры.**

**4.35. Непрерывность. Точки разрыва и их классификация, примеры.**

5 определений непрерывности (2 годятся только для предельных точек)

Бывает устранимого, бывает первого и второго рода.

**4.36. Арифметические действия над непрерывными отображениями. Стабилизация знака непрерывной функции.**

**4.37. Непрерывность и предел композиции.**

Два раза применяем определение непрерывности, но не забываем, что в наивном виде не будет работать: нужно либо сказать, что внутренняя не принимает точку, либо — что внешняя — непрерывна.

- 4.38. Характеристика непрерывности отображения с помощью прообразов.**
- 4.39. Теорема Вейерштрасса о непрерывных отображениях, следствия.**
- 4.40. Теорема Кантора.**
- 4.41. Теорема Больцано-Коши о непрерывных функциях.**
- 4.42. Сохранение промежутка (с леммой о характеристике промежутков). Сохранение отрезка.**
- 4.43. Теорема Больцано-Коши о непрерывных отображениях.**
- 4.44. Разрывы и непрерывность монотонной функции.**
- 4.45. Существование и непрерывность обратной функции.**

Если непрерывна и строго монотонна, существует обратная — непрерывная и с таким же знаком монотонности.

*TODO: Важно вспомнить, как доказывается!*

- 4.46. Степень с произвольным показателем.**
- 4.47. Свойства показательной функции и логарифма.**
- 4.48. Непрерывность тригонометрических и обратных тригонометрических функций.**

Доказывается через формулу разности. Для обратных — они ведь обратные к непрерывным, монотонным.

#### **4.49. Замечательные пределы.**

Вот они — слева направо (5 штук, кажется):

- $\frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$
- ...

#### 4.50. Замена на эквивалентную при вычислении пределов. Асимптоты.

По факту — что можно заменять эквивалентную в произведении и в

#### 4.51. Единственность асимптотического разложения.

Асимптотические разложения могут быть из произвольного метрического пространства (но должно быть в предельной точке) и действуют в  $\mathbb{R}$ .

Одна и та же система функций. Доказываем, что если оба асимптотические разложения по ней, то коэффициенты равны.

Во-первых, для всех больших номеров функция по этому номеру функция — о малое от данной. Далее — найдётся окрестности для каждого номера, что  $k$ -тая функция в ней не ноль.

Находим минимальный индекс  $m$ , в котором коэффициенты отличаются и получаем, что разность коэффициентов, умноженная на  $g_m$  — это  $o(g_m)$ , то есть эта разность равна нулю, то есть эти коэффициенты равны, противоречие.

#### 4.52. Дифференцируемость и производная. Равносильность определений, примеры.

Определения. Функция (рассматриваем именно функции, то есть  $\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ ) должна быть определена по крайней мере на невырожденном промежутке  $\langle a, b \rangle$ . Два определения: через асимптотическое разложение и через предел отношения.

Первое:

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0,$$

Второе:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (2)$$

Доказываем эквивалентность определений. « $\Rightarrow$ »: переносим в другую часть, делим и получаем  $A + \varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A$

« $\Leftarrow$ »: примем  $\varphi(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - A$ . Подставим — подходит.

Дифференцируемость — более сильное условие, чем непрерывность, то есть дифференцируемость  $\Rightarrow$  непрерывность. (доказывается через первое (асимптотически-разложенческое) определение производной)

Примером тому служат  $|x|$  и  $x \sin x$ .

Есть вообще функция Вейерштрасса, такая, что непрерывна везде, но нигде не дифференцируема.

#### **4.53. Геометрический и физический смысл производной.**

Геометрический — касательная, которая предельное положение секущей, причём угловой коэффициент равен производной.

Физический задача о связи скорости, ускорения, положения и т.д. тела. Очередная величина — это производная предыдущей (в физики такое постоянно встречается, диффуры всякие)

#### **4.54. Арифметические действия и производная.**

Производная суммы, разности, умножения на число, произведения, отношения равна тому, чему нужно. Доказывается по определению через предел и по свойствам предела. Надо не забыть сказать про непрерывность суммы, произведения и т.д. непрерывных при переходе к пределу.

#### **4.55. Производная композиции.**

Доказывается по первому определению производной в форме функции от  $x + \text{приращения}$ . Подставляем асимптотическое разложение в аргумент внешней функции, а потом разложить внешнюю.

Note: можно дифференцировать вложенную композицию по цепочке.

#### **4.56. Производная обратной функции и функции, заданной параметрически.**

Обратная — через предел обратной функции.

Параметрически — если можем поделить на куски, чтобы было обратимо, делаем, получаем, что  $y(x) = y(t(x))$ , далее - по производной обратной получаем отношение производных.

#### **4.57. Производные элементарных функций.**

Пользуемся замечательными пределами и производными обратной функции, где нужно.

#### **4.58. Теорема Ферма.**

#### **4.59. Теорема Ролля.**

#### **4.60. Формулы Лагранжа и Коши, следствия.**

#### **4.61. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$ примеры.**

#### **4.62. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей вида $\frac{inf}{inf}$ примеры.**

#### **4.63. Теорема Дарбу, следствия.**

#### **4.64. Вычисление старших производных: линейность, правило Лейбница, примеры.**

правило Лейбница — для  $n$ -ной производной произведения двух (как бином Ньютона и тоже по индукции).

$\sin x, x^k, \frac{1}{x}, \ln x$

#### **4.65. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано.**

#### **4.66. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.**

#### **4.67. Тейлоровские разложения функций ....**

$e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$

#### **4.68. Иррациональность числа $e$ .**

Применяем Тейлора.



#### **4.69. Применение формулы Тейлора к раскрытию неопределенностей.**

Отличный пример из учебника:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2/2} - \cos x}{x^4} = \frac{1}{12}$$

#### **4.70. Критерий монотонности функции.**

Нестрогая, критерий постоянства. Строгая, если производная  $\geq 0$  и не принимает ноль ни на каком интервале.

#### **4.71. Доказательство неравенств с помощью производной, примеры.**

«если неравенство выполняется в начале и по производной, то выполняется и для всего промежутка».

- 4.72. Необходимое условие экстремума. Первое правило исследования критических точек.**
- 4.73. Второе правило исследования критических точек. Производные функции**
- 4.74. Лемма о трех хордах и односторонняя дифференцируемость выпуклой функции.**
- 4.75. Выпуклость и касательные. Опорная прямая.**
- 4.76. Критерии выпуклости функции.**
- 4.77. Неравенство Иенсена.**
- 4.78. Неравенства Юнга и Гёльдера.**
- 4.79. Неравенство Минковского и неравенство Коши между средними.**
- 4.80. Метод касательных.**

Метод Ньютона в одномерном случае для решения уравнений, проводим касательные до посинения.

Первая и вторая производные сохраняют знак. Рассматриваем 4 случая, какой, чтобы не разойтись.

Подбираемся всегда с одной стороны.

Квадратичную сходимости доказываем через тейлоровское разложение функции и ограниченность  $\left| \frac{f''}{f'} \right|$  или же  $|f''|$  и отделимость от нуля  $|f'|$

Количество гарантированно правильных знаков увеличивается каждый раз в 2 раза (при  $\rightarrow \infty$ ), причём можно пост-фактум определять правильность, имея информацию о новых знаках.

Был пример с нахождением  $\frac{1}{7}$ , умея лишь складывать и умножать.