

Конспект к экзамену по матану

Владимир Латыпов
donrumata03@gmail.com

Содержание

1 Теория меры	3
2 Многообразия	3
2.1 Разбиение единицы	3
2.2 Гладкие многообразия	4
3 Ряды Фурье и приближение функций	5
3.1 Пространства Лебега	5
3.2 Гильбертовы пространства	5

1 Теория меры

2 Многообразие

2.1 Разбиение единицы

Lemma 2.1.1 Открытое множество в \mathbb{R}^n представимо как объединение шаров с рациональными центрами и радиусам, в нём содержащихся.

Theorem 2.1.2 (*theorem 2: Теорема Линдлёфа*) Из открытого покрытия множества в \mathbb{R}^n можно выделить счётное подпокрытие.

Proof

- Не важно, открыто ли покрытие в \mathbb{R}^n или в M , т.ч. считаем, что множество представлено в виде объединения.
- Рассмотрим все шары, содержащиеся хотя бы в одном элементе покрытия \rightarrow достаточно их объединить (занумеруем).

□

Theorem 2.1.3 (*theorem 3: Теорема Лебега (о компакте)*) Для открытого покрытия метрического компакта существует ε , что любое пересекающееся с K множество диаметра $\leq \varepsilon$ содержится в каком-то элементе покрытия.

Proof От противного — построим последовательность для $\varepsilon = \frac{1}{n}$. По секвенциальной компактности выделим сходящуюся подпоследовательность. Её предел — в элементе покрытия. Тогда множества с какого-то момента содержатся в нём. Противоречие. □

Theorem 2.1.4 (*theorem 4: Разбиение единицы*) Для открытого покрытия компакта в \mathbb{R}^n существует разбиение единицы, отвечающее ему, т.е.

- конечный набор финитных функций $C^\infty(\mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1])$, тч:
- supp каждой \in какому-то элементу покрытия.
- Сумма набора ≤ 1 всегда
- На компакте в точности равна 1

Proof Функция $\tau(x) = e^{-\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x-1)^2}}$ (на $[0, 1]$, иначе — 0). Периодизируем, поделим на период, получим θ . Тогда $\tilde{\theta}$ (периодизированная θ) $\equiv 1$. Через ε из леммы Лебега возьмём малое h и получим для точки m из \mathbb{Z}^n перемноженную и промасштабированную штуку $\theta_{m(x)} = \prod_{i=1}^n \theta(\frac{x_i}{h} - m_i)$. Тогда возьмём в набор те, которые содержатся в каком-либо элементе покрытия. □

Theorem 2.1.5 (*theorem 5: Равносильность существования локального и глобального гладкого продолжения*) Если для каждой точки множества существует окрестность и r — гладкое продолжение отображения, то существует таковое и на объединении окрестностей.

2.2 Гладкие многообразия

Definition 2.2.6 Регулярное отображение на произвольном множестве — существует регулярное продолжение на открытое.

Definition 2.2.7 $M_{kn}^{(r)}$ (k -мерное многообразие в \mathbb{R}^n класса r) — множество в \mathbb{R}^n , тч для каждой точки существует локальная параметризация — окрестность (открытое в M множество, содержащее это точку) и регулярный класса r гомеоморфизм $\varphi : \Pi_k \rightarrow U$, где Π_k — стандартный куб или полукуб, причём $\varphi(0) = x$. Точки, где это куб — внутренние, где полукуб — краевые.

∂M — край — множество краевых точек. Не завит от параметризации (следствие из теоремы о регулярности перехода).

Definition 2.2.8 Нуль-мерное многообразие — *дискретное* множество точек, то есть никакая — не предельная.

Example 2.2.9 Многообразия:

- Открытое множество в \mathbb{R}^n — многообразие без края класса ∞ (тождественная параметризация)
- Путь (простой, незамкнутый, регулярный, на $[0, 1]$).
- Образ открытого в \mathbb{R}^k множества при регулярном гомеоморфизме. Частный случай — график отображения, где $\varphi : (u, f(u))$.
- Поверхность вращения в \mathbb{R}^3 (параметризуем, решая уравнения)
- Сфера (локальная параметризация — через сферические координаты, иначе — вращаем)
- Цилиндрическая поверхность — то же самое, но переходим к сферическим координатам только по первым $l - 1$ переменным.
- Тор — параметризуем через угол на центральной окружности и на подвешенной к ней

Theorem 2.2.10 (*theorem 10: Задание многообразия через систему уравнений*) Подмножество открытого, где r — гладкое регулярное отображение $\Phi : G \subset \mathbb{R}^{k+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ равно нулю, — $M_{k,k+m}^{(r)}$.

Proof НУО, ненулевой минор — по последним координатам (y). По Т. о неявном отображении возьмём куб с ребром $a \rightarrow$ шар с радиусом b и неявное отображение: последние координаты по первым. Тогда параметризация:

$$\varphi(u) = (x_0 + au, f(x_0 + au))$$

□

Definition 2.2.11 Переход от параметризации φ к $\psi = L : \begin{pmatrix} W_1 \rightarrow W_2 \\ \psi^{-1} \circ \varphi \end{pmatrix}$, то есть по φ -параметру точки из пересечения стандартных окрестностей даёт ψ -параметр.

Theorem 2.2.12 (*theorem 12: Регулярность перехода*) $L \in C^{(r)}$ и регулярно.

3 Ряды Фурье и приближение функций

3.1 Пространства Лебега

Definition 3.1.13 Пространство Лебега $L_{p(E, \mu)}, p \in [1, \infty]$ — множество функций п. в. $E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ или $\overline{\mathbb{C}}$, для которых

$$\begin{cases} \|f\|_p = \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{1/p} < \infty & p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_E |f| < \infty & p = \infty \end{cases}$$

Definition 3.1.14 Пространство L_p (обозначается без указания множества и меры) — множество 2π -периодических функций п. в. $\mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ или $\overline{\mathbb{C}}$, для которых $\|f\| = \|f\|_{L_p([-\pi, \pi], \mu_1)} < \infty$.

Theorem 3.1.15 Полнота

3.2 Гильбертовы пространства

Definition 3.2.16 Гильбертово пространство — полное линейное пространство со скалярным произведением и нормой, им порождённой.

Example 3.2.17 Пространство $L_2(E, \mu)$ со скалярным произведением:

$$\langle f, g \rangle = \int_E f \bar{g} d\mu$$

(суммируемость $f\bar{g}$ — за счёт неравенства Гёлдера для $p = q = 2$)

Полнота доказана в Теореме 3.1.15

Частные случаи:

- ℓ_2^m — Евклидово пространство
- ℓ_2 — последовательности
- $\ell_2(\mathbb{Z})$ — двусторонние последовательности

Lemma 3.2.18 Сходящийся в \mathcal{H} ряд можно скалярно умножать на вектор почленно

Theorem 3.2.19 (*theorem 19: Критерий сходимости ортогонального ряда*) Сходимость ряда в \mathcal{H} равносильна сходимости $\sum \|x\|^2$, причём

$$\left\| \sum_{i=1}^{\infty} x \right\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \|x\|^2$$

Corollary 3.2.20 Перестановка сходящейся в \mathcal{H} последовательности тоже сходится и имеет тот же предел

Theorem 3.2.21 (*theorem 21: Вычисление коэффициентов ортогонального ряда*) Если $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — ОС, а $\sum_{i=1}^{\infty} c_k e_k \rightarrow x$, то коэффициенты однозначно вычисляются по формуле

$$c_k = \frac{\langle x, e_k \rangle}{\|e_k\|^2}$$

Theorem 3.2.22 (*theorem 22: Свойства частичных сумм Фурье*)

1. S_n — ортогональная проекция x на $\mathcal{L}(\{e_k\})$
2. S_n — элемент наилучшего приближения к x из $\mathcal{L}(\{e_k\})$, причём равенство достигается только при $y = S_n$
3. $\|S_n\| \leq \|x\|$

Corollary 3.2.23 (*corollary 23: Неравенство Бесселя*) Сумма квадратов норм Ряда Фурье x не больше $\|x\|^2$.

Theorem 3.2.24 (*theorem 24: Русс, Фишер*)

1. Ряд Фурье вектора x сходится
2. Сумма ряда Фурье — ортогональная проекция x на $\mathcal{L}(\{e_k\})$
3. Сходится именно к $x \iff$ выполняется *уравнение замкнутости* (то есть в нер-ве Бесселя достигается равенство).

Definition 3.2.25 Базис: любой вектор раскладывается по этой системе

Definition 3.2.26 Полная система: не существует отличного от нуля вектора, ортогонального всем векторам (то есть нельзя добавить ещё один вектор, чтобы осталась ОС)

Definition 3.2.27 Замкнутая система: для любого вектора выполнено *уравнение замкнутости*

Theorem 3.2.28 (*theorem 28: Характеристика базиса*) Утверждения эквивалентны для ОС

$\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$:

1. $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — базис
2. $\forall x, y$ выполнено обобщённое уравнение замкнутости:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=0}^{\infty} c_{k(x)} \overline{c_{k(y)}} \|e_k\|^2$$

3. $\{e_k\}$ — полная система
4. $\{e_k\}$ — замкнутая система
5. $\mathcal{L}(\{e_k\})$ плотна в \mathcal{H}

Theorem 3.2.29 (*theorem 29: Грамм, Шмидт*) систему можно ортонормировать, не изменяя линейную оболочку никакого префикса, притом единственным с точностью до коэффициентов ± 1 образом

Example 3.2.30 (*example 30: Ортогональные базисы многочленов*) Весовая функция \rightarrow вводим скалярное произведение

Theorem 3.2.31 (*theorem 31: Существование элемента наилучшего приближения*)