

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 1

- (1) Scrivere una function Matlab che verifichi che una matrice è simmetrica.
- (2) Scrivere una function Matlab che verifichi che una matrice simmetrica è definita positiva usando il criterio di Sylvester.
- (3) Scrivere una function Matlab che verifichi che una matrice è a diagonale dominante per righe.
- (4) Si consideri la matrice

$$A = rand(10), \quad A = A * A'.$$

- Verificare se è simmetrica;
 - Verificare se è simmetrica e definita positiva;
- (5) Si consideri la matrice

$$A = rand(10) + 100 * diag(ones(1, 10)).$$

Verificare se è a diagonale dominante per righe.

Esercizi per casa

- (1) Scrivere una function Matlab che verifichi che una matrice è a diagonale dominante per colonne.
- (2) Si consideri la matrice

$$A(i, j) = \begin{cases} -1 & i > j \\ 0 & i < j \\ 100 & i = j \end{cases}, \quad i, j = 1, \dots, n$$

con $n = 15$.

- Verificare se è a diagonale dominante per colonne;
- Verificare se è a diagonale dominante per righe.

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 2

- (1) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di sostituzione in avanti.
- (2) scrivere una function Matlab che implementi il metodo di sostituzione all'indietro.
- (3) scrivere una function Matlab che implementi opportunamente il metodo di sostituzione all'indietro per calcolare l'inversa di una matrice triangolare superiore
- (4) Si consideri il sistema lineare $Ax = b$ con

$$A = \text{tril}(\text{rand}(10)), \quad b = \text{sum}(A, 2).$$

Risolvere il sistema con il metodo di sostituzione in avanti.

- (5) Si consideri il sistema lineare $Ax = b$ con

$$A = \text{triu}(\text{rand}(10)), \quad b = \text{sum}(A, 2).$$

- Risolvere il sistema con il metodo di sostituzione all'indietro;
- calcolare l'inversa di A .

Esercizi per casa

- (1) Scrivere una function Matlab che risolvi un sistema diagonale.
 - (2) Risolvere il sistema lineare $Ax = b$ con
- $$A = \text{diag}(\text{diag}(\text{rand}(10))), \quad b = \text{sum}(A, 2).$$
- (3) Scrivere una function Matlab che implementi opportunamente il metodo di sostituzione in avanti per calcolare l'inversa di una matrice triangolare inferiore
 - (4) Calcolare l'inversa della matrice

$$A = \text{tril}(\text{rand}(20)).$$

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 3

- (1) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di eliminazione di Gauss.
- (2) Si consideri il sistema lineare $Ax = b$ con

$$A = rand(100), \quad b = sum(A, 2).$$

Risolvere il sistema con il metodo di Gauss.

- (3) Si consideri il sistema di equazioni lineari $Ax=b$ di ordine $n=15$, con

$$A(i, j) = \begin{cases} -1 & i > j \\ 0 & i < j, \\ 100 & i = j \end{cases}, \quad i, j = 1, \dots, n$$

e

$$b = [1, 1, \dots, 1]^T.$$

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero massimo di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
 - Calcolare il vettore soluzione con il metodo di sostituzione in avanti e riportarne le prime due componenti con le cifre significative che si possono certamente ritenere corrette.
 - Confrontare la soluzione ottenuta (vettore x) con la soluzione che si ottiene usando la function predefinita del Matlab (vettore y). Di quanto differiscono al massimo?
- (4) Si consideri il sistema di equazioni lineari $Ax=b$ di ordine $n=10$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 2 & 4 & 4 & \dots & 4 & 4 \\ 1 & \frac{1}{3} & 2 & 4 & \dots & & 4 \\ 2 & 1 & \frac{1}{4} & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & 2 & \ddots & \ddots & \ddots & 4 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 2 & 4 \\ 0 & \dots & 0 & 2 & 1 & \frac{1}{n} & 2 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 2 & 1 & \frac{1}{n+1} \end{pmatrix}$$

e

$$b = (b_i)_{i=1, \dots, n}, \quad b(i) = \sum_{j=1}^n A_{i,j}.$$

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero massimo di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
 - Calcolare il vettore soluzione con il metodo di eliminazione di Gauss e riportarne le prime due componenti con le cifre significative che si possono certamente ritenere corrette.
 - Confrontare la soluzione ottenuta (vettore x) con la soluzione che si ottiene usando la function predefinita del Matlab (vettore y). Di quanto differiscono al massimo?
 - Confrontare la soluzione ottenuta (vettore x) con il vettore $t = [1, \dots, 1]^T$ che rappresenta la soluzione esatta del sistema. Di quanto differiscono al massimo?
- (5) Si consideri il sistema di equazioni lineari $Ax=b$ di ordine $n=100$, con

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 1 & 4 & \ddots & & 0 \\ 0 & 6 & 5 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 4 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 & 4 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 6 & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 6 & 2n-1 \end{pmatrix}$$

e

$$b = (b_i)_{i=1,\dots,n}, \quad b(i) = \sum_{j=1}^n A_{i,j}.$$

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero massimo di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
- Calcolare il vettore soluzione con il metodo di eliminazione di Gauss e riportare le prime due componenti del vettore soluzione con le cifre significative che si possono certamente ritenere corrette.
- Confrontare la soluzione ottenuta (vettore x) con il vettore $t = [1, \dots, 1]^T$ che rappresenta la soluzione esatta del sistema. Di quanto differiscono al massimo?

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 4

- (1) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di eliminazione di Gauss con la strategia del pivoting parziale.
- (2) Scrivere una function Matlab che prende in input una matrice A e restituisce in output le matrici L e U tali che $A = LU$.
- (3) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 18$, dove

$$A_{i,j} = \cos\left((j-1)\frac{2i-1}{2n}\pi\right), \quad i, j = 1, \dots, n,$$

e

$$b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n,$$

la cui soluzione esatta è $x = [1, \dots, 1]^T$.

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
 - Calcolare la soluzione approssimata del sistema utilizzando il metodo di Gauss e calcolare l'errore relativo. Quante sono le cifre significative corrette?
 - Calcolare la soluzione approssimata del sistema utilizzando il metodo di Gauss con pivoting parziale e calcolare l'errore relativo. Quante sono le cifre significative corrette?
 - Qual è il metodo più stabile?
- (4) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 50$, dove

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 & \dots & 2 & 6 \\ 2 & \frac{5}{2} & 2 & 2 & \ddots & & 2 \\ 2 & 2 & \frac{7}{3} & 2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \ddots & \ddots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 + \frac{1}{n-1} & 2 \\ 6 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 & 2 + \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

e

$$b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n,$$

la cui soluzione esatta è $x = [1, \dots, 1]^T$.

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
- Calcolare la soluzione approssimata del sistema utilizzando il metodo di Gauss e calcolare l'errore relativo. Quante sono le cifre significative corrette?
- Calcolare la soluzione approssimata del sistema utilizzando il metodo di Gauss con pivoting parziale e calcolare l'errore relativo. Quante sono le cifre significative corrette?
- Qual è il metodo più stabile?

(5) Consideriamo il problema di $n = 80$

$$AX = B, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad X \in \mathbb{R}^{n \times 3}, \quad B \in \mathbb{R}^{n \times 3},$$

dove

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 9 & 0 & \frac{1}{3} & \ddots & \vdots \\ \vdots & 0 & 13 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{3} & \ddots & & 0 & 4(n-1)+1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \dots & 0 & 4n+1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & n-1 \\ 1 & 2 & n \end{pmatrix}.$$

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della matrice soluzione X .
- Calcolare la soluzione approssimata Y utilizzando opportunamente la fattorizzazione LU della matrice A . Riportare le componenti della prima riga della matrice Y con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Calcolare il residuo relativo in norma infinito.

Esercizi per casa

- (1) Scrivere una function Matlab che implementi opportunamente il metodo di eliminazione di Gauss per risolvere un sistema a matrice tridiagonale.
- (2) Scrivere una function Matlab che implementi opportunamente il metodo di eliminazione di Gauss per risolvere un sistema a matrice di Hessemberg superiore.

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 4 (2)

- (1) Scrivere una function Matlab che prende in input una matrice A e restituisce in output le matrici L , U e P tali che $PA = LU$ e il numero s degli scambi effettuati.
- (2) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 80$, dove

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 & 2 & \dots & 2 & 8 \\ 4 & \frac{7}{2} & 2 & 2 & \ddots & & 2 \\ 4 & 4 & \frac{10}{3} & 2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 4 & 4 & 4 & \ddots & \ddots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 2 & 2 \\ 4 & 4 & \dots & 4 & 4 & 3 + \frac{1}{n-1} & 2 \\ 10 & 4 & 4 & \dots & 4 & 4 & 3 + \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

e

$$b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n,$$

la cui soluzione esatta è $x = [1, \dots, 1]^T$.

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
 - Calcolare la soluzione approssimata del sistema utilizzando opportunamente il metodo di Gauss e calcolare l'errore relativo. Quante sono le cifre significative corrette?
 - Calcolare il Determinante della matrice A .
 - Calcolare l'inversa della matrice A .
- (3) Data la matrice di ordine $n = 40$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 & \frac{1}{2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & 0 & \frac{1}{10} & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \ddots & & 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{10} \end{pmatrix},$$

Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolarne:

- il determinante;
- l'inversa.

Esercizi per casa

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 1 & \frac{1}{2} & 3 & \dots & 3 & 3 \\ 0 & 10 & 1 & \frac{1}{3} & \ddots & & 3 \\ 2 & 0 & 10 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & 2 & 0 & \ddots & \ddots & \frac{1}{n-2} & 3 \\ 2 & & \ddots & \ddots & \ddots & 1 & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{2} & \ddots & & 2 & 0 & 10 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 2 & \dots & 2 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

e

$$b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n,$$

la cui soluzione esatta è $x = [1, \dots, 1]^T$.

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
- Calcolare la soluzione approssimata del sistema utilizzando opportunamente il metodo di Gauss e calcolare l'errore relativo. Quante sono le cifre significative corrette?
- Calcolare il Determinante della matrice A .
- Calcolare l'inversa della matrice A .

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 5

- (1) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di Cholesky.
- (2) Modificare le functions che implementano le fattorizzazioni $A = LU$ e $PA = LU$ in modo da fornire in output anche il corrispondente fattore di crescita ρ per la valutazione della loro stabilità numerica.
- (3) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 100$, dove

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 2 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 0 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 4 & 0 & 5 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & 0 & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 5 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & \dots & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad A = A * A^T$$

e

$$b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n,$$

la cui soluzione esatta è $x = [1, \dots, 1]^T$.

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
 - Proporre uno o più metodi numerici per calcolare la soluzione del sistema $Ax = b$ con la massima precisione possibile. Calcolare l'errore relativo in norma infinito. Quante sono le cifre significative corrette della soluzione calcolata?
 - Motivare la scelta del metodo effettuata e commentare i risultati ottenuti.
 - Calcolare il determinante di A .
 - Calcolare l'inversa di A .
 - Verificare che il fattore di crescita ρ relativo alla fattorizzazione LU è uguale a 1.
- (4) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 100$, dove

$$A(i, j) = \begin{cases} -7, & i = j \\ -2, & |i - j| = 1 \\ 1, & |i - j| = 4 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

1

e

$$b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n,$$

la cui soluzione esatta è $x = [1, \dots, 1]^T$.

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
- Proporre uno o più metodi numerici per calcolare la soluzione del sistema $Ax = b$ con la massima precisione possibile. Calcolare l'errore relativo in norma infinito. Quante sono le cifre significative corrette della soluzione calcolata?
- Valutare la stabilità dei metodi proposti mediante il calcolo del fattore di crescita ρ .
- Motivare la scelta del metodo effettuata e commentare i risultati ottenuti.
- Calcolare il determinante di A .
- Calcolare l'inversa di A .
- Verificare che il fattore di crescita ρ relativo alla fattorizzazione LU è minore di 2.

(5) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 80$, dove

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -3 & -3 & -3 & \dots & -3 \\ 2 & 15 & -3 & -3 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 15 & \ddots & \ddots & -3 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & -3 \\ \vdots & \ddots & & 2 & 15 & -3 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

e

$$b = [1, \dots, 1]^T.$$

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
- Calcolare la soluzione approssimata y del sistema utilizzando opportunamente il metodo di Gauss. Riportare le prime 2 componenti del vettore y con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Verificare la stabilità del metodo di Gauss usato, valutando il suo fattore di crescita ρ .
- Calcolare la norma infinito del residuo $Ay - b$.
- Calcolare il determinante di A .

- Calcolare l'inversa di A .

(6) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 60$, con A matrice di Wilkinson

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & & \vdots & 1 \\ -1 & -1 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & -1 & \ddots & \ddots & 0 & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & \dots & -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & \dots & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

e $b(i) = \sum_{j=1}^n a_{i,j}$, $i = 1 : n$

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
- Stabilire in base a proprietà eventuali della matrice quale variante del metodo di Gauss o fattorizzazione è più conveniente usare per garantire la massima stabilità al minimo costo.
- Calcolare il fattore di crescita ρ se si usa il GE.
- Calcolare la soluzione e l'errore relativo commesso.
- Calcolare il fattore di crescita ρ se si usa il GEPP.
- Calcolare la soluzione e l'errore relativo commesso.
- Fare opportune considerazioni sui risultati ottenuti
- Calcolare la soluzione con il GETP e l'errore relativo commesso. Utilizzare opportunamente la function predefinita del Matlab `lu`.
- Fare opportune considerazioni sui risultati ottenuti
- Ripetere lo stesso esercizio con $n = 50$.

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 5 (2)

- (1) Scrivere una function Matlab che calcoli il fattore ρ di crescita per la valutazione dell'errore algoritmico in GE e GEPP.
- (2) Scrivere una function Matlab per la determinazione delle matrici L, U, P, Q tali che $PAQ = LU$ con pivoting totale.
- (3) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 60$, con A matrice di Wilkinson

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & & \vdots & 1 \\ -1 & -1 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & -1 & \ddots & \ddots & 0 & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & \dots & -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & \dots & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

e $b(i) = \sum_{j=1}^n a_{i,j}, \quad i = 1 : n$

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
 - Stabilire in base a proprietà eventuali della matrice quale variante del metodo di Gauss o fattorizzazione è più conveniente usare per garantire la massima stabilità al minimo costo.
 - Calcolare il fattore di crescita ρ se si usa il GEPP.
 - Calcolare la soluzione e l'errore relativo commesso.
 - Fare opportune considerazioni sui risultati ottenuti
 - Calcolare la soluzione con il GETP e l'errore relativo commesso.
 - Fare opportune considerazioni sui risultati ottenuti
 - Ripetere lo stesso esercizio con $n = 50$.
- (4) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 60$, con $b(i) = i \quad i = 1, 2, \dots, n$ ed $A = G * G'$, essendo

$$\begin{aligned}
G(i, i+1) &= \cos(2i+1), \quad i = 1, 2, \dots, n-1 \\
G(i, i) &= n+1, \quad i = 1, 2, \dots, n \\
G(i, 1) &= 1, \quad i \geq 2 \\
0 &\quad \text{altrove}
\end{aligned}$$

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
- Stabilire in base a proprietà eventuali della matrice quale variante del metodo di Gauss o fattorizzazione è più conveniente usare per garantire la massima stabilità al minimo costo.
- Calcolare il fattore di crescita ρ se si usa il GEPP.
- Calcolare la soluzione e l'errore relativo commesso.
- Fare opportune considerazioni sui risultati ottenuti

(5) Consideriamo i sistemi lineari

$$Gx = c$$

$$Gy = d$$

con $G = (g_{i,j})_{i,j=1,\dots,n}$ matrice dell'esercizio precedente e con

$$c(i) = \sum_{j=1}^n g_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n,$$

$$d(i) = 1, \quad i = 1 : n$$

- Calcolare l'indice di condizionamento e il numero di cifre significative corrette che ci si può aspettare nel calcolo della soluzione approssimata.
- Stabilire in base a proprietà eventuali della matrice quale variante del metodo di Gauss o fattorizzazione è più conveniente usare per garantire la massima stabilità al minimo costo.
- Calcolare il fattore di crescita ρ se si usa il GEPP.
- Calcolare la soluzione e l'errore relativo commesso.
- Fare opportune considerazioni sui risultati ottenuti

(6) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 80$ con

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 200 \\ 1 & 10 & 2 & \ddots & & \ddots & 2 \\ 0 & 1 & 10 & \ddots & \ddots & & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & \ddots & \ddots & \ddots & n-2 & 0 \\ 2 & \ddots & & \ddots & 1 & 10 & n-1 \\ 100 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 10 \end{pmatrix}$$

e $b = \{b_i\}_{i=1,\dots,n}^T, \quad b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n.$

- Riportare le istruzioni Matlab utilizzate per la costruzione di A e b .
 - Calcolare la soluzione approssimata del sistema con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le istruzioni Matlab utilizzate e le prime 2 componenti del vettore soluzione con le cifre che si possono ritenere corrette.
 - Motivare la scelta del metodo.
 - Qual è il costo computazionale del metodo numerico utilizzato?
 - Poichè è noto che la soluzione è $x = (1, 1, \dots, 1)^T$, calcolare l'errore relativo. Riportarne il valore e le istruzioni Matlab utilizzate. Quante sono le cifre significative corrette?
 - Commentare i risultati ottenuti.
- (7) Determinare la matrice inversa della matrice data nell'esercizio precedente. Indicare:
- la procedura utilizzata
 - la fattorizzazione più adeguata per garantire stabilità
 - il costo computazionale.

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 8

- (1) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 100$ con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 6 & \ddots & \vdots & 0 \\ \vdots & 2 & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 2 & \vdots & \ddots & \ddots & 2n-2 & 0 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 & 0 & 2n \end{pmatrix}$$

e $b = \{b_i\}_{i=1,\dots,n}^T, \quad b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n.$

- Riportare le istruzioni Matlab utilizzate per la costruzione di A e b .
- Calcolare la soluzione approssimata del sistema con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le istruzioni Matlab utilizzate e le prime 2 componenti del vettore soluzione con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Motivare la scelta del metodo.
- Qual è il costo computazionale del metodo numerico utilizzato?
- Poichè è noto che la soluzione è $x = (1, 1, \dots, 1)^T$, calcolare l'errore relativo. Riportarne il valore e le istruzioni Matlab utilizzate. Quante sono le cifre significative corrette?
- Commentare i risultati ottenuti.

- (2) Consideriamo il sistema lineare $AX = B$ di ordine $n = 80$ con

$$A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,n} = \left(\sqrt{\frac{2}{n+1}} \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) \right)_{i,j=1,\dots,n}$$

e

$$b = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n A_{1,j} & 1 & 2 \\ \sum_{j=1}^n A_{2,j} & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n A_{n,j} & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Riportare le istruzioni Matlab utilizzate per la costruzione di A e b .
- Calcolare la soluzione approssimata del sistema con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le istruzioni Matlab utilizzate e le prime 2 righe della matrice soluzione con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Motivare la scelta del metodo.
- Qual è il costo computazionale del metodo numerico utilizzato?
- Calcolare il residuo relativo. Riportarne il valore e le istruzioni Matlab utilizzate. Quante sono le cifre significative corrette?
- Commentare i risultati ottenuti.

(3) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 110$ con

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & 0 & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

e

$$b = \{b_i\}_{i=1,\dots,n}^T, \quad b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n.$$

- Riportare le istruzioni Matlab utilizzate per la costruzione di A e b .
- Calcolare la soluzione approssimata del sistema con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le istruzioni Matlab utilizzate e le prime 2 componenti del vettore soluzione con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Motivare la scelta del metodo.
- Qual è il costo computazionale del metodo numerico utilizzato?
- Poichè è noto che la soluzione è $x = (1, 1, \dots, 1)^T$, calcolare l'errore relativo. Riportarne il valore e le istruzioni Matlab utilizzate. Quante sono le cifre significative corrette?
- Commentare i risultati ottenuti.

(4) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 120$ con

$$A = \begin{pmatrix} 2(n+1) & 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2(n+1) & 4 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2(n+1) & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & -1 & 2(n+1) & 2(n-1) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & 2(n+1) \end{pmatrix}.$$

e

$$b = \{b_i\}_{i=1,\dots,n}^T, \quad b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n.$$

- Riportare le istruzioni Matlab utilizzate per la costruzione di A e b .
- Calcolare la soluzione approssimata del sistema con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le istruzioni Matlab utilizzate e le prime 2 componenti del vettore soluzione con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Motivare la scelta del metodo.
- Qual è il costo computazionale del metodo numerico utilizzato?
- Poichè è noto che la soluzione è $x = (1, 1, \dots, 1)^T$, calcolare l'errore relativo. Riportarne il valore e le istruzioni Matlab utilizzate. Quante sono le cifre significative corrette?
- Calcolare l'inversa B della matrice A con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le istruzioni Matlab utilizzate e il valore delle componenti $B(3, 4)$ e $B(4, 4)$ con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Commentare i risultati ottenuti.

(5) Data la matrice di ordine $n = 80$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -2 & -2 & \dots & -2 & 5 \\ 2 & \frac{1}{8} & -2 & \ddots & & -2 \\ 2 & 2 & \frac{1}{12} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -2 & -2 \\ 2 & & \ddots & \ddots & \frac{1}{4n-4} & -2 \\ 9 & 2 & \dots & 2 & 2 & \frac{1}{4n} \end{pmatrix}.$$

- Riportare le istruzioni Matlab utilizzate per la sua costruzione.
- Calcolare il determinante della matrice A con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le istruzioni Matlab utilizzate e il valore del determinante con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Motivare la scelta del metodo.
- Qual è il costo computazionale del metodo numerico utilizzato?

(6) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 80$ con

$$A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,n} \quad \text{con} \quad a_{i,j} = \min\{i, j\}$$

e

$$b = \{b_i\}_{i=1,\dots,n}^T, \quad b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n.$$

- Riportare le istruzioni Matlab utilizzate per la costruzione di A e b .
- Calcolare la soluzione approssimata del sistema con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le istruzioni Matlab utilizzate e le prime 2 componenti del vettore soluzione con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Motivare la scelta del metodo.
- Qual è il costo computazionale del metodo numerico utilizzato?
- Poichè è noto che la soluzione è $x = (1, 1, \dots, 1)^T$, calcolare l'errore relativo. Riportarne il valore e le istruzioni Matlab utilizzate. Quante sono le cifre significative corrette?
- Calcolare il determinante della matrice A con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le istruzioni Matlab utilizzate e il valore del determinante con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Commentare i risultati ottenuti.

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 9

- (1) Considerare la matrice test A definita mediante i comandi Matlab

$$B = \text{gallery}('kahan', 80);$$
$$A = B(:, 1 : 30).$$

- Determinare le dimensioni della matrice e stabilire se è o meno a rango massimo.
 - Considerare il sistema $Ax = b$ con $b(i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}$, $i = 1, \dots, m$ nel senso dei minimi quadrati. Studiare l'esistenza e l'unicità della soluzione del sistema, il condizionamento del problema e determinare la stima dell'errore teorico a priori.
 - Scegliere il metodo che conviene applicare e giustificare la scelta.
 - È noto che in questo caso la soluzione è data da $\bar{x} = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. Calcolare quindi l'errore commesso e confrontare il risultato ottenuto con la stima a priori.
- (2) Considerare la matrice test A definita mediante il comando Matlab

$$A = \text{gallery}('chebvand', 350, 60).$$

- Determinare le dimensioni della matrice e stabilire se è o meno a rango massimo.
 - Considerare il sistema $Ax = b$ con $b(i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}$, $i = 1, \dots, m$ nel senso dei minimi quadrati. Studiare l'esistenza e l'unicità della soluzione del sistema, il condizionamento del problema e determinare la stima dell'errore teorico a priori.
 - Scegliere il metodo che conviene applicare e giustificare la scelta.
 - È noto che in questo caso la soluzione è data da $\bar{x} = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. Calcolare quindi l'errore commesso e confrontare il risultato ottenuto con la stima a priori.
- (3) Considerare la matrice test A definita mediante i comandi Matlab

$$B = \text{gallery}('kms', 100, .1);$$
$$A = B(:, 1 : 30).$$

- Determinare le dimensioni della matrice e stabilire se è o meno a rango massimo.

- Considerare il sistema $Ax = b$ con $b(i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}$, $i = 1, \dots, m$ nel senso dei minimi quadrati. Studiare l'esistenza e l'unicità della soluzione del sistema, il condizionamento del problema e determinare la stima dell'errore teorico a priori.
 - Scegliere il metodo che conviene applicare e giustificare la scelta.
 - È noto che in questo caso la soluzione è data da $\bar{x} = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. Calcolare quindi l'errore commesso e confrontare il risultato ottenuto con la stima a priori.
- (4) Considerare la matrice test A definita mediante i comandi Matlab

$A = \text{gallery}('lauchli', 100) * \text{gallery}('lehmer', 100);$

- Determinare le dimensioni della matrice e stabilire se è o meno a rango massimo.
 - Considerare il sistema $Ax = b$ con $b(i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}$, $i = 1, \dots, m$ nel senso dei minimi quadrati. Studiare l'esistenza e l'unicità della soluzione del sistema, il condizionamento del problema e determinare la stima dell'errore teorico a priori.
 - Scegliere il metodo che conviene applicare e giustificare la scelta.
 - Calcolare l'errore commesso confrontando la soluzione ottenuta con quella che si ottiene utilizzando la function \ del MatLab. Confrontare tale errore con la stima a priori.
- (5) Data la matrice di ordine $n = 100$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & \dots & \dots & -1 \\ 4 & 2 & -2 & \dots & \dots & -2 \\ 4 & 4 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -2 & -2 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & n-1 & -2 \\ 5 & 4 & \dots & 4 & 4 & n \end{pmatrix},$$

considerare la matrice $A = B(:, 1 : 7)$.

- Determinare le dimensioni della matrice e stabilire se è o meno a rango massimo.
- Considerare il sistema $Ax = b$ con $b = 2 * \text{sum}(A, 2)$, nel senso dei minimi quadrati. Studiare l'esistenza e l'unicità della soluzione del sistema, il condizionamento del problema e determinare la stima dell'errore teorico a priori.

- Scegliere il metodo che conviene applicare e giustificare la scelta.
 - Commentare i risultati ottenuti.
- (6) Considerare la seguente matrice test
 $A = \text{gallery}('lauchli', 10)$.
- Determinare le dimensioni della matrice e stabilire se è o meno a rango massimo.
 - Considerare il sistema $Ax = b$ con $b(i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}$, $i = 1, \dots, m$ nel senso dei minimi quadrati. Studiare l'esistenza e l'unicità della soluzione del sistema, il condizionamento del problema e determinare la stima dell'errore teorico a priori.
 - Scegliere il metodo che conviene applicare e giustificare la scelta. Qual è il suo costo computazionale?
 - È noto che in questo caso la soluzione è data da $\bar{x} = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. Calcolare quindi l'errore commesso e confrontare il risultato ottenuto con la stima a priori.
- (7) Sia $m = 90$. Consideriamo il sistema $Ax = b$ nel senso dei minimi quadrati, dove

$$A = (a_{i,j})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,\frac{m}{3}}}, \quad a_{i,j} = \begin{cases} \sin(i + 2j) + 1, & i = j \\ \cos(2i + j - 5), & i \neq j \end{cases},$$

$$b = \{b_i\}_{i=1,\dots,m}, \quad b_i = \sum_{j=1}^{\frac{m}{3}} a_{i,j}, \quad i = 1, \dots, m.$$

- Riportare le istruzioni Matlab utilizzate per la costruzione di A e b .
- Determinare le dimensioni della matrice e stabilire se è o meno a rango massimo.
- Studiare l'esistenza e l'unicità della soluzione del sistema, il condizionamento del problema e determinare la stima dell'errore teorico a priori.
- Scegliere il metodo che conviene applicare e giustificare la scelta. Qual è il suo costo computazionale?
- È noto che in questo caso la soluzione è data da $\bar{x} = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^{\frac{m}{4}}$. Calcolare quindi l'errore commesso e confrontare il risultato ottenuto con la stima a priori.

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 9 (2)

- (1) Considerare la seguente matrice test

$$A = \text{gallery}('lauchli', 10).$$

- Determinare le dimensioni della matrice e stabilire se è o meno a rango massimo.
 - Considerare il sistema $Ax = b$ con $b(i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}$, $i = 1, \dots, m$ nel senso dei minimi quadrati. Studiare l'esistenza e l'unicità della soluzione del sistema, il condizionamento del problema e determinare la stima dell'errore teorico a priori.
 - Scegliere il metodo che conviene applicare e giustificare la scelta. Qual è il suo costo computazionale?
 - È noto che in questo caso la soluzione è data da $\bar{x} = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. Calcolare quindi l'errore commesso e confrontare il risultato ottenuto con la stima a priori.
- (2) Sia $m = 90$. Consideriamo il sistema $Ax = b$ nel senso dei minimi quadrati, dove

$$A = (a_{i,j})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,\frac{m}{3}}}, \quad a_{i,j} = \begin{cases} \sin(i + 2j) + 1, & i = j \\ \cos(2i + j - 5), & i \neq j \end{cases},$$

$$b = \{b_i\}_{i=1,\dots,m}^T, \quad b_i = \sum_{j=1}^{\frac{m}{3}} a_{i,j}, \quad i = 1, \dots, m.$$

- Riportare le istruzioni Matlab utilizzate per la costruzione di A e b .
- Determinare le dimensioni della matrice e stabilire se è o meno a rango massimo.
- Studiare l'esistenza e l'unicità della soluzione del sistema, il condizionamento del problema e determinare la stima dell'errore teorico a priori.
- Scegliere il metodo che conviene applicare e giustificare la scelta. Qual è il suo costo computazionale?
- È noto che in questo caso la soluzione è data da $\bar{x} = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^{\frac{m}{4}}$. Calcolare quindi l'errore commesso e confrontare il risultato ottenuto con la stima a priori.

(3) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 90$ con

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & & & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \ddots & 3 & n-1 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & (n-1)+3 & n \\ 2 & 3 & \cdots & \cdots & n-1 & n & n+3 \end{pmatrix}$$

$$b = \{b_i\}_{i=1,\dots,n}^T, \quad b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n.$$

- Calcolare la soluzione approssimata del sistema con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le prime 2 componenti del vettore soluzione con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Motivare la scelta del metodo.
- Qual è il costo computazionale del metodo numerico utilizzato?
- Poichè è noto che la soluzione è $x = (1, 1, \dots, 1)^T$, calcolare l'errore relativo. Quante sono le cifre significative corrette?
- Commentare i risultati ottenuti.

(4) Consideriamo il sistema lineare $Ax = b$ di ordine $n = 90$ con

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 2 & & 2 \\ 2 & 2 & 5 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & 2 & \ddots & \ddots & 2 & 2 \\ 2 & & \ddots & 2 & 2n-3 & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2_n & 2 & 2n-1 \end{pmatrix}$$

$$b = \{b_i\}_{i=1,\dots,n}^T, \quad b_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j}, \quad i = 1, \dots, n.$$

- Calcolare la soluzione approssimata del sistema con la massima precisione possibile usando una opportuna procedura numerica. Riportare le prime 2 componenti del vettore soluzione con le cifre che si possono ritenere corrette.
- Motivare la scelta del metodo.
- Qual è il costo computazionale del metodo numerico utilizzato?
- Poichè è noto che la soluzione è $x = (1, 1, \dots, 1)^T$, calcolare l'errore relativo. Quante sono le cifre significative corrette?
- Commentare i risultati ottenuti.

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 10

- (1) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di bisezione.
- (2) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di Newton.
- (3) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo combinato bisezione-Newton.
- (4) Data l'equazione

$$F(x) = \cos(x) - 4x.$$

- Individuare un intervallo che contenga lo zero della funzione.
 - Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo di Bisezione. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dal metodo.
 - Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo di Newton. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dal metodo.
 - Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo combinato di bisezione-Newton. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dai metodi.
- (5) Data l'equazione

$$F(x) = e^x + \frac{x}{10}.$$

- Individuare un intervallo che contenga lo zero della funzione.
- Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo di Bisezione. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dal metodo.
- Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo di Newton. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dal metodo.
- Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo combinato di bisezione-Newton. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dai metodi.

(6) Data l'equazione

$$F(x) = x + \log(x^3).$$

- Individuare un intervallo che contenga lo zero della funzione.
- Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo di Bisezione. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dal metodo.
- Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo di Newton. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dal metodo.
- Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo combinato di bisezione-Newton. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dai metodi.

(7) Supponiamo che una reazione chimica origini ad un certo istante t una concentrazione di un particolare ione data dalla legge:

$$c(t) = 7e^{-5t} + 3e^{-2t}.$$

Se all'istante iniziale la concentrazione iniziale è $c(0) = 10$, a quale istante \bar{t} la concentrazione iniziale si sarà dimezzata, ossia

$$c(\bar{t}) = 5?$$

- Tenendo conto che il problema è equivalente a quello di determinare lo zero dell'equazione

$$F(t) = 7e^{-5t} + 3e^{-2t} - 5 = 0,$$

individuare un intervallo del semiasse positivo che contenga lo zero della funzione F .

- Approssimare lo zero con la precisione di macchina utilizzando il metodo combinato di bisezione-Newton. Riportare il valore approssimato dello zero e il numero di iterazioni effettuate dai metodi.

Esercizi per casa

- (1) Calcolare $\sqrt{33}$ con la precisione di macchina utilizzando il metodo combinato di bisezione-Newton.
- (2) Calcolare $1/43$ con la precisione di macchina utilizzando il metodo combinato di bisezione-Newton.

CALCOLO SCIENTIFICO - MODULO A

Esercitazione n. 11

- (1) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di bisezione per equazioni algebriche.
- (2) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di Newton per equazioni algebriche.
- (3) Scrivere una function Matlab che implementi il metodo combinato bisezione-Newton per equazioni algebriche.
- (4) Scrivere una function Matlab che implementi l'algoritmo di Horner per il calcolo del valore di un polinomio e della sua derivata in un punto.
- (5) Scrivere una function Matlab che calcoli gli indici di condizionamento delle radici semplici e multiple.
- (6) Sia

$$P(x) = x^6 - x - 1.$$

- Approssimare le radici reali di P con la precisione di macchina utilizzando il metodo combinato di bisezione-Newton. Qual è il numero di iterazioni del metodo di bisezione? Qual è il numero di iterazioni del metodo di Newton?
- Studiare il condizionamento delle radici reali di P . Riportare il valore delle radici con le cifre che si possono ritenere corrette.

- (7) Sia

$$P(x) = x^9 + 2x^8 - 3x^7 + x^6 + x^4 - 2x^2 + x - 1$$

- Approssimare le radici reali di P con la precisione di macchina utilizzando il metodo combinato di bisezione-Newton. Qual è il numero di iterazioni del metodo di bisezione? Qual è il numero di iterazioni del metodo di Newton?
- Studiare il condizionamento delle radici reali di P . Riportare il valore delle radici con le cifre che si possono ritenere corrette.

- (8) Sia

$$P(x) = 2x^9 - 3x^8 + 4x^5 + \frac{1}{2}x^4 - x^3 + x - \frac{1}{2}$$

- Individuare l'intervallo che contiene tutte le radici reali.
- Quante sono le radici reali? Che molteplicità hanno? Trovare per ciascuna radice reale un intervallo che la contiene.
- Approssimare le radici reali di P con la precisione di macchina utilizzando il metodo combinato di bisezione-Newton. Qual

è il numero di iterazioni del metodo di bisezione? Qual è il numero di iterazioni del metodo di Newton?

- Studiare il condizionamento delle radici reali di P . Riportare il valore delle radici con le cifre che si possono ritenere corrette.

CALCOLO SCIENTIFICO I

Esercitazione n. 12

(1) Sia

$$P(x) = x^7 - 3x^6 + 2.25x^5 - x^3 + 3.5x^2 - 3.75x + 1.125.$$

- Il polinomio P ha $x = \frac{3}{2}$ come radice doppia. Calcolarne il condizionamento.
- Approssimarla con la precisione di macchina utilizzando il metodo Newton. Qual è il numero di iterazioni?
- Approssimarla con la precisione di macchina utilizzando il metodo Newton opportunamente modificato. Qual è il numero di iterazioni?
- Approssimarla con la function roots del MatLab.

(2) Sia

$$P(x) = x^5 + 0.631x^4 + 0.676387x^3 - 0.325473867x^2 + 0.043526132999999995x - 0.001860867$$

- Individuare l'intervallo che contiene tutte le radici reali di P .
- Quante sono le radici reali? Che molteplicità hanno? Trovare per ciascuna radice reale un intervallo che la contiene.
- Approssimare le radici reali di P con la precisione di macchina utilizzando opportunamente i metodi studiati. Qual è il numero di iterazioni del metodo utilizzato?
- Studiare il condizionamento delle radici reali di P . Riportare il valore delle radici con le cifre che si possono ritenere corrette.

(3) Sia

$$P(x) = x^8 - 4.01x^7 + 4.02x^6 + x^3 - 3.01x^2 + 0.01x + 4.02.$$

- Individuare l'intervallo che contiene tutte le radici reali di P .
- Quante sono le radici reali? Che molteplicità hanno? Trovare per ciascuna radice reale un intervallo che la contiene.
- Approssimare le radici reali di P con la precisione di macchina utilizzando opportunamente i metodi studiati. Qual è il numero di iterazioni del metodo utilizzato?
- Studiare il condizionamento delle radici reali di P . Riportare il valore delle radici con le cifre che si possono ritenere corrette.

(4) Sia

$$P(x) = 2x^8 - 8.02x^7 + 8.04x^6 + x^3 - 3.01x^2 + 0.001x + 4.02$$

- Individuare l'intervallo che contiene tutte le radici reali.
- Quante sono le radici reali? Che molteplicità hanno? Trovare per ciascuna radice reale un intervallo che la contiene.
- Approssimare le radici reali di P con la precisione di macchina utilizzando opportunamente i metodi studiati. Qual è il numero di iterazioni del metodo utilizzato?
- Studiare il condizionamento delle radici reali di P . Riportare il valore delle radici con le cifre che si possono ritenere corrette.

(5) Sia

$$P(x) = x^{10} - 55x^9 + 1320x^8 - 18150x^7 + 157773x^6 - 902055x^5 + 3416930x^4 - 8409500x^3 + 12753576x^2 - 10628640x + 3628800.$$

- Individuare l'intervallo che contiene tutte le radici reali di P .
- Quante sono le radici reali? Che molteplicità hanno? Trovare per ciascuna radice reale un intervallo che la contiene.
- Approssimare le radici reali di P con la precisione di macchina utilizzando opportunamente i metodi studiati. Qual è il numero di iterazioni del metodo utilizzato?
- Studiare il condizionamento delle radici reali di P . Riportare il valore delle radici con le cifre che si possono ritenere corrette.

(6) Sia

$$P(x) = x^6 - 2x^5 - 4x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 4x - 4$$

- Individuare l'intervallo che contiene tutte le radici reali di P .
- Quante sono le radici reali? Che molteplicità hanno? Trovare per ciascuna radice reale un intervallo che la contiene.
- Approssimare le radici reali di P con la precisione di macchina utilizzando opportunamente i metodi studiati. Qual è il numero di iterazioni del metodo utilizzato?
- Studiare il condizionamento delle radici reali di P . Riportare il valore delle radici con le cifre che si possono ritenere corrette.