

日本語版・日本向け

再生数が伸びないショート動画の診断書

露出から転換まで、弱点を特定し、次の動画で一つの処方に変える方法

AI生成のイメージ人物

36 PAGES / 2026 EDITION

読む前に確認すること

視聴数は症状であり、原因ではありません。

「視聴数が低い」→「編集を全部変える」
この処方では原因も学びも残りません。

1. 定義を確認
プラットフォームごとに視聴・リーチ・アクティブ視聴の集計方法が異なります。

2. 類似条件で比較
同じチャンネル、似た長さ、同じフォーマット、近い期間で比較しましょう。

3. 数字よりパターン
1本の偶然より、直近10本で繰り返される弱い区間を探します。

4. 一度に一つだけ処方
テーマ・サムネイル・構成・リワードのうち、どれか一つだけ変えて因果関係を残します。

本書の区間・期間・スコアは運用用フレームです。プラットフォームが保証する数値や絶対的な合格ラインではありません。

目次

診断は最初の段階から始めます

00 診断の原則
視聴数という一つの数字を5段階に分解 04-07

01 露出が少ない
フィード・検索・おすすめ資格・テーマ需要 08-13

02 表示されても止まらない
サムネ・約束・フックA/B/C 14-19

03 冒頭後に離脱される
維持曲線・シーン構成・可読性 20-25

04 完走しても拡散しない
リワード・共有・コメント・CTA 26-29

05 処方して再測定
単一変数テスト・14日間の改善計画 30-36

診断の原則

原因候補を5段階に分けましょう

1. 露出
フィードにほとんど表示されない
テーマ・資格・ソース

2. スクロール停止
表示されたがすぐに飛ばされる
サムネ・フック・約束

3. 維持
冒頭後にどんどん離脱される
構成・リズム・明瞭さ

4. 反応
完走されても拡散しない
リワード・共有・コメント

5. 転換
反応はあるがチャンネル登録がない
チャンネルの約束・CTA

前の段階で詰まっていると、後ろの段階の指標はそもそもサンプルが不足します。

診断マップ

視聴数よりも先に、詰まっている段階を特定しましょう。

弱い指標を見つけ、その指標を説明するシーンを見直し、次の動画で一つの変数だけを変えます。

SIGNAL
どの数字が弱いか

SCENE
どのシーンで折れたか

TEST
次回は何だけを変えるか

診断の目的は過去の動画を責めることではなく、次の動画の選択肢を絞ることです。

診断フローチャート

一番最初に失敗した質問を選びましょう

1. フィードに十分表示されたか？
いいえ → 露出診断

2. 表示された人が視聴を選んだか？
いいえ → スクロール停止診断

3. 約束したリワードまで残ったか？
いいえ → 維持診断

4. 共有や保存する理由があったか？
いいえ → 反応診断

5. チャンネルを再訪する理由が生まれたか？
いいえ → 転換診断

「はい」が初めて出た地点ではなく、「いいえ」が初めて出た地点から処方を始めます。

この本の使い方

1本の動画に1枚だけ適用すればOKです。

1. 基準線を作る
直近10本を同じ形式・長さでまとめ、中央値を書き出します。

2. 最初の失敗ポイントを見つける
「露出 → 停止 → 維持 → 反応 → 転換」の順で確認します。

3. シーンで確認する
グラフが折れ曲がる直前のセリフ・画面・転換点を見直します。

4. 処方を1つ選ぶ
最初のフレーム、フックのセリフ、中間構成、報酬のうち1つだけ選びます。

5. 記録して繰り返す
初動・24時間・7日間の流れと学んだことを一言で残します。

診断表を埋めた後も原因が2つある場合は、より前の段階から影響が大きい方を優先して試しましょう。

PART 01 露出が少ない

まずフィードに表示される機会があったかを確認します。

今回のパートの最初の質問
フィードに表示される機会があったかを確認します。

診断の流れ：
シグナル確認 → シーン確認 → 1つの変数で処方

PART 01 基準線

「少ない」という言葉を数値に変換しましょう。

バズった1本と比べず、直近10本の中央値と比較します。

1. 比較グループ
同じチャンネル・似た長さ・同じフォーマット

2. 観察ウィンドウ
初動シグナル・24時間・7日間累計

3. 代表値
直近10本の中央値＋上位3本の範囲

4. 診断文
「再生数が少ない」ではなく「フィード露出が基準線の半分」

中央値は1〜2本の大きな成功や失敗に左右されにくく、小規模チャンネルの運営基準として使いやすい指標です。

PART 01 流入経路

露出不足か流入構造の問題かを区別しましょう。

Shortsフィード
推薦テストを受ける主要区間
フィード表示・選択視聴

検索
質問・問題解決型テーマの寿命
検索ワード・タイトル一致

ホーム・おすすめ
既存の視聴履歴とテーマの関連
繰り返しテーマ・シリーズ

チャンネル・登録
既に知っている人の再訪
登録者の反応・チャンネルの約束

外部
シェア・埋め込み・他SNS

流入元ごとの視聴品質
フィード露出が少ない場合、最初のフレームだけ直す前に、
テーマ・推薦資格・繰り返しフォーマットから確認しましょう。

PART 01 推薦資格

コンテンツが推薦される状態かをまず確認しましょう。

・アカウントと投稿が公開設定で、年齢・地域制限が意図通りか
・プラットフォームのアカウント状態・推薦資格画面に制限警告がない
・著作権・コミュニティ・推薦ガイド違反の通知がない
・ウォーターマークや低画質の再アップロード、繰り返しコピーに見えない
・タイトル・ハッシュタグ・本文が実際の動画内容と一致している
・過度にセンシティブや誤解を招くシーンが最初の画面に露出しすぎていない
・アップロード処理・音源制限・可視性設定に技術的な問題がない

推薦資格は推薦を保証するものではありませんが、資格制限は露出診断の最優先原因です。

PART 01 テーマ需要

編集前にテーマが見る理由を持っているか採点しましょう。

1/5 問題の明確さ
誰がどんな不便を感じているか一文で説明

2/5 タイムリーさ
今まさに繰り返し聞かれたり探されているテーマ

3/5 証拠
結果・画面・数字・事例を見せられるか

4/5 違い
既存の答えと異なる視点・検証・選択基準

5/5 拡張性
続編3本以上に発展できるか

このスコアは合格ラインではなく、候補10本の中から先に作る3本を選ぶための比較ツールです。

症状別・最初の処方選び

症状
フィード露出自体が少ない
考えられる原因：資格・テーマ・繰り返しフォーマットの確認
最初の処方：同じフォーマットで3本のシリーズを作る

症状
検索流入しかない
考えられる原因：おすすめ型の緊張感や最初の画面が弱い
最初の処方：結果や違いのシーンを最初に見せる

症状
登録者しか見ていない
考えられる原因：非登録者にとって文脈が不足している
最初の処方：固有名詞ではなく、問題から始める

症状
外部流入だけが多い
考えられる原因：プラットフォーム内の需要と一致していない
最初の処方：内部検索ワードやフィード反応をチェック

処方記録：次の3本で維持すること ___ / 変更すること ___ / 判定指標 ___

最初の瞬間で理由を伝える

このパートの最初の質問
最初の瞬間でテーマと視聴する理由が伝わっているか確認します。

診断の流れ：
シグナル確認 → シーン確認 → 1つの変数に処方

最初の瞬間を診断する6つのポイント

フィードに表示されたのに見られなかった場合は、最初の瞬間を診断しましょう。

Shown in feedはチャンス、選択視聴は最初の判断です。

1. テーマが見えない
最初のフレームだけ見ても、何の動画か分からない。

2. 結果が見えない
最後まで見ることで得られる変化・答え・感情が曖昧。

3. 対象が見えない
誰に必要な情報か、最初の文にない。

4. 信頼が見えない
証拠よりも誇張・抽象表現・釣り文句が先に出てくる。

YouTube Studioの「どれだけの人が視聴を選んだか」は、視聴率とスキップ率を表示します。

タイトル・最初の画面・最初の文の約束を一致させる

タイトル
誰のどんな問題を解決するか
例：ショート初心者がゼロでつまずく理由

最初の画面
結果・違い・行動を先に見せているか
例：維持率グラフの急落ポイント

最初の字幕
タイトルのコピーではなく、証明を始めているか
例：問題は再生回数ではなく、ここです

最初の音声
挨拶なしで、対立・結論・実験を始めているか
例：最近の10本を比較してみました

最初のフレームをキャプチャしてタイトルと並べてみて、
違う約束に見える場合は再設計しましょう。

最初の2秒を6つの質問でチェック

最初のフレームだけでもテーマが分かる。
最初の文に結果・問題・違いのいずれかがある。
視聴者が「自分に必要か」をすぐ判断できる。
画面と字幕が同じ情報を重複せず、補完し合っている。
挨拶・ロゴ・背景説明なしで証明が始まる。
疑問を作るが、結論を無理に引き延ばさない。

4つ以下しか当てはまらない場合は、
効果を加える前に最初の画面・文・行動から作り直しましょう。

抽象的な文を診断可能な約束に変える

BEFORE
今日はショートについてお話しします
AFTER
再生数が伸びないショートは、この5カ所のどこかで止まっています
処方：範囲 → 診断の約束

BEFORE
アルゴリズムはなぜこうなるのでしょう？
AFTER
フィード露出と選択視聴を分けて考えます
処方：漠然 → 測定項目

BEFORE
最後まで見ると驚きます
AFTER
最後に急落を生んだ7秒のシーンをお見せします
処方：誇張 → 具体的なシーン

良いフックは大きな言葉ではなく、
何を確認できるかを素早く見せる文です。

フックA/B/Cテストの作り方

本文は固定して、フック（冒頭の切り口）だけを3種類作成しましょう。

A・結果型
「再生回数より先に見るべき数字はこれです」
初画面 _____ | 最初の行動 _____

B・診断型
「あなたのショート動画はこの5つのどこで止まっている？」
初画面 _____ | 最初の行動 _____

C・証拠型
「直近10本の維持率カーブを1画面で重ねてみました」
初画面 _____ | 最初の行動 _____

テーマ・本文・長さ・報酬（オファー）はそのままにします。
可能な範囲で投稿条件や比較期間を揃えましょう。
勝った文の構造は、次のテーマでも再検証します。

離脱直前のシーンを特定する

カーブが折れ曲がる直前のシーンを見つけて、構成を処方します。

このパートの最初の質問：
カーブが折れ曲がる直前のシーンを見つけて、構成を処方します。

診断の順番：
1. シグナル（兆候）を確認
2. シーンを確認
3. 変数を1つだけ調整

維持率カーブの読み方

カーブの形よりも、折れる直前のシーンを確認しましょう。

- 初期の急落：
 約束の遅れ・初画面との不一致
- 中盤の反発：
 巻き戻し・共有・理解不足の可能性
- 特定区間の下落：
 重複説明・文脈転換・読みにくさ

YouTubeの維持率データは処理に通常1〜2日かかります。アップロード直後の空グラフを失敗と判断しないでください。

離脱パターン別の処方例

カーブの形をシーンごとの問いに変換しましょう。

- 垂直落下：
その瞬間に新しい文脈・広告・挨拶・繰り返しが入った？
処方：シーン削除または前倒し

- 階段状の下落：
各転換で約束なくテーマが変わっている？
処方：転換文を追加

- 緩やかな長い下落：
新情報なしに同じ説明が続いている？
処方：ビート圧縮・例の差し替え

- 後半の急落：
結論が既に分かっている、またはCTA（行動喚起）が長すぎる？
処方：結論直後に終了

スパイクも必ずしも良いサインではありません。
「面白くて見直した」のか、「理解できず巻き戻した」のか、シーンを確認しましょう。

15-45秒のシーン構成マップ

各区間が次のシーンの理由を作るように構成します。

0-2秒 約束（問題・結果）
2-7秒 証拠（実際の画面）
7-20秒 展開（方法・比較）
20-35秒 転換（新情報）
35-45秒 報酬（結論・行動）

【削除】
このシーンを抜いても次が理解できるか？

【転換】
5〜8秒ごとに新しい情報・画面・進行があるか？

【報酬】
最後のシーンが最初の約束に答えているか？

長さを短縮して理解度も下がった場合は「圧縮」ではなく「省略」です。

明瞭さを高める5つの処方

速いカットよりも速い理解が優先です。

1. 字幕
1画面1意味単位・キーワード強調・安全領域

2. 画面
話す対象・プロセス・結果を音声より少し早く見せる

3. 声
文末を切らず、重要語の前後で呼吸を入れる

4. 効果
新情報・転換・証拠を示すときだけ使用

5. BGM
声を邪魔せず、感情の転換だけを補助

音声なしキャプチャでもテーマが伝わり、目を閉じて聞いても流れが理解できれば、画面と音声が互いに依存せず補完し合う状態です。

離脱直前の7秒を分析する

グラフが急落する直前の7秒間をもう一度見直しましょう。

その時に、セリフ・画面・字幕・切り替えなど、何が変わったのかを明確に記録します。これが次回編集時の削除候補リストになります。

BEFORE
離脱3秒前

POINT
急落の瞬間

AFTER
残った視聴者へのご褒美

一度の急落よりも、複数の動画で繰り返し現れる「挨拶の直後」「例示の前」「CTA（行動喚起）の開始」など、特定の場面タイプが重要なシグナルです。

完走しても拡散しない理由を確認

最後まで見られた価値が、シェア・保存・会話につながっているかを確認します。

RESPONSE
このパートの最初の質問
最後まで見られた価値が、シェア・保存・会話につながっているかを確認します。

診断の流れ：
シグナル確認 → シーン確認 → 変数を一つだけ変えてみる

完走後に残る4つの価値

完走が拡散につながるには、視聴者に「価値」が残る必要があります。

1. 実行価値
保存して再利用できる手順・フレーズ・チェックリスト

2. 伝達価値
特定の人が思い浮かび、すぐ送りたくなる情報

3. 判断価値
比較や選択の基準、避けるべき条件

4. 感情価値
共感・驚き・安心・笑いを共有できる場面

「役に立った」よりも「誰に、なぜ送りたいか」が思い浮かぶとき、拡散のシグナルが生まれます。

反応の質を読む

「いいね」の数よりも、なぜ反応があったのか理由を読み取りましょう。

シェア
特定の人に伝えたい理由
設計要素：対象・課題・一文要約

保存
後で再実行したい理由
設計要素：手順・ツール・テンプレート

コメント
経験・判断・質問を追加したい理由
設計要素：選択式質問・事例リクエスト

再視聴
もう一度見たり真似したい理由
設計要素：細部・動作・スピード感ある情報

コメントが多くても内容が「説明不足」なら、それは拡散シグナルではなく明確さの問題かもしれません。

CTA（行動喚起）と次の約束

反応はあるのに登録が増えない場合、次の約束を見直しましょう。

登録
今回の動画とつながる次回予告を具体的に伝える
例：次回はフック3種類を実際に比較します

保存
再利用したい場面で一度だけリクエスト
例：アップロード前にこの6項目を再確認してください

コメント
一文で答えられる質問を投げかける
例：フィード・フック・維持の中で一番弱いのはどこですか？

プロフィール
移動したときの価値と場所を明確に伝える
例：全体診断表はプロフィールリンクから

CTAは視聴後の自然な次のステップであるべきです。1つの動画でお願いする行動は1つに絞りましょう。

一つだけ変えて再検証

一つの変数だけを変えて、同じ基準で再度チェックします。

TEST & LEARN
このパートの最初の質問
一つの変数だけを変えて、同じ基準で再度チェックします。

診断の流れ：
シグナル確認 → シーン確認 → 変数を一つだけ変えてみる

一度に一つだけ変えて検証しよう

変更点が多いほど、良くなっても原因が分かりません。

1 固定
テーマ・本文・長さ・報酬・投稿条件を固定します。

2 変更
最初のフレーム、または最初の一文、または中間構成のいずれか1つだけを変更します。

3 判定
フィード表示・選択視聴・維持・共有のうち1つの指標で判定します。

4 期間
初期シグナル・24時間・7日間の流れを同じウィンドウで観察します。

5 学習
良くなった／悪くなったという結果よりも、次回に再利用するフレーズを記録します。

プラットフォームごとの指標定義

プラットフォーム間の生の再生回数は1:1で比較しないでください。

YouTube
Views: 再生・再再生の開始
関連指標: Engaged views・フィード表示・選択視聴

Instagram
Views: 再生または表示回数
関連指標: Accounts reached・インタラクション

TikTok
Views: アプリ内の定義を確認
関連指標: 視聴時間・完了・流入・検索反応

YouTube Shortsの再生回数は2025年3月31日から、最小視聴時間なしで再生・再再生の開始を集計し、従来の方式はEngaged viewsとして残ります。

InstagramのAccounts reachedは一度以上見たユニークアカウント数で、Viewsには同じアカウントの複数再生が含まれる場合があります。

Easy Cut診断ループ

バズる動画を見つけ、弱い部分を修正して繰り返しましょう。

リアルタイムで人気動画を発見 → AIハイライト分析 → 自動ショート動画作成 → 成果記録を一つのループで繋げます。

発見
反応が始まったテーマ

分析
ハイライト・構成

制作
最初のシーン・字幕・カット

学習
弱い指標・次回の処方

バズりそうな動画を見つけたら、すぐにショート動画にしましょう。

14日間の検証プラン

観察3日、処方7日、確認4日

D1-3 基準線
直近10本をまとめて中央値を出し、最初に失敗した段階を特定します。

D4-5 原因候補
グラフ直前のシーン、コメント、流入ソースを確認します。

D6-7 処方設計
固定変数・変更変数・判定指標を一行でまとめます。

D8-11 3本実験
同じフォーマットで一つの変数だけを変えて投稿します。

D12-14 確認・繰り返し
24時間・7日間の流れを確認し、次の実験を決めます。

目標は14日以内にバズ動画を保証することではなく、次の10本で繰り返す処方を1つ見つけることです。

最終診断チェックリスト15項目

アップロード後の15項目診断書

【露出】
01 フィード露出が基準線と同程度である
02 推薦資格・公開設定に問題がない
03 テーマ需要の証拠がある

【離脱】
04 最初のフレームにテーマ・結果が見える
05 タイトルと最初の一文が同じ約束になっている
06 選択視聴が基準線と同程度である

【維持】
07 急落直前のシーンを示した
08 重複・文脈転換・可読性を確認した
09 最後が最初の約束に答えている

【反応】
10 シェア・保存理由が具体的である
11 コメント内容がポジティブなシグナルである
12 再視聴されたシーンの理由を確認した

【実験】
13 変更する変数は一つだけである
14 判定指標と期間を決めた
15 次回に残す学びを一行で書いた

最初の「いいえ」が今回の処方です。
一つだけ変えて、同じ診断書で再度比較しましょう。

公式参考資料

リンク名を押すと公式資料を開けます。条件は申請・投稿時に再確認してください。

YouTube Shortsの開始方法・再生集計

support.google.com

YouTube Shortsコンテンツ分析

support.google.com

YouTube視聴維持率の重要区間

support.google.com

Instagramインサイト

facebook.com

Instagram推薦資格

facebook.com

TikTok Creator Search Insights

support.tiktok.com

ステルスマーケティング規制

caa.go.jp

著作権・引用

bunka.go.jp

楽天アフィリエイト

affiliate.rakuten.co.jp

Amazonアソシエイト

affiliate.amazon.co.jp