

# Mécanique quantique

## TD 6: Oscillateur harmonique quantique

### 1 Définitions

1. Donner des exemples physiques faisant intervenir le modèle d'oscillateur harmonique.
2. Rappeler l'énergie classique d'un oscillateur harmonique de masse  $m$  en fonction de sa pulsation propre  $\omega$ . En déduire l'expression du hamiltonien quantique à une dimension.
3. On définit les opérateurs  $\tilde{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}X$  et  $\tilde{P} = \frac{1}{\sqrt{m\omega\hbar}}P$ . Montrer que le hamiltonien s'écrit :

$$H = \frac{\hbar\omega}{2}(\tilde{X}^2 + \tilde{P}^2). \quad (1)$$

4. Sachant que  $[X, P] = i\hbar$ , calculer le commutateur  $[\tilde{X}, \tilde{P}]$ .

### 2 Opérateurs annihilation et création

On définit les opérateurs

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(\tilde{X} + i\tilde{P}) \quad \text{et} \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\tilde{X} - i\tilde{P}) \quad (2)$$

appelés respectivement *opérateur annihilation* et *opérateur création*.

5. Calculer le commutateur  $[a, a^\dagger]$ .
6. Écrire le hamiltonien  $H$  en fonction de ces opérateurs  $a$  et  $a^\dagger$ .
7. On définit un dernier opérateur  $N = a^\dagger a$  appelé *opérateur nombre*. Calculer les commutateurs  $[N, a]$  et  $[N, a^\dagger]$ .

Trouver le spectre du hamiltonien revient à trouver celui de l'opérateur  $N$ . On se concentre dans la suite sur ce problème.

### 3 Spectre de $N$

Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $N$ , de vecteur propre associé  $|\phi\rangle$ .

8. Écrire la valeur propre  $\lambda$  sous la forme de la norme d'un vecteur, et en déduire son signe.
9. En utilisant les commutateurs précédents, montrer que  $a|\phi\rangle$  et  $a^\dagger|\phi\rangle$  sont aussi des vecteurs propres de  $N$  si  $\lambda \neq 0$ . Donner leur valeur propre respective. Préciser le cas  $\lambda = 0$ .
10. En déduire que les valeurs propres de  $N$  sont des entiers positifs. Justifier les noms des trois opérateurs  $a$ ,  $a^\dagger$  et  $N$ .

### 4 Vecteurs propres de l'hamiltonien

Vus les résultats précédents, on note  $n \in \mathbb{N}$  les valeurs propres de  $N$  dont on peut montrer par récurrence qu'elles sont non-dégénérées. Dans cette partie, on cherche les états propres  $|\phi_n\rangle$  associés.

11. Calculer la fonction propre  $\phi_0(x)$  associée à  $\lambda = 0$ . On pourra utiliser les résultats de la partie précédente.
12. Montrer par récurrence que les états peuvent s'écrire

$$|\phi_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a^\dagger)^n |\phi_0\rangle \quad (3)$$

## 5 États cohérents

Les états propres  $|\phi_n\rangle$  sont des états purement quantiques, dans lesquels se trouvent un nombre déterminé d'excitations élémentaires (de *quanta d'énergie*). À l'inverse, on peut justifier que les états les plus fidèle à la mécanique classique sont les états propres de l'opérateur  $a$ . Ces états sont appelés *états cohérents*.

13. Chercher un état cohérent  $|\alpha\rangle$  de valeur propre  $\alpha$  sous la forme d'une superposition d'états propres de  $H$ .
14. Calculer les valeurs moyennes  $\langle X \rangle_\alpha$ ,  $\langle P \rangle_\alpha$ , ainsi que  $\langle H \rangle_\alpha$  l'énergie moyenne d'un tel état en fonction de  $\hbar\omega$  et  $\alpha$ .
15. On montre que  $\langle H^2 \rangle_\alpha = \hbar^2\omega^2(|\alpha|^4 + 2|\alpha|^2 + 1/4)$ . En déduire l'étalement en énergie  $\Delta H_\alpha$  de l'état cohérent. L'état a-t-il une énergie bien déterminée ?
16. Donner l'évolution temporelle de l'état  $|\psi(t=0)\rangle = |\alpha_0\rangle$ . Montrer que celui-ci est toujours vecteur propre de  $a$ . Que remarque-t-on ?

## 6 Cas d'un oscillateur dans un champ électrique homogène

17. Identifier une situation physique où une particule subit à la fois un potentiel harmonique, et un champ électrique.
18. Écrire l'énergie classique associée à la particule en fonction du champ  $\mathcal{E}$  constant selon l'axe  $Ox$  de l'oscillateur. En déduire le hamiltonien quantique  $H$  du problème.
19. Expliciter l'équation aux valeurs propres que vérifie une fonction propre  $\psi$ .
20. Montrer que le problème se ramène à celui d'un oscillateur harmonique, et donner l'expression des énergies propres du problème.