

# Stochastische Geometrie (SS2019)

## Übungsblatt 5

### Aufgabe 1 (Schätzung der Intensität)

Es sei  $\gamma > 0$  und  $\xi$  ein Poisson-Prozess in  $\mathbb{R}^d$  mit Intensitätsmaß  $\gamma\lambda_d$ .

- (a) Es sei  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$  mit  $0 < \lambda_d(B) < \infty$ . Zeigen Sie, dass

$$\hat{\gamma}_B := \frac{\xi(B)}{\lambda_d(B)}$$

ein erwartungstreuer Schätzer für  $\gamma$  ist.

- (b) Zeigen Sie, dass der Schätzer aus (a) *schwach konsistent* in folgendem Sinne ist: Ist  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge messbarer Mengen in  $\mathbb{R}^d$  mit  $0 < \lambda_d(B_n) < \infty$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , und  $\lambda_d(B_n) \rightarrow \infty$ , dann gilt für alle  $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\hat{\gamma}_{B_n} - \gamma| > \varepsilon) = 0.$$

- (c) Zeigen Sie, dass der Schätzer aus (a) *stark konsistent* in folgendem Sinne ist: Ist  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine aufsteigende Folge kompakter Mengen in  $\mathbb{R}^d$  mit  $0 < \lambda_d(B_n) < \infty$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , und  $\lambda_d(B_n) \rightarrow \infty$ , dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\gamma}_{B_n} = \gamma \quad \mathbb{P}\text{-fast sicher.}$$

### Aufgabe 2 (Abbildungsprinzip)

Seien  $\mathbb{X}$  und  $\mathbb{Y}$  separable metrische Räume mit  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{X}$  bzw.  $\mathcal{Y}$ . Sei weiter  $\Phi$  ein Poisson-Prozess auf  $\mathbb{X}$  mit Intensitätsmaß  $\Theta$  und  $g: \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$  eine messbare Abbildung mit der Eigenschaft, dass  $\Theta \circ g^{-1}$  ein lokal-endliches Maß auf  $\mathbb{Y}$  ist. Zeigen Sie:

- (a)  $\Psi := \Phi \circ g^{-1}$  ist ein Poissonprozess mit Intensitätsmaß  $\Lambda := \Theta \circ g^{-1}$ .
- (b) Sei  $A \in \mathcal{X}$ . Dann ist die Restriktion  $\Phi_A := \Phi(\cdot \cap A)$  von  $\Phi$  auf  $A$  ein Poisson-Prozess auf  $\mathbb{X}$ . Außerdem sind  $\Phi_A$  und  $\Phi_B$  unabhängig, wenn  $A \in \mathcal{X}$  und  $B \in \mathcal{X}$  disjunkte Mengen sind.

### Aufgabe 3

Zeigen Sie, dass  $K^*$  aus Definition 2.2.8 ein stochastischer Kern von  $N(\mathbb{X})$  nach  $N(\mathbb{X} \times \mathbb{Y})$  ist.

**Aufgabe 4** ( $p$ -Verdünnungen)

Es seien  $p : \mathbb{X} \rightarrow [0, 1]$  eine messbare Abbildung,  $\Phi$  ein Punktprozess auf  $\mathbb{X}$  und  $\Phi_p$  die  $p$ -Verdünnung von  $\Phi$  (siehe Definition 2.2.14).

- (a) Sei  $A \in \mathcal{X}$ . Zu  $\Phi$  sei  $\Phi_A := \Phi(\cdot \cap A)$  die Restriktion von  $\Phi$  auf  $A$ . Kann man  $\Phi_A$  als eine  $p$ -Verdünnung von  $\Phi$  interpretieren? Falls ja, wie muss  $p$  gewählt werden?
- (b) Zeigen Sie, dass sich  $\Phi$  für beliebiges  $n \in \mathbb{N}$  stets als Überlagerung geeigneter identisch verteilter Punktprozesse  $\Phi_1, \dots, \Phi_n$  schreiben lässt mit der Eigenschaft, dass aus  $\mathbb{P}(\Phi(\mathbb{X}) \geq 1) > 0$  folgt, dass

$$\mathbb{P}(\Phi_i(\mathbb{X}) \geq 1) > 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

- (c) Zeigen Sie, dass (b) falsch ist, wenn man zusätzlich fordert, dass die  $\Phi_i$  unabhängig sein sollen.
- (d) Zeigen Sie, dass ein Poisson-Prozess  $\Phi$  mit lokal-endlichem Intensitätsmaß  $\Lambda$  *unbegrenzt teilbar* ist, d.h. für jedes  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\Phi \stackrel{d}{=} \Phi_1 + \dots + \Phi_n$$

mit geeignet gewählten unabhängigen, identisch verteilten  $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ .