

Fold change of the top 40 meta-analysis genes across sample types
POLE 1.2 2.1 1.0
LOC100895 -1.6 -1.6 -1.1
MDM2 -1.7 -1.7 -1.5
LOC101314 1.5 2.1 1.1
COX5A -1.4 -1.7 -0.4
KIF23 3.0 2.7 2.4
P4HA1 0.4 1.6 0.5
EGLN3 1.6 1.8 0.8
FOXM1 1.7 2.0 0.3
ADM 1.3 1.7 1.1
PTTG1 1.2 2.3 0.2
CCNE2 1.1 2.1 0.1
COX7B -0.1 -1.7 -1.6
ANLN 2.8 2.0 1.0
ALDOA 1.3 1.8 0.9
EXO1 2.3 2.7 2.2
LOC101918 -1.7 -1.3 -0.2
PLOD2 1.5 1.6 0.1
UBE2C 1.4 1.7 0.4
BAX -0.0 -0.5 -0.5
E2F1 0.8 1.5 0.9
LOC100567 2.2 1.5 1.3
VHL 0.8 1.8 0.2
ATP5F1A -0.9 -1.2 -1.0
MIF 0.9 1.8 0.3
PERP -0.1 -1.8 -1.4
CENPE 1.8 1.1 0.2
LOC102090 0.5 1.3 1.1
DSCC1 0.3 1.7 0.5
CCNG1 -0.2 -1.3 -0.7
ATP5MC1 -0.5 -0.9 -1.0
LOC103392 0.1 1.8 0.3
LOC100586 0.2 1.4 0.6
XPC -1.4 -0.9 -0.5
HIF1A 0.2 1.7 1.1
LOC100785 -0.6 -2.1 0.0
LOC103031 1.4 1.5 0.2
LOC101964 1.4 1.5 0.1
NDUFB2 -1.1 -1.0 -0.3
GADD45A -1.3 -1.0 -0.2
plasma_cfRNA
tumor_tissue
whole_blood
log2 fold change
2
1
0
−1
−2