

Fold change of the top 40 meta-analysis genes across sample types
LOC100895 -2.2 -1.7 -1.3
MDM2 -2.2 -1.9 -1.6
POLE 1.5 2.1 1.2
ADM 1.4 1.8 1.4
COX7B -0.8 -1.9 -1.8
LOC101314 2.3 2.0 1.1
PTTG1 1.6 2.4 0.6
LOC101918 -1.7 -1.5 -0.6
KIF23 1.8 1.7 0.9
LOC100567 1.6 1.4 1.7
COX5A -2.0 -1.8 -0.6
VHL 1.2 2.0 0.8
ANLN 0.9 1.8 1.2
EXO1 1.4 1.7 0.8
CCNE2 1.4 2.2 0.1
P4HA1 1.1 1.6 0.6
FOXM1 1.5 2.3 0.9
UBE2C 1.5 1.8 1.1
ATP5F1A -1.2 -1.6 -1.2
E2F1 1.1 1.9 0.7
ALDOA 1.1 1.8 1.4
PERP -0.6 -1.8 -1.8
LOC101964 1.8 1.6 1.2
EGLN3 1.6 1.8 0.6
UHRF1 0.9 1.3 1.1
BRCA2 1.3 1.7 0.9
CCNE1 0.7 1.2 1.0
NDUFB1 -1.9 -1.3 -0.7
HIF1A 1.1 1.9 1.0
ATP5MC1 -1.0 -1.9 -0.6
CCNG1 -1.0 -1.5 -0.8
MDH1 1.1 1.1 1.4
LOC100205 0.2 1.8 1.2
ANKRD37 0.5 1.4 0.9
LOC102090 0.9 1.7 1.6
SESN2 -1.4 -1.8 -0.6
CENPE 1.6 1.2 0.8
NDUFS2 -0.7 -1.5 -1.5
PFKFB3 0.5 1.8 0.9
PLOD2 1.3 1.7 0.3
plasma_cfRNA
tumor_tissue
whole_blood
log2 fold change
2
1
0
−1
−2