

1 Maschinen

1.1 Turingmaschinen

Aufgabe 1.1 Klausur 2012

Gebe eine 1-Band-Turingmaschine M an, die die Funktion $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & \text{falls } x \text{ gerade} \\ y, & \text{falls } x \text{ ungerade} \end{cases}$$

berechnet.

Zur Erinnerung: Die Zahl n wird durch das Unärwort 0^{n+1} dargestellt.

Aufgabe 1.2 Klausur 2014

Gebe eine 2-Band-Turingmaschine M an, die die durch $f(w) = 0^{\#_0(w)} 1^{\#_1(w)}$ gegebene Funktion $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ berechnet.

Aufgabe 1.3 Klausur 2015

Gebe einen totalen (deterministischen) 2-Band-Turingakzeptor M an, der die Sprache $L = \{w2w : w \in \{0, 1\}^*\}$ (über dem Alphabet $\{0, 1, 2\}$) erkennt.

1.2 Registermaschinen

Aufgabe 1.4

TODO: Registermaschinen und -operatoren

2 Funktionen

Aufgabe 2.1

Zeige nur unter Verwendung der Definition der primitiv rekursiven Funktionen, dass folgende Funktionen primitiv rekursiv sind:

(a) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = x^2 + 2x + 1$

(b) $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ mit $g(x, y) = 2^x + 2^y$ (Nachklausur 2015)

Du darfst verwenden, dass die Addition $add(x, y) = x + y$ primitiv rekursiv ist.

Hinweis: Zeige zunächst, dass die Funktion $\hat{f}(x) = 2^x$ primitiv rekursiv ist.

(c) $h : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ mit $h(x, y, z) = 3x + z$

Aufgabe 2.2 Nachklausur 2013

Eine natürliche Zahl heißt *Mersenne-Primzahl*, falls sie von der Form $2^n - 1$ (für ein $n \in \mathbb{N}$) und eine Primzahl ist.

Zeige, dass die Menge

$$M = \{x : x \text{ ist Mersenne-Primzahl}\}$$

primitiv rekursiv ist.

Du darfst dabei neben der Definition der primitiv rekursiven Funktionen die aus der Vorlesung bekannten Abschlusseigenschaften sowie die primitive Rekursivität der Multiplikation \cdot , der modifizierten Subtraktion $\dot{-}$, der Potenzfunktion $n \mapsto 2^n$ und der Gleichheitsrelation verwenden.

Lösung 2.2

Es gilt

$$x \in M \Leftrightarrow (x \neq 0 \ \& \ x \neq 1 \ \& \ \exists y < x (x = 2^y \dot{-} 1) \ \& \ (\forall m < x (\forall n < x (n \cdot m \neq x))).$$

Da die primitiv rekursiven Mengen gegen explizite Definitionen, gegen beschränkte Quantoren und gegen die aussagenlogischen Junktoren abgeschlossen sind und aufgrund der primitiven Rekursivität der oben genannten Funktionen ist M damit primitiv rekursiv.

3 Mengen

Aufgabe 3.1 Nachklausur 2012

(a) Zeige, dass die Mengen

$$A = \{\langle x, y \rangle : \varphi_x(y) \downarrow \text{ und } \varphi_y(x) \downarrow\}$$

und

$$B = \{\langle x, y \rangle : \varphi_x(y) \uparrow \text{ oder } \varphi_y(x) \uparrow\}$$

nicht rekursiv sind.

(b) Sind A und B rekursiv aufzählbar?

Lösung 3.1

(a) Es gilt $K_d \leq_m A$ via $f(x) = \langle x, x \rangle$ da

$$x \in K_d \Leftrightarrow \varphi_x(x) \downarrow \Leftrightarrow \varphi_x(x) \downarrow \ \& \ \varphi_x(x) \downarrow \Leftrightarrow f(x) = \langle x, x \rangle \in A$$

Da das diagonale Halteproblem nicht rekursiv ist, ist also nach dem Reduktionslemma auch A nicht rekursiv. Da $B = \overline{A}$ und die rekursiven Mengen gegen Komplement abgeschlossen sind, ist somit auch B nicht rekursiv.

- (b) Aufgrund des Reduktionslemmas können nicht beide Mengen rekursiv aufzählbar sein. A ist als Definitionsbereich der partiell rekursiven Funktion

$$\psi(\langle x, y \rangle) = \varphi(x, y) + \varphi(y, x)$$

rekursiv aufzählbar. Da eine Menge rekursiv ist, falls die Menge selbst und ihr Komplement rekursiv aufzählbar sind, kann also B nicht rekursiv aufzählbar sein.

Aufgabe 3.2

Die symmetrische Differenz zweier Mengen A und B ist

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

Zeige:

- (a) Ist $A \triangle B$ endlich, so gilt $A =_m B$.
- (b) Die symmetrische Differenz zweier rekursiv aufzählbarer Sprachen ist nicht notwendig rekursiv aufzählbar.
- (c) Seien A und B rekursiv aufzählbar. Wenn $A \triangle B$ rekursiv ist, dann sind auch $A \setminus B$ und $B \setminus A$ rekursiv.

Hinweis: Du darfst alle Resultate der Vorlesung inklusive der Church-Turing-These verwenden.

Aufgabe 3.3

Seien FIN und INF die Indizes der endlichen bzw. unendlichen rekursiv aufzählbaren Mengen:

$$\begin{aligned}\text{FIN} &= \{e : W_e \text{ ist endlich}\} \\ \text{INF} &= \{e : W_e \text{ ist unendlich}\}\end{aligned}$$

Sei TOT die Menge der Indizes aller rekursiven Funktionen:

$$\text{TOT} = \{e : W_e = \mathbb{N}\}$$

- (a) Zeige, dass die Menge $\text{FIN} \oplus \text{INF} = \{2e : e \in \text{FIN}\} \cup \{2e+1 : e \in \text{INF}\}$ nicht rekursiv aufzählbar ist.
- (b) Zeige, dass das Komplement von TOT auf FIN many-one-reduzierbar ist, also dass $\overline{\text{TOT}} \leq_m \text{FIN}$ gilt.
- (c) Zeige, dass FIN nicht rekursiv aufzählbar ist.

Hinweis: Man kann durch geeignete m -Reduzierung zeigen, dass $\overline{\text{TOT}}$ nicht rekursiv aufzählbar ist.

Lösung 3.3

- (a) FIN und INF sind als nichttriviale Indexmengen nach dem Satz von Rice nicht rekursiv. Da aber $\text{FIN} = \overline{\text{INF}}$ gilt, muss nach dem Komplementlemma zumindest eine der Mengen nicht rekursiv aufzählbar sein. Aus $\text{FIN} \leq_m \text{FIN} \oplus \text{INF}$ und $\text{INF} \leq_m \text{FIN} \oplus \text{INF}$ folgern wir mithilfe der Abgeschlossenheit der rekursiv aufzählbaren Mengen nach unten gegen m -Reduzierung, dass $\text{FIN} \oplus \text{INF}$ nicht rekursiv aufzählbar ist.

(b) **TODO**

(c) **TODO**

Aufgabe 3.4

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Begründe deine Antworten und gebe für falsche Aussagen ein Gegenbeispiel an.

- (a) Jede unendliche rekursive Menge enthält eine nichtrekursive Teilmenge.
(b) Für zwei rekursiv aufzählbare Mengen A und B ist auch $A \setminus B$ rekursiv aufzählbar.
(c) Seien A und B zwei disjunkte rekursiv aufzählbare Mengen, sodass $A \cup B$ rekursiv ist. Dann sind auch A und B rekursiv.
(d) Sind sowohl A als auch \overline{A} rekursiv aufzählbar, so gilt $A =_m \overline{A}$.

Hinweis: Du darfst alle Resultate der Vorlesung inklusive der Church-Turing-These verwenden.

Lösung 3.4

- (a) Wahr. Für $A \subseteq \mathbb{N}$ unendlich ist die Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$, d.h. die Menge der Teilmengen von A , überabzählbar. Die Klasse der rekursiven Mengen ist allerdings abzählbar.
(b) Falsch.
(c) Wahr.
(d) Wahr.

Aufgabe 3.5 Klausur 2012

Sei

$$\text{Id} = \{e \in \mathbb{N} : \forall n (\varphi_e(n) = n)\}.$$

- (a) Zeige, dass das Halteproblem m -reduzierbar auf Id ist, das heißt, dass $K \leq_m \text{Id}$ gilt.
- (b) Gebe für die folgenden Aussagen jeweils an, ob sie wahr oder falsch sind. Begründe deine Antworten!
- (i) Id ist rekursiv.
 - (ii) $\overline{\text{Id}}$ ist rekursiv.
 - (iii) $\overline{\text{Id}}$ ist rekursiv aufzählbar.

Lösung 3.5

- (a) Definiere die zweistellige partiell rekursive Funktion ψ durch

$$\psi(\langle e, x \rangle, y) = 0 \cdot \varphi_e(x) + y.$$

Dann gibt es, da φ eine Gödelnummerierung ist, eine rekursive Übersetzungsfunktion f von ψ nach φ , d.h. $\psi(\langle e, x \rangle, y) = \varphi_{f(\langle e, x \rangle)}(y)$ für alle $y \in \mathbb{N}$. Somit gilt

$$\begin{aligned} \langle e, x \rangle \in K &\Leftrightarrow \varphi_e(x) \downarrow \\ &\Leftrightarrow \psi(\langle e, x \rangle, y) = y \text{ für alle } y \in \mathbb{N} \\ &\Leftrightarrow \varphi_{f(\langle e, x \rangle)}(y) = y \text{ für alle } y \in \mathbb{N} \\ &\Leftrightarrow f(\langle e, x \rangle) \in \text{Id}, \end{aligned}$$

d.h. $K \leq_m \text{Id}$ via f .

- (b) (i) Falsch. Id ist als nichttriviale Indexmenge nach dem Satz von Rice nicht rekursiv. Alternativ kann man argumentieren, dass K nicht rekursiv ist und somit nach dem Reduktionslemma Id auch nicht.
- (ii) Falsch. Eine Menge ist genau dann rekursiv, wenn ihr Komplement rekursiv ist.
- (iii) Aus $K \leq_m \text{Id}$ via f folgt $\overline{K} \leq_m \overline{\text{Id}}$ via f . Also wäre mit $\overline{\text{Id}}$ auch \overline{K} rekursiv aufzählbar, da die rekursiv aufzählbaren Mengen nach unten gegen \leq_m abgeschlossen sind. Dies ergäbe allerdings einen Widerspruch, denn dann wären K und \overline{K} rekursiv aufzählbar und somit K rekursiv.

4 Formale Sprachen

Aufgabe 4.1

Zeige, dass die folgenden Sprachen nicht kontextfrei sind:

$$L_1 = \{w \in \{a, b, c\}^* : \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\} \quad (\text{Klausur 2014})$$

$$L_2 = \{a^n b^{2n} c^{3n} : n \geq 1\} \quad (\text{Klausur 2015})$$

$$L_3 = \{0^{n^2} : n \geq 0\} \quad (\text{Nachklausur 2015})$$

Aufgabe 4.2

Wahr oder falsch?

- (a) Die Sprache $L_1 = \{vw : v, w \in \{0, 1\}^*, |v| = |w|\}$ ist regulär.
- (b) Die Sprache $L_2 = \{w_0 \circ \dots \circ w_n : n \in \mathbb{N}, |w_k| = k \ \forall k \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei.
- (c) Sei $L \subseteq \{0, 1\}^*$ eine Sprache mit $|L| = n$ für ein $n \in \mathbb{N}$. Dann ist L regulär.

Lösung 4.2

- (a) Wahr. L_1 wird von der Grammatik $G = (\{S, T\}, \{0, 1\}, P, S)$ mit den Regeln

$$P = \{S \rightarrow 0T \mid 1T \mid \lambda, T \rightarrow 0S \mid 1S\}$$

erzeugt, denn

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : |w| = 2n \text{ für ein } n \in \mathbb{N}\}.$$

- (b) Falsch. **TODO:** Pumpinglemma anwenden
- (c) Wahr. Jede endliche Sprache ist regulär, denn jede endliche Sprache ist entscheidbar.

Aufgabe 4.3

Zeige, dass die Sprache

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : w = \text{Bin}(n) \text{ für ein } n \in \mathbb{N}\}$$

der Binärzahlen regulär ist.

Lösung 4.3

L wird von der Grammatik $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$ mit den Regeln

$$P = \{S \rightarrow 0 \mid 1A, A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \lambda\}$$

erzeugt, denn

$$L = \{0\} \cup \{1w : w \in \{0, 1\}^*\}.$$

Aufgabe 4.4

Sei L die Sprache über dem Alphabet $\{a, b, c\}$, die genau die Wörter enthält, in denen das Teilwort abc genau einmal vorkommt.

- (a) Gebe eine rechtslineare Grammatik an, die L erzeugt.
- (b) Gebe einen deterministischen endlichen Automaten an, der L erkennt.

Lösung 4.4

(a) L wird von der Grammatik $G = (\{S, A, B, C, D, E\}, \{a, b, c\}, P, S)$ mit den Regeln

$$\begin{aligned} P = \{ & S \rightarrow aA \mid bS \mid cS, \\ & A \rightarrow aA \mid bB \mid cS, \\ & B \rightarrow aA \mid bS \mid cC, \\ & C \rightarrow aD \mid bC \mid cC \mid \lambda, \\ & D \rightarrow aD \mid bE \mid cC \mid \lambda, \\ & E \rightarrow aD \mid bC \mid \lambda \} \end{aligned}$$

erzeugt.

Aufgabe 4.5

Sei L die reguläre Sprache

$$L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* : \#_0(w) = 0 \text{ oder } \#_1(w) = 0 \text{ oder } \#_2(w) = 0\}.$$

Gebe einen deterministischen endlichen Automaten an, der L erkennt.