/ /

# Aula 4 - exercícios

## 1)

| Tipo | Infantil | Adolescente | Adulto |
|---|---|---|---|
| N | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |
| D | $\frac{2}{8}$ | $\frac{2}{8}$ | $\frac{4}{8}$ |
| G | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |

$+\frac{1}{3}$ →

| Tipo | Infantil | Adolescente | Adulto |
|---|---|---|---|
| N | $\frac{2}{6}$ | $\frac{2}{6}$ | $\frac{2}{6}$ |
| D | $\frac{3}{11}$ | $\frac{3}{11}$ | $\frac{5}{11}$ |
| G | $\frac{2}{7}$ | $\frac{3}{7}$ | $\frac{2}{7}$ |

| Diagnóstico | Miopia | Hipermetropia |
|---|---|---|
| N | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |
| D | $\frac{4}{8}$ | $\frac{4}{8}$ |
| G | $\frac{2}{4}$ | $\frac{2}{4}$ |

$+\frac{1}{2}$ →

| Diagnóstico | Miopia | Hipermetropia |
|---|---|---|
| N | $\frac{3}{5}$ | $\frac{2}{5}$ |
| D | $\frac{5}{10}$ | $\frac{5}{10}$ |
| G | $\frac{3}{6}$ | $\frac{3}{6}$ |

| Astigmatismo | Sim | Não |
|---|---|---|
| N | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |
| D | $\frac{3}{8}$ | $\frac{5}{8}$ |
| G | $\frac{3}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |

$+\frac{1}{2}$ →

| Astigmatismo | Sim | Não |
|---|---|---|
| N | $\frac{2}{5}$ | $\frac{3}{5}$ |
| D | $\frac{4}{10}$ | $\frac{6}{10}$ |
| G | $\frac{4}{6}$ | $\frac{2}{6}$ |

| Taxa lacrimal | Reduzida | Normal |
|---|---|---|
| N | $\frac{3}{5}$ | $\frac{0}{3}$ |
| D | $\frac{2}{8}$ | $\frac{6}{8}$ |
| G | $\frac{0}{4}$ | $\frac{4}{4}$ |

$+\frac{1}{2}$ →

| Taxa lacrimal | Reduzida | Normal |
|---|---|---|
| N | $\frac{4}{5}$ | $\frac{1}{5}$ |
| D | $\frac{3}{10}$ | $\frac{7}{10}$ |
| G | $\frac{1}{6}$ | $\frac{5}{6}$ |

## 2)

| | Idade | Diagnóstico | Astigmatismo | Taxa lacrimal | Total + | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | $\frac{2}{6}$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{3}{5}$ | $\frac{4}{5}$ | $\frac{4}{18}$ | 49,55% |
| D | $\frac{3}{11}$ | $\frac{5}{10}$ | $\frac{6}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{9}{18}$ | 42,76% |
| G | $\frac{2}{7}$ | $\frac{3}{6}$ | $\frac{2}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{5}{18}$ | 7,68% |

tilibra