

Centro Universitário de Lavras

Professor: Clínica Integrada I

Disciplina: Clínica Integrada I

Curso: Odontologia

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 5 e 4 períodos

Nota

Data: 30/03/2026

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.	
	a b c d Q.1: ☐ ☐ ☐ ☐ Q.2: ☐ ☐ ☐ ☐ Q.3: ☐ ☐ ☐ ☐ Q.4: ☐ ☐ ☐ ☐ Q.5: ☐ ☐ ☐ ☐ Q.6: ☐ ☐ ☐ ☐ Q.7: ☐ ☐ ☐ ☐ Q.8: ☐ ☐ ☐ ☐ Q.9: ☐ ☐ ☐ ☐ Q.10: ☐ ☐ ☐ ☐ a b c d
	Prova: 2862719.0

Q.1 (1.00) - Paciente do sexo masculino, 45 anos, não fumante, sem doenças sistêmicas conhecidas, comparece à clínica odontológica relatando sangramento gengival ao escovar os dentes há aproximadamente 2 anos. Ao exame clínico, observam-se profundidades de sondagem de 5 a 7 mm em múltiplos sítios nos dentes posteriores, perda de inserção clínica de 3 a 5 mm, sangramento à sondagem em 55% dos sítios e presença de cálculo subgengival abundante. O paciente apresenta higiene bucal deficiente e nunca realizou tratamento periodontal anteriormente. Com base na classificação AAP/EFP 2017, o caso é definido como Periodontite Estágio II, Grau B. Considerando as diretrizes AAP/EFP para o tratamento deste caso, assinale a alternativa que descreve corretamente a sequência tera-

pêutica e os objetivos do tratamento periodontal ativo para este paciente:

- a) () Como o paciente não apresenta doenças sistêmicas e a perda óssea é moderada, o tratamento está limitado à instrumentação supragengival e instrução de higiene bucal, sem necessidade de instrumentação subgengival. A reavaliação periodontal deve ser realizada em 6 meses, e a cirurgia periodontal é contraindicada em casos de Periodontite Estágio II.
- b) () O tratamento periodontal ativo deve seguir uma abordagem escalonada: Passo 1 – controle de fatores de risco e instrução de higiene bucal; Passo 2 – instrumentação supragengival e subgengival em toda a boca; Passo 3 – reavaliação