

تقرير تدريب عددي متجدد

التاريخ: 2026/9/12، 5:02:16 ص

الوضع: تدريب · الصعوبة: مختلط · عدد الأسئلة: 50

العائلات: عائلات متعددة

متوسط السؤال: 00:00

الزمن: 00:00

غير المجاب: 50

الخطأ: 0

الصحيح: 0

النتيجة: 0%

الأداء حسب العائلة

العائلة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
النسب وتقسيم الكميات	0/3	0%	00:00
مسائل الأعمار	0/3	0%	00:00
المعدل الوجودي	0/3	0%	00:00
الربح والخسارة والأسعار	0/3	0%	00:00
المتتاليات العددية	0/3	0%	00:00
المقارنة والترتيب العلاقتي	0/3	0%	00:00
العدد الذي لا ينتمي	0/4	0%	00:00
النسب المئوية	0/3	0%	00:00
العمال والزمن	0/3	0%	00:00
التناسب المباشر	0/3	0%	00:00
المتوسط الحسابي	0/3	0%	00:00
الآلات والإنتاج	0/3	0%	00:00
المعدل المشترك	0/3	0%	00:00
الكسور المتتابة	0/3	0%	00:00
السرعة والمسافة والزمن	0/3	0%	00:00
الاستدلال الزمني وأيام الأسبوع	0/4	0%	00:00

الأداء حسب الصعوبة

الصعوبة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
سهل	0/13	0%	00:00
متوسط	0/29	0%	00:00
صعب	0/8	0%	00:00

النسبة أ : ب = 3 : 2، والنسبة ب : ج = 4 : 3. إذا كان أ + ب = 40، فما قيمة ج؟

42 A	20 B
18 C	58 D
24 E	34 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 18 — C

كيف أبدأ؟ وُجد الحد المشترك ثم اربط المعلومة المركبة بالأجزاء.

1. نضرب النسبة الأولى في 4 والثانية في 3 ليتساوى حد ب: $4 \times 2 = 8$ ، و $3 \times 3 = 9$.
2. إذن أ : ب : ج = 8 : 12 : 9.
3. أ + ب = $8 + 12 = 20$.
4. قيمة الجزء الواحد = $20 \div 4 = 5$.
5. ج = $9 \times 2 = 18$.

الطريقة السريعة: حوّل أ+ب إلى أجزاء، استخرج قيمة الجزء، ثم احسب ج.
تذكّر: بعد التوحيد، كل معلومة عن مجموع أو فرق تصبح عددًا من الأجزاء.

شخص أكبر من الآخر بـ 10 سنوات، ومجموع عمريهما 50 سنة. كم عمر الأكبر؟

25 سنة A	10 سنوات B
32 سنة C	40 سنة D
28 سنة E	30 سنة F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 30 — F سنة

كيف أبدأ؟ استخدم المجموع والفرق معًا.

1. لو تساوى العمران لكان كل منهما $2 \div 2 = 25$.
2. نصف نصف الفرق: $10 \div 2 = 5$.
3. عمر الأكبر = $25 + 5 = 30$.

الطريقة السريعة: $(10 + 50) \div 2 = 30$.

تذكّر: عمر الأكبر = (المجموع + الفرق) $\div 2$.

قطعت سيارة 240 كيلومترًا باستخدام 20 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 36 لترًا؟

☐ 864 كيلومترًا A	☐ 672 كيلومترًا B
☐ 912 كيلومترًا C	☒ 432 كيلومترًا D
☐ 420 كيلومترًا E	☐ 240 كيلومترًا F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 432 — D كيلومترًا

كيف أبدأ؟ احسب القيمة لكل وحدة ثم توسع.

1. المسافة لكل لتر = $240 \div 20 = 12$.

2. المسافة بالكيلومترات = $36 \times 12 = 432$.

الطريقة السريعة: كم لكل لتر $\times$ عدد اللترات الجديد.

تذكر: معدل الوحدة ثابت ما لم يذكر السؤال تغييره.

باع متجر سلعة بـ 180 درهماً محققاً ربحاً قدره 50% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

☐ 120 درهماً A	☐ 360 درهماً B
☐ 90 درهماً C	☐ 100 درهماً D
☐ 130 درهماً E	☐ 180 درهماً F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 120 — A درهماً

كيف أبدأ؟ حوّل سعر البيع إلى نسبة من التكلفة ثم اعكس المعامل.

1. سعر البيع يمثل $100 + 50 = 150$ بالمئة من التكلفة.

2. التكلفة = $180 \div 100 \times 150 = 120$.

الطريقة السريعة: البيع $\div (1 + \text{نسبة الربح})$.

تذكر: لا تطرح نسبة الربح مباشرة من سعر البيع.

ما العدد التالي في المتتالية؟

7, 11, 22, 27, 81, 87, 348, ؟

1740	B	355	A
356	D	352	C
696	F	362	E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — 355

كيف أبدأ؟ إذا لم تجد فرقًا ثابتًا، افحص هل عمليتان تتناوبان.

- العمليات تتناوب بين الجمع والضرب: $4+, 2\times, 5+, 3\times, 6+, 4\times$.
- بعد آخر عملية ضرب نعود إلى الجمع، ورقم الجمع التالي $7 = 1 + 6$.
- الحد التالي $355 = 7 + 348$.

الطريقة السريعة: حدد هل الدور التالي جمع أم ضرب، ثم استخدم الرقم التالي في السلسلة.
تذكّر: التناوب قد يكون مع أرقام تزداد تدريجيًا في كل مرة.

سالم أطول من راشد. ناصر أطول من ليان. راشد أطول من ناصر. من صاحب المركز الثالث من الأطول إلى الأقصر؟

لا أحد	B	سالم	A
ناصر	D	لا يمكن تحديده	C
راشد	F	ليان	E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — ناصر

كيف أبدأ؟ ضع العلاقات في ترتيب واحد.

- من الجمل نحصل على الترتيب: سالم < راشد < ناصر < ليان.
- صاحب المركز الثالث هو ناصر.

الطريقة السريعة: اربط العلاقات ثم اقرأ المركز المطلوب.
تذكّر: الجملة «أطول من» تحدد اتجاه السلسلة.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

14, 12, 26, 6, 10, 22

26 B

14 A

12 D

6 C

10 F

22 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 12 — D

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

1. $3 = 2 \div 6$ ، وهو عدد أولي.

2. $5 = 2 \div 10$ ، وهو عدد أولي.

3. $7 = 2 \div 14$ ، وهو عدد أولي.

4. $11 = 2 \div 22$ ، وهو عدد أولي.

5. $13 = 2 \div 26$ ، وهو عدد أولي.

6. 12 لا يحقق الخاصية «ضعف عدد أولي»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «ضعف عدد أولي» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكّر: إذا كانت كل الأعداد زوجية، اقسّمها على 2 وابحث عن خاصية في النواتج.

في مجموعة عددها 120، غاب 25% منهم، ثم غادر 10% من الموجودين بعد ذلك. كم بقي؟

81 B

39 A

78 D

90 C

120 F

71 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 81 — B

كيف أبدأ؟ طَبِّق المرحلة الأولى ثم احسب المرحلة الثانية من العدد الجديد.

1. الباقي بعد الغياب الأول $= 120 - (100 - 25) = 120 - 75 = 45$.

2. من غادر بعد ذلك $= 10 \times 45 = 450$.

3. المتبقي $= 45 - 45 = 0$.

الطريقة السريعة: احسب الباقي بعد كل مرحلة على حدة.

تذكّر: انتبه لعبارات مثل «من الموجودين» أو «من الباقي».

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 18 يومًا. إذا عمل 24 عاملاً بالكفاءة نفسها، فكم يومًا يحتاجون؟

11 يومًا	A
24 يومًا	C
9 أيام	E
18 يومًا	B
36 يومًا	D
216 يومًا	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 9 — E أيام

كيف أبدأ؟ حوّل العمل إلى وحدات عامل-يوم.

1. العمل الكامل بوحدة عامل-يوم = $12 \times 18 = 216$.

2. الزمن المطلوب بالأيام = $216 \div 24 = 9$.

الطريقة السريعة: اضرب العمال في الأيام ثم اقسم على العدد الجديد.

تذكّر: إذا ثبت العمل والكفاءة: عدد العمال $\times$ عدد الأيام ثابت.

تحتاج وصفة إلى 5 أكواب من الدقيق لصنع 10 قطع. كم كوبًا تحتاج لصنع 40 قطعة بالمعدل نفسه؟

5 أكواب	A
4 أكواب	C
20 كوبًا	E
8 أكواب	B
9 أكواب	D
15 كوبًا	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20 — E كوبًا

كيف أبدأ؟ احسب كم مرة كبر عدد القطع.

1. عامل التكبير = $40 \div 10 = 4$.

2. عدد الأكواب المطلوبة = $5 \times 4 = 20$.

الطريقة السريعة: اضرب الكمية الأصلية في عامل التكبير.

تذكّر: في التناسب المباشر، الكمية المقابلة تتغير بعامل التكبير نفسه.

متوسط 7 قيم هو 19. أضيفت قيمتان متوسطهما 28. فما متوسط القيم 9؟

20	A
19	C
28	E
22	B
23.5	D
21	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 21 — F

كيف أبدأ؟ حوّل متوسط كل مجموعة إلى مجموع.

1. مجموع القيم الأصلية = $19 \times 7 = 133$.

2. مجموع القيمتين الجديدتين = $2 \times 28 = 56$.

3. المجموع الجديد = $133 + 56 = 189$.

4. المتوسط الجديد = $189 \div 9 = 21$.

الطريقة السريعة: اجمع مجموع المجموعتين ثم اقسم على العدد الكلي.

تذكّر: متوسط القيمتين لا يُضاف مباشرة إلى المتوسط القديم.

تنتج 6 آلات متطابقة في الإنتاجية 300 قطعة خلال 5 ساعات. كم قطعة تنتج 3 آلات من النوع نفسه خلال ساعتين؟

A 150 قطعة	B 300 قطعة
C 70 قطعة	D 120 قطعة
E 60 قطعة	F 360 قطعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 60 — E قطعة

كيف أبدأ؟ استخراج إنتاج آلة واحدة في ساعة واحدة.
1. إجمالي وحدات آلة-ساعة $= 5 \times 30 = 30$.
2. إنتاج الآلة الواحدة في الساعة $= 30 \div 300 = 10$.
3. الإنتاج المطلوب $= 3 \times 2 \times 10 = 60$.
الطريقة السريعة: المعدل للوحدة $\times$ عدد الآلات $\times$ الزمن.
تذكر: وحدة آلة-ساعة تجعل مسائل الإنتاج مباشرة.

ينجز العامل أ 12 وحدة/ساعة، وينجز العامل ب 20 وحدة/ساعة. إذا عملا معًا 6 ساعات، فكم وحدة ينجزان؟

A 120 وحدة	B 72 وحدة
C 32 وحدة	D 160 وحدة
E 192 وحدة	F 48 وحدة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 192 — E وحدة

كيف أبدأ؟ اجمع المعدلين لأنهما يعملان في الوقت نفسه.
1. المعدل المشترك في الساعة $= 12 + 20 = 32$.
2. الإنجاز الكلي $= 6 \times 32 = 192$.
الطريقة السريعة: (معدل أ + معدل ب) $\times$ الزمن.
تذكر: تأكد أن المعدلين بنفس الوحدة الزمنية قبل جمعهما.

خُمس ثلث ربع عدد يساوي 12. فما العدد؟

A 144	B 72
C 0.2	D 180
E 720	F 660

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 720 — E

كيف أبدأ؟ اعكس العمليات: ما قُسم عليه يُضرب فيه عند الرجوع.
1. أخذ خُمس ثلث ربع يعني القسمة على 5 ثم على 3 ثم على 4.
2. حاصل ضرب المقامات $= 5 \times 3 \times 4 = 60$.
3. إذن العدد $= 60 \div 12$ ، ومنه العدد $= 12 \times 60 = 720$.
الطريقة السريعة: $12 \times 60 = 720$.
تذكر: الرجوع من الناتج إلى العدد الأصلي يعني الضرب في حاصل ضرب المقامات.

قطعت سيارة نصف المسافة بسرعة 60 كم/ساعة، والنصف الآخر بسرعة 30 كم/ساعة. إذا استغرقت الرحلة كاملة 18 ساعة، فما المسافة الكلية؟

☐ A 1620 كيلومترًا	☐ B 780 كيلومترًا
☒ C 720 كيلومترًا	☐ D 1080 كيلومترًا
☐ E 540 كيلومترًا	☐ F 360 كيلومترًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — 720 كيلومترًا

كيف أبدأ؟ انتبه: النصفان متساويان في المسافة لا في الزمن.

1. نفرض نصف المسافة = n ، فزمن النصف الأول = $n \div 60$ وزمن النصف الثاني = $n \div 30$ ، ومجموعهما 18.
2. بضرب طرفي المعادلة في $30 \times 60 = 1800$: $n \times (60 + 30) = 1800 \times 18$.
3. نحسب الطرفين: $90 = 60 + 30$ ، و $32400 = 1800 \times 18$.
4. $n = 32400 \div 90 = 360$.
5. المسافة الكلية = $360 + 360 = 720$.

الطريقة السريعة: قسّم الزمن بنسبة عكس السرعتين.

تذكّر: عند تساوي المسافتين، الجزء الأطول يستغرق زمنًا أطول.

إذا كان بعد غد هو السبت، فما اليوم الذي كان قبل يومين من اليوم؟

☐ A الاثنين	☐ B الأحد
☐ C الخميس	☐ D الأربعاء
☐ E السبت	☒ F الثلاثاء

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — الثلاثاء

كيف أبدأ؟ ثبّت اليوم الحالي أولاً ثم نقّذ الإزاحة الثانية.

1. من «بعد غد = السبت» نرجع يومين فنحدد اليوم الحالي: الخميس.
2. ثم نرجع يومين من الخميس فنصل إلى الثلاثاء.
3. الإزاحة الكلية من اليوم المطلوب إلى اليوم المذكور = $2 + 2 = 4$.

الطريقة السريعة: بعد غد ← اليوم الحالي، ثم ارجع العدد المطلوب.

تذكّر: لا تخطئ بين الإزاحتين؛ نقّذ كل واحدة على حدة.

تنجز آلة 540 وحدة خلال 9 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 25%. كم وحدة تنجز خلال 6 دقائق بالمعدل الجديد؟

A 562.5 وحدة	B 990 وحدة
C 60 وحدة	D 450 وحدة
E 75 وحدة	F 385 وحدة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 450 — D وحدة

كيف أبدأ؟ عدّل معدل الوحدة أولاً ثم طبقه على الزمن الجديد.

1. المعدل الأصلي في الدقيقة $= 540 \div 9 = 60$.

2. معامل الزيادة $= 1 + 25 \div 100 = 1.25$.

3. المعدل الجديد في الدقيقة $= 60 \times 1.25 = 75$.

4. الإنتاج خلال 6 دقائق $= 75 \times 6 = 450$.

الطريقة السريعة: معدل الوحدة — الزيادة — الزمن.

تذكّر: لا تطبق نسبة التحسن على إجمالي قديم بزمان مختلف.

النسبة بين أ : ب = 3 : 2. نُقلت 6 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 7 : 8. فما قيمة ب قبل النقل؟

A 12	B 18
C 6	D 72
E 9	F 16

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 18 — B

كيف أبدأ؟ اكتب الطرفين على صورة أجزاء ثم طوّق النقل على الطرفين معاً.

1. نضع أ = 3ك وب = 2ك.

2. بعد النقل: أ = 3ك - 6، وب = 2ك + 6، والمجموع لم يتغير.

3. النسبة الجديدة 7 : 8 تعطي المعادلة $8(3ك - 6) = 7(2ك + 6)$.

4. نحسب المعاملات: $24 = 3 \times 8$ و $24 = 2 \times 7$ و $14 = 6 \times 8$ و $42 = 6 \times 7$.

5. فتصير المعادلة $24ك - 48 = 14ك + 42$ ، ومنها $10 = 14 - 24$ و $90 = 42 + 48$.

6. ك = $90 \div 10 = 9$.

7. ب قبل النقل = $2 \times 9 = 18$.

الطريقة السريعة: استخدم بقاء المجموع وثبات مقدار النقل لتحديد مقياس النسبة.

تذكّر: في النقل، المجموع ثابت لكن كل طرف يتغير بعكس الآخر.

على خريطة، كل سنتيمتران تمثل 10 كيلومترات. طول مسار على الخريطة 6 سنتيمترات، ثم أضيف إليه طريق جانبي طوله 3 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

A 45 كيلومترًا	B 30 كيلومترًا
C 9 كيلومترات	D 5 كيلومترات
E 1.8 كيلومترًا	F 15 كيلومترًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 45 — A كيلومترًا

كيف أبدأ؟ اجمع أطوال الخريطة أولاً ثم طَبِّق المقياس.

1. الطول الكلي على الخريطة بالسنتيمترات $= 3 + 6 = 9$.

2. ما يمثل السنتيمتر الواحد بالكيلومترات $= 2 \div 10 = 5$.

3. المسافة الحقيقية بالكيلومترات $= 5 \times 9 = 45$.

الطريقة السريعة: إجمالي السنتيمترات $\times$ كيلومترات لكل سنتيمتر.

تذكر: وُجِد المسار المطلوب قبل التحويل من الخريطة إلى الواقع.

تنتج آلة من النوع أ 20 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 30 قطعة/ساعة. إذا عملت 4 آلات من أ و5 آلات من ب معًا لمدة 4 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

A 200 قطعة	B 720 قطعة
C 230 قطعة	D 900 قطعة
E 920 قطعة	F 600 قطعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 920 — E قطعة

كيف أبدأ؟ احسب معدل كل نوع على حدة ثم اجمع.

1. معدل مجموعة أ في الساعة $= 20 \times 4 = 80$.

2. معدل مجموعة ب في الساعة $= 30 \times 5 = 150$.

3. المعدل الكلي $= 150 + 80 = 230$.

4. الإنتاج $= 4 \times 230 = 920$.

الطريقة السريعة: معدل أ الكلي + معدل ب الكلي، ثم $\times$ الزمن.

تذكر: لا تستخدم متوسط المعدلين إذا كان عدد الآلات مختلفًا.

كانت قيمة 800. زادت بنسبة 25%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

A	انخفاض 12.5%
B	لا يوجد تغير
C	زيادة 50%
D	انخفاض 6.25%
E	انخفاض 7.25%
F	انخفاض 25%

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — انخفاض 6.25%

كيف أبدأ؟ طلق كل نسبة على القيمة الموجودة في تلك اللحظة.

- القيمة بعد التغير الأول $= 800 \times (100 + 25) \div 100 = 1000$.
- القيمة بعد التغير الثاني $= 1000 \times (100 - 25) \div 100 = 750$.
- الفرق عن الأصل $= 800 - 750 = -50$.
- نسبة التغير $= -50 \div 800 \times 100 = -6.25\%$.

الطريقة السريعة: استخدم معاملي التغير: $1.25 \times 0.75 = 0.9375$.

تذكر: النسب المتتالية لا تجمع ولا تُطرح مباشرة.

متوسط 8 قيم هو 30. استُبدلت قيمة 21 بقيمة 29. فما المتوسط الجديد؟

A	31
B	29
C	21
D	30
E	32
F	38

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — 31

كيف أبدأ؟ في الاستبدال، عدد القيم لا يتغير؛ عدّل المجموع فقط.

- المجموع القديم $= 8 \times 30 = 240$.
- الاستبدال يزيد المجموع بمقدار $29 - 21 = 8$.
- المجموع الجديد $= 240 + 8 = 248$.
- المتوسط الجديد $= 248 \div 8 = 31$.

الطريقة السريعة: زد المتوسط بمقدار فرق القيمتين مقسومًا على عدد القيم.

تذكر: فرق القيمتين يكفي لتعديل المجموع مباشرة.

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 40 كم/ساعة أو بسرعة 90 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 40 أطول بمقدار 5 ساعات، فما المسافة؟

☐ A 720 كيلومترًا	☐ B 450 كيلومترًا
☒ C 360 كيلومترًا	☐ D 650 كيلومترًا
☐ E 420 كيلومترًا	☐ F 480 كيلومترًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — 360 كيلومترًا

كيف أبدأ؟ اكتب الزمنين بدلالة المسافة ثم استخدم فرق الزمن.

1. نفرض المسافة = س، فالزمن عند 40 هو س ÷ 40، وعند 90 هو س ÷ 90.
2. الفرق: س ÷ 40 - س ÷ 90 = 5.
3. بضرب الطرفين في $90 \times 40 = 3600$: س × (90 - 40) = 3600×5 .
4. $90 - 40 = 50$ ، و $3600 \times 5 = 18000$.
5. س = $18000 \div 50 = 360$.

الطريقة السريعة: حل س × (1 - 40 ÷ 90) = 5.

تذكّر: عند ثبات المسافة، السرعة الأعلى تعني زمنًا أقل.

يستطيع 6 عمال إنجاز مهمتان خلال 4 أيام. كم عاملاً نحتاج لإنجاز 3 مهام خلال 4 أيام بالكفاءة نفسها؟

☐ A 6 عمال	☐ B 18 عاملاً
☒ C 9 عمال	☐ D 11 عاملاً
☐ E 4 عمال	☐ F 15 عاملاً

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — 9 عمال

كيف أبدأ؟ مع ثبات الزمن، عدد العمال يتناسب مباشرة مع حجم العمل.

1. العمل يتضاعف بنسبة 3 إلى 2، والزمن ثابت.
2. عدد العمال المطلوب = $6 \times 3 \div 2 = 9$.

الطريقة السريعة: اضرب عدد العمال في نسبة العمل الجديد إلى القديم.

تذكّر: إذا زاد العمل وبقي الزمن ثابتًا، زد العمال بالنسبة نفسها.

ما العدد التالي في المتتالية؟

2, 27, 7, 24, 12, 21, 17, ؟

19 B

17 A

15 D

22 C

18 F

21 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 18 — F

كيف أبدأ؟ افصل حدود المواضع الفردية عن الزوجية إذا بدت المتتالية غير منتظمة.

1. نفصل حدود المواضع الفردية: 2, 7, 12, 17، وفروقها $5 = 2 - 7$, $5 = 7 - 12$, $5 = 12 - 17$.
2. ثم حدود المواضع الزوجية: 27, 24, 21، وفروقها $3 = 27 - 24$, $3 = 24 - 21$.
3. الدور التالي للسلسلة الزوجية: $3 - 21 = 18$.

الطريقة السريعة: اقرأ حدود المواضع الزوجية وحدها؛ ستظهر القاعدة فورًا.

تذكر: قد تتداخل سلسلتان بسيطتان داخل متتالية واحدة.

اليوم الذي يأتي بعد يومين من غد هو الاثنين. فما اليوم الحالي؟

الاثنين B

A الثلاثاء

الجمعة D

C الأربعاء

F السبت

E الأحد

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: D — الجمعة

كيف أبدأ؟ حوّل العبارة المركبة إلى إراحة واحدة من اليوم الحالي.

1. «غد» إراحة قدرها 1، ثم يومين إضافية.
2. الإراحة الصافية $3 = 2 + 1$.
3. نرجع 3 أيام من الاثنين فنصل إلى الجمعة.

الطريقة السريعة: ارجع 3 أيام من اليوم المذكور.

تذكر: غد تساوي +1، فاجمعها مع بقية الأيام قبل التحرك.

يعمل أ بمعدل 10 وحدة/ساعة وب بمعدل 15 وحدة/ساعة. عملاً معًا 5 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 185 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

A 6 ساعات	B 7.4 ساعة
C 7 ساعات	D 11 ساعة
E 18.5 ساعة	F 12 ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 6 — A ساعات

كيف أبدأ؟ قسم السؤال إلى فترة مشتركة ثم فترة منفردة.

1. الإنجاز المشترك $= 10 + 15 = 25$ ساعة.

2. المتبقي $= 185 - 25 = 160$ ساعة.

3. زمن أ منفردًا بالساعات $= 160 \div 10 = 16$ ساعة.

الطريقة السريعة: اطرح الإنجاز المشترك ثم اقسم المتبقي على معدل أ.

تذكر: كل مرحلة لها معدلها الخاص.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

343, 216, 64, 125, 27, 95	
A 343	B 216
C 95	D 64
E 125	F 27

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 95 — C

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

1. $3 \times 3 \times 3 = 27$

2. $4 \times 4 \times 4 = 64$

3. $5 \times 5 \times 5 = 125$

4. $6 \times 6 \times 6 = 216$

5. $7 \times 7 \times 7 = 343$

6. 95 لا يحقق الخاصية «مكعب كامل»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «مكعب كامل» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكر: الأعداد 8 و27 و64 و125 إشارة قوية إلى المكعبات.

اشترى متجر سلعة بـ160 درهماً ودفع 20 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ216 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

15% A	35% B
20% C	11.1% D
16.7% E	25% F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20% — C

كيف أبدأ؟ احسب التكلفة الكلية قبل حساب الربح.

- إجمالي التكلفة = $160 + 20 = 180$.
 - الربح = $216 - 180 = 36$.
 - نسبة الربح = $36 \div 180 \times 100 = 20$.
- الطريقة السريعة: (سعر البيع - التكلفة الكلية) ÷ التكلفة الكلية $\times 100$.
- تذكر: الشحن والتجهيز جزء من التكلفة إذا ذكرهما السؤال.

سارة أسرع من سالم. سارة أسرع من راشد. علي أسرع من فهد. سالم أسرع من ليان. راشد أسرع من فهد. ليان أسرع من علي. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من فهد؟

شخصان A	شخص واحد B
لا أحد C	أربعة أشخاص D
لا يمكن تحديده E	خمسة أشخاص F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — خمسة أشخاص

كيف أبدأ؟ ابن كل المسارات التي تنتهي بالشخص المطلوب ثم عدّ من فوقه.

- بنيني كل المسارات التي تنتهي عند فهد.
- نستخدم الاستنتاج الانتقالي: إذا كان أ أسرع من ب وب أسرع من ج، فأ أسرع من ج.
- المؤكد تفوقهم على فهد هم: سارة، سالم، ليان، راشد، علي؛ إذن الإجابة خمسة أشخاص.

الطريقة السريعة: عدّ كل من يمكن إثبات أنه أعلى من الهدف.

تذكر: استخدم الاستنتاج الانتقالي، ولا تعدّ إلا من له مسار مؤكد.

ما قيمة سُدس خُمس ربع العدد 960؟

160	A
32	C
8	E
24	D
960	F
16	B

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 8 — E

كيف أبدأ؟ طلّق الكسور واحدًا بعد الآخر على الناتج السابق، ولا تستخدم مفهوم «الباقى».

1. السُدس من العدد 960 هو $960 \div 6 = 160$.
2. الخُمس من العدد 160 هو $160 \div 5 = 32$.
3. الربع من العدد 32 هو $32 \div 4 = 8$.
الطريقة السريعة: اضرب المقامات: $4 \times 5 \times 6 = 120$ ، ثم $960 \div 120 = 8$.
تذكّر: في الكسور المباشرة المتتابة، كل كسر يؤخذ من الناتج الذي قبله.

عمر سالم الآن ضعف عمر أخيه. بعد 5 سنوات سيكون مجموع عمريهما 49 سنة. كم عمر سالم الآن؟

13 سنة	A
24 سنة	C
18 سنة	E
28 سنة	D
39 سنة	F
26 سنة	B

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 26 — B سنة

كيف أبدأ؟ ارجع إلى المجموع الحالي ثم استخدم النسبة الحالية.

1. المجموع الآن $= 5 \times 2 - 49 = 39$.
2. مجموع أجزاء النسبة $= 1 + 2 = 3$.
3. قيمة الجزء الواحد $= 39 \div 3 = 13$.
4. عمر سالم $= 13 \times 2 = 26$.
الطريقة السريعة: المجموع الحالي تم تقسيمه إلى 3 أجزاء.
تذكّر: إذا كانت النسبة الآن، طلّقها بعد إرجاع المجموع إلى الآن.

خمس ثمن العدد 640 ثم كسر منه يساوي 8. فما الكسر المجهول؟

A النصف	B الثلث
C الخمس	D الشدس
E الثمن	F الربع

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — النصف

كيف أبدأ؟ طلق الكسور المعلومة أولاً، ثم قارن الناتج بالقيمة النهائية.

1. حاصل ضرب مقامات الكسور المعلومة $8 \times 5 = 40$.
2. خمس ثمن من العدد 640 هو $640 \div 16 = 40$.
3. بقي أن نتقل من 16 إلى 8.
4. $16 \div 8 = 2$ ، إذن الكسر المجهول هو النصف.

الطريقة السريعة: $16 \div 8 = 2$.

تذكر: الكسر المجهول هو نسبة الناتج قبله إلى الناتج بعده.

زادت قيمة بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 20%. إذا أصبحت القيمة النهائية 480، فما القيمة الأصلية؟

A 460.8	B 450
C 480	D 500
E 400	F 550

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — 500

كيف أبدأ؟ حوّل كل تغير إلى معامل، ثم اعكس حاصل ضرب المعاملين.

1. معامل الزيادة $100 \div (20 + 100) = 1.2$.
2. معامل الانخفاض $100 \div (20 - 100) = 0.8$.
3. المعامل الكلي $0.8 \times 1.2 = 0.96$.
4. الأصل $480 \div 0.96 = 500$.

الطريقة السريعة: اقسم النهائي على حاصل ضرب معاملي التغير.

تذكر: عكس تغييرين متتاليين يتطلب عكس كل المراحل لا طرح النسب.

مدينتان بينهما 300 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 60 كم/ساعة. بعد ساعة واحدة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 90 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

A 8 ساعات	B 4 ساعات
C 1.6 ساعة	D 3.2 ساعة
E 2.6 ساعة	F 1.1 ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 1.6 — C ساعة

كيف أبدأ؟ احسب أولًا ما قطعته السيارة التي بدأت ميكزًا.

1. ما قطعته أ أثناء التأخير $= 1 \times 60 = 60$.
2. المسافة المتبقية بينهما $= 300 - 60 = 240$.
3. سرعة الاقتراب $= 90 + 60 = 150$.
4. الزمن بالساعات $= 240 \div 150 = 1.6$.

الطريقة السريعة: المسافة المتبقية ÷ مجموع السرعتين.

تذكّر: في التقاء مركبتين متقابلتين بعد بدء الاثنيتين، استخدم مجموع السرعتين.

متوسط 6 قيم هو 28. حُذفت قيمة مقدارها 8. فما متوسط القيم 5 الباقية؟

A 32	B 34
C 33	D 160
E 35.2	F 33.6

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 32 — A

كيف أبدأ؟ حوّل المتوسط القديم إلى مجموع ثم اطرح القيمة المحذوفة.

1. المجموع الأصلي $= 6 \times 28 = 168$.
2. المجموع بعد الحذف $= 168 - 8 = 160$.
3. المتوسط الجديد $= 160 \div 5 = 32$.

الطريقة السريعة: مجموع قديم ناقص القيمة المحذوفة، ثم اقسم على العدد الجديد.

تذكّر: الحذف يغير المجموع وعدد القيم معًا.

عمر الأب يساوي أربعة أمثال عمر ابنه، والفرق بين عمرهما 27 سنة. كم عمر الابن؟

A 9 سنوات	B 31 سنة
C 27 سنة	D 36 سنة
E 108 سنة	F 13 سنة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 9 — A سنوات

كيف أبدأ؟ حوّل المضاعف إلى أجزاء.

- 1. عمر الابن جزء واحد، وعمر الأب 4 أجزاء.
- 2. الفرق بالأجزاء = $4 - 1 = 3$.
- 3. الجزء الواحد = $27 \div 3 = 9$.

الطريقة السريعة: اقسم الفرق على 3.

تذكّر: الفرق بين عمر الأب وعمر الابن يساوي 3 أجزاء.

إذا كان بعد غد هو الأحد، فما اليوم الذي كان قبل يومين من اليوم؟

A الجمعة	B الأحد
C الخميس	D الاثنين
E الأربعاء	F الثلاثاء

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: E — الأربعاء

كيف أبدأ؟ ثبّت اليوم الحالي أولاً ثم نَقِّذ الإزاحة الثانية.

- 1. من «بعد غد = الأحد» نرجع يومين فنحدد اليوم الحالي: الجمعة.
- 2. ثم نرجع يومين من الجمعة فنصل إلى الأربعاء.
- 3. الإزاحة الكلية من اليوم المطلوب إلى اليوم المذكور = $2 + 2 = 4$.

الطريقة السريعة: بعد غد ← اليوم الحالي، ثم ارجع العدد المطلوب.

تذكّر: لا تخلط بين الإزاحتين؛ نَقِّذ كل واحدة على حدة.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

12, 10, 26, 22, 14, 6

12 B

6 A

10 D

14 C

22 F

26 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 12 — B

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

1. $3 = 2 \div 6$ ، وهو عدد أولي.2. $5 = 2 \div 10$ ، وهو عدد أولي.3. $7 = 2 \div 14$ ، وهو عدد أولي.4. $11 = 2 \div 22$ ، وهو عدد أولي.5. $13 = 2 \div 26$ ، وهو عدد أولي.

6. 12 لا يحقق الخاصية «ضعف عدد أولي»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «ضعف عدد أولي» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكر: إذا كانت كل الأعداد زوجية، اقسمها على 2 وابحث عن خاصية في النواتج.

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 6 أيام. إذا عمل 12 عاملاً بالكفاءة نفسها، فكم يومًا يحتاجون؟

7.2 يومًا B

60 يومًا A

6 أيام D

5 أيام C

8 أيام F

12 يومًا E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 5 — C أيام

كيف أبدأ؟ حوّل العمل إلى وحدات عامل-يوم.

1. العمل الكامل بوحدة عامل-يوم $= 6 \times 10 = 60$.2. الزمن المطلوب بالأيام $= 60 \div 12 = 5$.

الطريقة السريعة: اضرب العمال في الأيام ثم اقسّم على العدد الجديد.

تذكر: إذا ثبت العمل والكفاءة: عدد العمال $\times$ عدد الأيام ثابت.

ما العدد التالي في المتتالية؟

4, 8, 16, 21, 63, 69, 276, ؟

283 B

552 A

284 D

1380 C

290 F

280 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: B — 283

كيف أبدأ؟ إذا لم تجد فرقًا ثابتًا، افحص هل عمليتان تتناوبان.

1. العمليات تتناوب بين الجمع والضرب: $4+, 2\times, 5+, 3\times, 6+, 4\times$.

2. بعد آخر عملية ضرب نعود إلى الجمع، ورقم الجمع التالي $7 = 1 + 6$.

3. الحد التالي $283 = 7 + 276$.

الطريقة السريعة: حدد هل الدور التالي جمع أم ضرب، ثم استخدم الرقم التالي في السلسلة.

تذكر: التناوب قد يكون مع أرقام تزداد تدريجيًا في كل مرة.

على خريطة، كل 5 سنتيمترات تمثل 60 كيلومترًا. طول مسار على الخريطة 4 سنتيمترات، ثم أضف إليه طريق جانبي طوله 4 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

144 كيلومترًا B

8 كيلومترات A

192 كيلومترًا D

48 كيلومترًا C

96 كيلومترًا F

108 كيلومترًا E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: F — 96 كيلومترًا

كيف أبدأ؟ اجمع أطوال الخريطة أولاً ثم طِّق المقياس.

1. الطول الكلي على الخريطة بالسنتيمترات $8 = 4 + 4$.

2. ما يمثل السنتيمتر الواحد بالكيلومترات $12 = 5 \div 60$.

3. المسافة الحقيقية بالكيلومترات $96 = 12 \times 8$.

الطريقة السريعة: إجمالي السنتيمترات $\times$ كيلومترات لكل سنتيمتر.

تذكر: وُجد المسار المطلوب قبل التحويل من الخريطة إلى الواقع.

تنجز آلة 360 وحدة خلال 6 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 20%. كم وحدة تنجز خلال 4 دقائق بالمعدل الجديد؟

A 260 وحدة	B 432 وحدة
C 648 وحدة	D 72 وحدة
E 345.6 وحدة	F 288 وحدة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 288 — F وحدة

كيف أبدأ؟ عدّل معدل الوحدة أولاً ثم طبقه على الزمن الجديد.

- المعدل الأصلي في الدقيقة $= 360 \div 6 = 60$.
- معامل الزيادة $= 1 + 20 \div 100 = 1.2$.
- المعدل الجديد في الدقيقة $= 60 \times 1.2 = 72$.
- الإنتاج خلال 4 دقائق $= 72 \times 4 = 288$.

الطريقة السريعة: معدل الوحدة – الزيادة – الزمن.

تذكّر: لا تطبق نسبة التحسن على إجمالي قديم بزمان مختلف.

تنجز آلة أ 10 قطعة/ساعة، وآلة ب 24 قطعة/ساعة. إذا عملتا معًا، فكم ساعة تحتاجان لإنتاج 204 قطعة؟

A 8 ساعات	B 8.5 ساعة
C 6 ساعات	D 20.4 ساعة
E 34 ساعة	F 12 ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 6 — C ساعات

كيف أبدأ؟ اجمع المعدلات ثم اقسّم الهدف عليها.

- المعدل المشترك في الساعة $= 10 + 24 = 34$.
- الزمن المطلوب بالساعات $= 204 \div 34 = 6$.

الطريقة السريعة: الهدف ÷ المعدل المشترك.

تذكّر: بعد جمع المعدلات يصبح السؤال: كمية ÷ معدل.

تنتج 6 آلات متطابقة في الإنتاجية 720 قطعة خلال 6 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 640 قطعة خلال 4 ساعات؟

A 10 آلات	B 8 آلات
C 16 آلة	D 14 آلة
E 20 آلة	F 32 آلة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 8 — B آلات

كيف أبدأ؟ احسب معدل آلة واحدة أولاً.

- إنتاج الآلة الواحدة في الساعة $= 720 \div (6 \times 6) = 20$.
- إنتاج الآلة الواحدة في المدة المطلوبة $= 4 \times 20 = 80$.
- عدد الآلات $= 80 \div 640 = 8$.

الطريقة السريعة: معدل الوحدة ثم اقسم الهدف على إنتاج الوحدة.

تذكّر: عدد الآلات = الإنتاج المطلوب ÷ إنتاج آلة واحدة خلال الزمن المتاح.

ماجد أسرع من ريم. سالم أسرع من نورة. سالم أسرع من ليان. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

A ماجد وريم	B نورة وليان
C سالم وليان	D سالم وماجد
E سالم وريم	F سالم ونورة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: B — نورة وليان

كيف أبدأ؟ ارسم فروغًا بدل محاولة ترتيب الجميع بالقوة.

- نرسم العلاقات كفروع بدل محاولة ترتيب الجميع في سلسلة واحدة.
- نفحص كل ترتيب متوافق مع الجمل.
- في بعض الترتيبات يسبق نورة صاحبته، وفي بعضها يسبقه ليان؛ لذلك المقارنة بينهما غير محسومة، بينما لكل زوج آخر مسار يحسمه.

الطريقة السريعة: ابحث عن الزوج الوحيد الذي لا يربطه مسار مقارنة مؤكد.

تذكّر: العلاقة بين عنصرين في فرعين مختلفين قد تبقى غير محسومة.

النسبة بين أ : ب = 2 : 3. إذا كان مجموعهما 50، فما قيمة ب؟

20	A
40	B
6	C
10	D
25	E
30	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 30 — F

كيف أبدأ؟ احسب مجموع أجزاء النسبة ثم قيمة الجزء الواحد.

1. مجموع أجزاء النسبة $2 + 3 = 5$.

2. قيمة الجزء الواحد $50 \div 5 = 10$.

3. ب $3 \times 10 = 30$.

الطريقة السريعة: المجموع ÷ مجموع الأجزاء، ثم اضرب في أجزاء الطرف المطلوب.

تذكر: في تقسيم المجموع، قيمة الجزء = المجموع ÷ مجموع أجزاء النسبة.

اشترى متجر سلعة بـ160 درهماً وباعها بـ144 درهماً. ما نسبة الخسارة من سعر الشراء؟

16%	A
10%	B
5%	C
5.3%	D
15%	E
20%	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 10% — B

كيف أبدأ؟ احسب مقدار الخسارة أولاً.

1. الخسارة بالدرهم $160 - 144 = 16$.

2. نسبة الخسارة $16 \div 160 \times 100 = 10$.

الطريقة السريعة: الخسارة ÷ الشراء × 100.

تذكر: استخدم سعر الشراء كأساس للنسبة عندما يطلب السؤال ذلك.

اليوم الذي يأتي بعد 4 أيام من غد هو الجمعة. فما اليوم الحالي؟

الثلاثاء	A
الأربعاء	C
الخميس	F
الأحد	D
الاثنين	B

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — الأحد

كيف أبدأ؟ حوّل العبارة المركبة إلى إزاحة واحدة من اليوم الحالي.

1. «غد» إزاحة قدرها 1، ثم 4 أيام إضافية.

2. الإزاحة الصافية $1 + 4 = 5$.

3. نرجع 5 أيام من الجمعة فنصل إلى الأحد.

الطريقة السريعة: ارجع 5 أيام من اليوم المذكور.

تذكر: غد تساوي +1، فاجمعها مع بقية الأيام قبل التحرك.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

48, 72, 35, 80, 63, 99

72 B

48 A

35 D

80 C

63 F

99 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 72 — B

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجًا.

1. $6 \times 6 = 36 = 1 + 35$

2. $7 \times 7 = 49 = 1 + 48$

3. $8 \times 8 = 64 = 1 + 63$

4. $9 \times 9 = 81 = 1 + 80$

5. $10 \times 10 = 100 = 1 + 99$

6. 72 لا يحقق الخاصية «مربع كامل ناقص 1»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «مربع كامل ناقص 1» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكر: قد تكون الخاصية «قريبًا من مربع» لا مربعًا كاملًا نفسه.