

تقرير تدريب عددي متجدد

التاريخ: 2026/9/12، 5:02:17 ص

الوضع: تدريب · الصعوبة: مختلط · عدد الأسئلة: 50

العائلات: عائلات متعددة

متوسط السؤال: 00:00

الزمن: 00:00

غير المجاب: 50

الخطأ: 0

الصحيح: 0

النتيجة: 0%

الأداء حسب العائلة

العائلة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
الاستدلال الزمني وأيام الأسبوع	0/3	0%	00:00
السرعة والمسافة والزمن	0/3	0%	00:00
النسب وتقسيم الكميات	0/3	0%	00:00
النسب المئوية	0/4	0%	00:00
الآلات والإنتاج	0/3	0%	00:00
المتتاليات العددية	0/3	0%	00:00
الكسور المتتالية	0/3	0%	00:00
المتوسط الحسابي	0/3	0%	00:00
المعدل المشترك	0/3	0%	00:00
العدد الذي لا ينتمي	0/3	0%	00:00
التناسب المباشر	0/3	0%	00:00
المعدل الوجدوي	0/3	0%	00:00
الربح والخسارة والأسعار	0/3	0%	00:00
العمال والزمن	0/4	0%	00:00
المقارنة والترتيب العلاقتي	0/3	0%	00:00
مسائل الأعمار	0/3	0%	00:00

الأداء حسب الصعوبة

الصعوبة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
سهل	0/13	0%	00:00
متوسط	0/29	0%	00:00
صعب	0/8	0%	00:00

اليوم الذي يأتي بعد 4 أيام من غد هو الاثنين. فما اليوم الحالي؟

A الاثنين	B الجمعة
C الأربعاء	D الأحد
E الثلاثاء	F السبت

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — الأربعاء

كيف أبدأ؟ حوّل العبارة المركبة إلى إزاحة واحدة من اليوم الحالي.

- 1. «غد» إزاحة قدرها 1، ثم 4 أيام إضافية.
 - 2. الإزاحة الصافية $5 = 4 + 1$.
 - 3. نرجع 5 أيام من الاثنين فنصل إلى الأربعاء.
- الطريقة السريعة: ارجع 5 أيام من اليوم المذكور.
تذكّر: غد تساوي 1+، فاجمعها مع بقية الأيام قبل التحرك.

قطعت سيارة 200 كيلومترًا بسرعة 80 كم/ساعة، ثم قطعت 180 كيلومترًا بسرعة 90 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

A 300 دقيقة	B 270 دقيقة
C 540 دقيقة	D 330 دقيقة
E 4.5 دقيقة	F 285 دقيقة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: B — 270 دقيقة

كيف أبدأ؟ احسب زمن كل مرحلة منفصلًا ثم اجمع.

- 1. زمن المرحلة الأولى بالساعات $2.5 = 80 \div 200$.
 - 2. زمن المرحلة الثانية بالساعات $2 = 90 \div 180$.
 - 3. الزمن الكلي بالساعات $4.5 = 2 + 2.5$.
 - 4. الزمن بالدقائق $270 = 60 \times 4.5$.
- الطريقة السريعة: زمن المرحلة الأولى + زمن الثانية، ثم $60 \times$.
تذكّر: إذا تغيرت السرعة، لا تجمع المسافات وتقسم على سرعة واحدة.

النسبة أ : ب = 4 : 5، والنسبة ب : ج = 2 : 3. إذا كان أ + ب = 36، فما قيمة ج؟

20	B	2	A
32	D	30	C
28	F	50	E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 30 — C

كيف أبدأ؟ وُجد الحد المشترك ثم اربط المعلومة المركبة بالأجزاء.

1. نضرب النسبة الأولى في 2 والثانية في 5 ليتساوى حد ب: $8 = 2 \times 4$ ، و $10 = 2 \times 5$ ، و $15 = 5 \times 3$.
2. إذن أ : ب : ج = 8 : 10 : 15.
3. أ + ب = $8 + 10 = 18$.
4. قيمة الجزء الواحد = $18 \div 3 = 6$.
5. ج = $2 \times 15 = 30$.

الطريقة السريعة: حوّل أ+ب إلى أجزاء، استخرج قيمة الجزء، ثم احسب ج.
تذكّر: بعد التوحيد، كل معلومة عن مجموع أو فرق تصبح عددًا من الأجزاء.

بعد زيادة قيمة بنسبة 25% أصبحت 250. فما القيمة الأصلية؟

250	B	312.5	A
1000	D	225	C
200	F	275	E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 200 — F

كيف أبدأ؟ حوّل التغير إلى معامل ثم اقسم عليه.

1. معامل التغير = $1 + 25 \div 100 = 1.25$.
2. القيمة النهائية = الأصل $\times 1.25$.
3. الأصل = $250 \div 1.25 = 200$.

الطريقة السريعة: اقسم القيمة النهائية على معامل التغير.
تذكّر: بعد زيادة أو نقصان، لا تعكس العملية بطرح النسبة نفسها من الرقم النهائي.

تنتج 4 آلات متطابقة في الإنتاجية 240 قطعة خلال 3 ساعات. كم قطعة تنتج 5 آلات من النوع نفسه خلال ساعتين؟

A 220 قطعة	B 200 قطعة
C 140 قطعة	D 300 قطعة
E 440 قطعة	F 240 قطعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 200 — B قطعة

كيف أبدأ؟ استخرج إنتاج آلة واحدة في ساعة واحدة.

- إجمالي وحدات آلة-ساعة $12 = 3 \times 4$.
- إنتاج الآلة الواحدة في الساعة $20 = 12 \div 240$.
- الإنتاج المطلوب $200 = 20 \times 2 \times 5$.

الطريقة السريعة: المعدل للوحدة $\times$ عدد الآلات $\times$ الزمن.

تذكر: وحدة آلة-ساعة تجعل مسائل الإنتاج مباشرة.

ما العدد المفقود في المتتالية؟

؟, 3, 7, 13, 31	
A 35	B 19
C 45	D 41
E 21	F 23

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 21 — E

كيف أبدأ؟ احسب الفروق أولاً، ثم ابحث عن نمط داخل الفروق نفسها.

- الفروق تبدأ من 4 وتزيد 2 في كل خطوة.
- الفرق الذي يسبق الحد المفقود $8 = 2 \times 2 + 4$.
- الحد المفقود $21 = 8 + 13$.

الطريقة السريعة: الفروق تزيد 2 كل مرة؛ خذ الفرق التالي فقط.

تذكر: قد يكون النمط في الفروق وليس في الحدود مباشرة.

ثمن شُدس نصف عدد يساوي 10. فما العدد؟

106 B	864 A
960 D	80 C
120 F	480 E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 960 — D

كيف أبدأ؟ اعكس العمليات: ما قُسم عليه يُضرب فيه عند الرجوع.

- أخذ ثمن شُدس يعني القسمة على 8 ثم على 6 ثم على 2.
- حاصل ضرب المقامات $= 2 \times 6 \times 8 = 96$.
- إذن العدد $= 96 \div 10$ ، ومنه العدد $= 96 \times 10 = 960$.

الطريقة السريعة: $960 = 96 \times 10$.

تذكّر: الرجوع من الناتج إلى العدد الأصلي يعني الضرب في حاصل ضرب المقامات.

متوسط 6 قيم هو 20. استُبدلت قيمة 25 بقيمة 31. فما المتوسط الجديد؟

25 B	18 A
31 D	21 C
19 F	20 E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 21 — C

كيف أبدأ؟ في الاستبدال، عدد القيم لا يتغير؛ عدّل المجموع فقط.

- المجموع القديم $= 20 \times 6 = 120$.
- الاستبدال يزيد المجموع بمقدار $31 - 25 = 6$.
- المجموع الجديد $= 120 + 6 = 126$.
- المتوسط الجديد $= 126 \div 6 = 21$.

الطريقة السريعة: زد المتوسط بمقدار فرق القيمتين مقسومًا على عدد القيم.

تذكّر: فرق القيمتين يكفي لتعديل المجموع مباشرة.

ينجز العامل أ 12 وحدة/ساعة، والعامل ب 15 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 3 ساعات، ثم عملاً معًا حتى بلغ الإنجاز 144 وحدة. كم ساعة عملاً معًا؟

A 7 ساعات	B 4 ساعات
C 5 ساعات	D 7.2 ساعة
E 12 ساعة	F 9.6 ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 4 — B ساعات

كيف أبدأ؟ احسب ما أنجز في المرحلة المنفردة أولاً.

- 1. إنجاز أ منفردًا $36 = 3 \times 12$.
 - 2. المتبقي $108 = 144 - 36$.
 - 3. المعدل المشترك في الساعة $27 = 15 + 12$.
 - 4. الزمن المشترك بالساعات $4 = 27 \div 108$.
- الطريقة السريعة: المتبقي ÷ المعدل المشترك.
تذكر: لا تستخدم المعدل المشترك على كامل الهدف إذا كان أحدهما بدأ وحده.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

73, 81, 64, 36, 100, 49	
A 73	B 100
C 81	D 36
E 49	F 64

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 73 — A

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

- 1. $36 = 6 \times 6$.
 - 2. $49 = 7 \times 7$.
 - 3. $64 = 8 \times 8$.
 - 4. $81 = 9 \times 9$.
 - 5. $100 = 10 \times 10$.
 - 6. 73 لا يحقق الخاصية «مربع كامل»؛ لذلك هو العدد المختلف.
- الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «مربع كامل» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.
تذكر: إذا رأيت سلسلة مربعات متتابعة فابحث عن العدد الوحيد غير المربع.

تكلف 5 وحدات مبلغ 30 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 12 وحدة وأضيف رسم ثابت قدره 10 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

22.5 درهماً	A
62 درهماً	C
82 درهماً	E
72 درهماً	B
6 دراهم	D
40 درهماً	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 82 — E درهماً

كيف أبدأ؟ افصل التكلفة المتناسبة عن الرسم الثابت.

- 1. سعر الوحدة الواحدة بالدرهم $6 = 5 \div 30$.
- 2. سعر 12 وحدة $72 = 12 \times 6$.
- 3. نصيف الرسم الثابت مرة واحدة: $82 = 10 + 72$.

الطريقة السريعة: سعر الوحدات + الرسم الثابت.
تذكر: الرسم الثابت لا يتكرر مع كل وحدة ما لم يذكر السؤال ذلك.

تنجز آلة 240 وحدة خلال 8 دقائق بمعدل ثابت. كم وحدة تنجز خلال 3 دقائق؟

90 وحدة	A
24 وحدة	C
330 وحدة	E
640 وحدة	B
30 وحدة	D
240 وحدة	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 90 — A وحدة

كيف أبدأ؟ احسب معدل الدقيقة الواحدة أولاً.

- 1. الإنتاج في الدقيقة الواحدة $30 = 8 \div 240$.
- 2. الإنتاج خلال 3 دقائق $90 = 3 \times 30$.

الطريقة السريعة: المعدل $\times$ الزمن المطلوب.
تذكر: معدل الوحدة يحول السؤال إلى ضرب مباشر.

اشترى متجر سلعة بـ 400 درهماً وباعها بـ 360 درهماً. ما نسبة الخسارة من سعر الشراء؟

10% A	40% B
90% C	5% D
15% E	5.3% F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 10% — A

كيف أبدأ؟ احسب مقدار الخسارة أولاً.

1. الخسارة بالدرهم = $400 - 360 = 40$.

2. نسبة الخسارة = $40 \div 400 \times 100 = 10$.

الطريقة السريعة: الخسارة ÷ الشراء × 100.

تذكر: استخدم سعر الشراء كأساس للنسبة عندما يطلب السؤال ذلك.

يستطيع 12 عاملاً إنجاز 3 مهام خلال 5 أيام. كم عاملاً نحتاج لإنجاز 5 مهام خلال 5 أيام بالكفاءة نفسها؟

20 عاملاً A	12 عاملاً B
14 عاملاً C	18 عاملاً D
7.2 عاملاً E	22 عاملاً F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20 — A عاملاً

كيف أبدأ؟ مع ثبات الزمن، عدد العمال يتناسب مباشرة مع حجم العمل.

1. العمل يتضاعف بنسبة 5 إلى 3، والزمن ثابت.

2. عدد العمال المطلوب = $12 \times 5 \div 3 = 20$.

الطريقة السريعة: اضرب عدد العمال في نسبة العمل الجديد إلى القديم.

تذكر: إذا زاد العمل وبقي الزمن ثابتاً، زد العمال بالنسبة نفسها.

غير صحيح · 00:00

بدر أسرع من ناصر. راشد أسرع من نورة. راشد أسرع من ناصر. بدر أسرع من نورة. راشد أسرع من خالد. راشد أسرع من خالد. خالد أسرع من فهد. كم شخصًا نعرف يقيّمًا أنهم أسرع من خالد؟

B ثلاثة أشخاص

D خمسة أشخاص

F أربعة أشخاص

الإجابة الصحيحة: A — شخصان

كيف أبداً؟ ابن كل المسارات التي تنتهي بالشخص المطلوب ثم عدّ من فوقه.

1. نبني كل المسارات التي تنتهي عند خالد.

2. نستخدم الاستنتاج الانتقالي: إذا كان أ أسرع من ب وب أسرع من ج، فأ أسرع من ج.

3. المؤكد تفوقهم على خالد هم: بدر، راشد؛ إذن الإجابة شخصان.

الطريقة السريعة: عدّ كل من يمكن إثبات أنه أعلى من الهدف.

تذکر: استخدم الاستنتاج الانتقالي، ولا تعدّ إلا من له مسار مؤكد.

غير صحيح · 00:00

عمر سالم الآن ضعف عمر أخيه. بعد 3 سنوات سيكون مجموع عمرهما 42 سنة. كم عمر سالم الآن؟

B 14 سنة

D 12 سنة

F 22 سنة

الإجابة الصحيحة: 24 — E سنة

كيف أبدأ؟ ارجع إلى المجموع الحالي ثم استخدم النسبة الحالية.

1. المجموع الآن $= 3 \times 2 - 42 = 36$.

2. مجموع أجزاء النسبة $= 1 + 2 = 3$.

3. قيمة الجزء الواحد $= 36 \div 3 = 12$.

4. عمر سالم = $12 \times 2 = 24$.

الطريقة السريعة: المجموع الحالي ثم تقسيمه إلى 3 أجزاء.

تذکر: إذا كانت النسبة الآن، طَبَّقْهَا بعد إرجاع المجموع إلى الآن.

يعمل جهاز بمعدل 25 وحدة/ساعة لمدة 3 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 20% وعمل 5 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

220 وحدة	A
215 وحدة	B
75 وحدة	C
200 وحدة	D
150 وحدة	E
225 وحدة	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 225 — F وحدة

كيف أبدأ؟ قسّم العمل إلى مرحلتين قبل وبعد تغير المعدل.

1. إنتاج المرحلة الأولى $= 3 \times 25 = 75$.
2. معامل الزيادة $= 1 + 20 \div 100 = 1.2$.
3. المعدل الجديد $= 1.2 \times 30 = 36$.
4. إنتاج المرحلة الثانية $= 5 \times 36 = 180$.
5. الإجمالي $= 180 + 75 = 255$.

الطريقة السريعة: إنتاج المرحلة الأولى + إنتاج المرحلة الثانية.
تذكّر: لا تطبق المعدل الجديد على الزمن السابق.

ماجد أسرع من ناصر. بدر أسرع من سارة. سارة أسرع من ناصر. هند أسرع من سالم. سالم أسرع من بدر. من صاحب المركز الرابع؟

ماجد	A
بدر	C
هند	E
سالم	B
ناصر	D
لا يمكن تحديده	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — لا يمكن تحديده

كيف أبدأ؟ حدد ما هو ثابت أولاً، ثم انظر هل المركز المطلوب يقع بين عنصرين غير مرتبين.

1. نفحص كل ترتيب متوافق مع الجمل.
2. المركز الرابع يشغله بدر أو ماجد أو سارة باختلاف الترتيب.
3. ما دام أكثر من مرشح ممكناً، فالمركز غير قابل للتحديد.

الطريقة السريعة: إذا بقي مرشحان للمركز نفسه بلا علاقة بينهما فالإجابة غير محسومة.
تذكّر: في الترتيب الجزئي قد يبقى بعض المراكز غير محسوم رغم معرفة الأول والآخر.

يستطيع 4 عمال إنجاز عمل في 15 يومًا. إذا عمل 20 عاملًا بالكفاءة نفسها، فكم يومًا يحتاجون؟

A 2.5 يومًا

B 3 أيام

C 31 يومًا

D يوم واحد

E 5 أيام

F 20 يومًا

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 3 — B أيام

كيف أبدأ؟ حوّل العمل إلى وحدات عامل-يوم.

1. العمل الكامل بوحدة عامل-يوم = $15 \times 4 = 60$.

2. الزمن المطلوب بالأيام = $60 \div 20 = 3$.

الطريقة السريعة: اضرب العمال في الأيام ثم اقسم على العدد الجديد.

تذكّر: إذا ثبت العمل والكفاءة: عدد العمال $\times$ عدد الأيام ثابت.

متوسط 4 قيم هو 22، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 27. فما متوسط القيم 10 مجتمعة؟

A 27

B 24.5

C 24

D 26

E 62.5

F 25

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 25 — F

كيف أبدأ؟ لا تأخذ متوسط المتوسطين مباشرة إذا كان عدد القيم مختلفًا.

1. مجموع المجموعة الأولى = $22 \times 4 = 88$.

2. مجموع المجموعة الثانية = $27 \times 6 = 162$.

3. المجموع الكلي = $162 + 88 = 250$.

4. المتوسط المدمج = $250 \div 10 = 25$.

الطريقة السريعة: المتوسط المدمج = مجموع المجموعتين $\div$ مجموع الأعداد.

تذكّر: حوّل كل متوسط إلى مجموع ثم اجمع.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

64, 27, 8, 268, 125, 216

125 B

27 A

64 D

8 C

268 F

216 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 268 — F

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عدداً واحداً خارجها.

1. $2 \times 2 \times 2 = 8$.

2. $3 \times 3 \times 3 = 27$.

3. $4 \times 4 \times 4 = 64$.

4. $5 \times 5 \times 5 = 125$.

5. $6 \times 6 \times 6 = 216$.

6. 268 لا يحقق الخاصية «مكعب كامل»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «مكعب كامل» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكر: الأعداد 8 و27 و64 و125 إشارة قوية إلى المكعبات.

تساوى العناصر في الوزن. إذا كان وزن 10 عناصر هو 8 كيلوجرامات، فما وزن 15 عنصرًا من النوع نفسه؟

20 كيلوجرامًا B

12 كيلوجرامًا A

120 كيلوجرامًا D

13 كيلوجرامًا C

150 كيلوجرامًا F

8 كيلوجرامات E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 12 — A كيلوجرامًا

كيف أبدأ؟ احسب قيمة الوحدة ولو كانت كسرًا، ثم اضرب.

1. وزن العنصر الواحد بالكيلوجرامات $= 10 \div 8 = 0.8$.

2. وزن 15 عنصرًا بالكيلوجرامات $= 0.8 \times 15 = 12$.

الطريقة السريعة: الوزن للوحدة $\times$ العدد المطلوب.

تذكر: قيمة الوحدة قد تكون كسرًا بسيطًا وما زال التناسب مباشرًا.

ما قيمة ثمن خمس العدد 720؟

18	A
720	B
90	C
3.6	D
2.25	E
36	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 18 — A

كيف أبدأ؟ طلق الكسور واحدًا بعد الآخر على الناتج السابق، ولا تستخدم مفهوم «الباقى».

1. الثمن من العدد 720 هو $720 \div 8 = 90$.

2. الخمس من العدد 90 هو $90 \div 5 = 18$.

الطريقة السريعة: اضرب المقامات: $8 \times 5 = 40$ ، ثم $720 \div 40 = 18$.

تذكر: في الكسور المباشرة المتتابة، كل كسر يؤخذ من الناتج الذي قبله.

زادت قيمة بنسبة 50%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. إذا أصبحت القيمة النهائية 900، فما القيمة الأصلية؟

925	A
850	C
1012.5	E
1200	B
800	D
900	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 800 — D

كيف أبدأ؟ حوّل كل تغير إلى معامل، ثم اعكس حاصل ضرب المعاملين.

1. معامل الزيادة $= (100 + 50) \div 100 = 1.5$.

2. معامل الانخفاض $= (100 - 25) \div 100 = 0.75$.

3. المعامل الكلي $= 1.5 \times 0.75 = 1.125$.

4. الأصل $= 900 \div 1.125 = 800$.

الطريقة السريعة: اقسم النهائي على حاصل ضرب معاملي التغير.

تذكر: عكس تغيرين متتاليين يتطلب عكس كل المراحل لا طرح النسب.

النسبة بين أ : ب = 4 : 3. أضيفت 6 وحدات إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 4 : 5. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

14 A	6 B
21 C	3 D
12 E	9 F

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 21 — C

كيف أبدأ؟ ثبت الطرف الذي لم يتغير، ثم اكتب معادلة النسبة بعد الإضافة.

1. نضع $A = 4$ و $B = 3$ ، حيث K قيمة الجزء.
2. بعد الإضافة تصبح $B = 3 + 6 = 9$ ، والنسبة $A : B = 4 : 9$.
3. بالضرب التبادلي: $4 \times 5 = 4 \times 4 \times (3 + K)$.
4. نحسب المعاملات: $20 = 4 \times 5$ و $12 = 3 \times 4$ و $24 = 6 \times 4$ ؛ فتصبح المعادلة $20 = 12 + 4K$.
5. بطرح الحدين المتشابهين: $20 - 12 = 8$ ، إذن $8 = 4K$.
6. $8 \div 4 = 2$.
7. المجموع قبل الإضافة $= 3 + 3 + 3 + 4 = 21$.

الطريقة السريعة: اكتب الطرفين بدلالة K ثم حل معادلة الضرب التبادلي.

تذكر: في تغير النسبة، ميّز بوضوح بين القيم الأصلية والقيم بعد التغير.

اشترى متجر سلعة بـ 240 درهماً ودفع 20 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ 325 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

7.7% A	30% B
25% C	20% D
27.1% E	65% F

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 25% — C

كيف أبدأ؟ احسب التكلفة الكلية قبل حساب الربح.

1. إجمالي التكلفة $= 240 + 20 = 260$.
 2. الربح $= 325 - 260 = 65$.
 3. نسبة الربح $= 65 \div 260 \times 100 = 25$.
- الطريقة السريعة: (سعر البيع - التكلفة الكلية) ÷ التكلفة الكلية $\times 100$.

تذكر: الشحن والتجهيز جزء من التكلفة إذا ذكرهما السؤال.

ما العدد المفقود في المتتالية؟

؟، 14، 26، 50، 5	
8 A	74 B
100 C	53 D
10 E	32 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 8 — A

كيف أبدأ؟ احسب الفروق ولاحظ هل تتضاعف.

- 1. الفروق بين الحدود تتضاعف، وأول فرق $= 3$.
- 2. الفرق الذي يسبق الحد المفقود $= 3 = 3$.
- 3. الحد المفقود $= 3 + 5 = 8$.

الطريقة السريعة: ضاعف آخر فرق فقط، لا الحد الأخير.

تذكر: عندما تتضاعف الفروق، أضف الفرق المضاعف إلى الحد الأخير.

اليوم الذي يسبق بمقدار يومين اليوم الواقع بعد 3 أيام من الغد هو الأربعاء. فما اليوم الحالي؟

A الأربعاء	B الخميس
C الجمعة	D الاثنين
E السبت	F الثلاثاء

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — الاثنين

كيف أبدأ؟ حوّل العبارة كلها إلى إراحة صافية واحدة قبل النظر في أسماء الأيام.

- 1. «بعد 3 أيام من الغد» يعني إراحة قدرها $4 = 3 + 1$ من اليوم الحالي.
- 2. ثم «يسبق بمقدار يومين» يطرح 2: الإراحة الصافية $= 4 - 2 = 2$.
- 3. اليوم المذكور الأربعاء يقع بعد يومين من اليوم الحالي، فنرجع بالمقدار نفسه ونصل إلى الاثنين.

الطريقة السريعة: الإراحة الصافية $= 1 +$ الأمامية - الخلفية، ثم ارجع بها.

تذكر: في العبارات المركبة، اجمع الإزاحات الأمامية واطرح الخلفية أولاً، ولا تنسَ أن «الغد» نفسه إراحة قدرها 1.

عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 26 سنة. بعد 6 سنوات سيكون عمر الأم ثلاثة أمثال عمر ابنتها. كم عمر الابنة الآن؟

☐	A 33 سنة	☐	B 21 سنة
☐	C 5 سنوات	☐	D 13 سنة
☒	E 7 سنوات	☐	F 3 سنوات

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 7 — E سنوات

كيف أبدأ؟ أضف السنوات إلى العمرين قبل تطبيق علاقة المستقبل.

1. نفرض عمر الابنة الآن = س، فعمر الأم = س + 26.
2. بعد 6 سنوات: الابنة = س + 6، والأم = س + 26 + 6.
3. نجمع الناتجين: 32 = 6 + 26، فيصبح عمر الأم = س + 32.
4. من العلاقة: س + 32 = 3 × (س + 6).
5. بفك الأقواس: 3 × 6 = 18، ومنها (3 - 1) س = 32 - 18 = 14.
6. س = 14 ÷ 2 = 7.

الطريقة السريعة: اكتب معادلة واحدة بعد 6 سنوات.

تذكر: العلاقة المستقبلية لا تطبق على الأعمار الحالية مباشرة.

ينجز العامل أ 18 وحدة/ساعة، والعامل ب 12 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 5 ساعات، ثم عملاً معاً حتى بلغ الإنجاز 180 وحدة. كم ساعة عملاً معاً؟

☐	A 5 ساعات	☐	B 6 ساعات
☐	C 10 ساعات	☒	D 3 ساعات
☐	E 4 ساعات	☐	F 15 ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 3 — D ساعات

كيف أبدأ؟ احسب ما أنجز في المرحلة المنفردة أولاً.

1. إنجاز أ منفرداً = 18 × 5 = 90.
2. المتبقي = 180 - 90 = 90.
3. المعدل المشترك في الساعة = 18 + 12 = 30.
4. الزمن المشترك بالساعات = 90 ÷ 30 = 3.

الطريقة السريعة: المتبقي ÷ المعدل المشترك.

تذكر: لا تستخدم المعدل المشترك على كامل الهدف إذا كان أحدهما بدأ وحده.

تنتج 3 آلات متطابقة في الإنتاجية 150 قطعة خلال 5 ساعات. كم قطعة تنتج 6 آلات من النوع نفسه خلال ساعتين؟

A 10 قطع	B 120 قطعة
C 60 قطعة	D 300 قطعة
E 110 قطعة	F 80 قطعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 120 — **B** قطعة

كيف أبدأ؟ استخراج إنتاج آلة واحدة في ساعة واحدة.

1. إجمالي وحدات آلة-ساعة $= 5 \times 3 = 15$.

2. إنتاج الآلة الواحدة في الساعة $= 150 \div 15 = 10$.

3. الإنتاج المطلوب $= 6 \times 2 \times 10 = 120$.

الطريقة السريعة: المعدل للوحدة $\times$ عدد الآلات $\times$ الزمن.

تذكّر: وحدة آلة-ساعة تجعل مسائل الإنتاج مباشرة.

سارت سيارة بسرعة 70 كم/ساعة لمدة 2.5 ساعة. ما المسافة التي قطعتها؟

A 72.5 كيلومترًا	B 28 كيلومترًا
C 140 كيلومترًا	D 87.5 كيلومترًا
E 245 كيلومترًا	F 175 كيلومترًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 175 — **F** كيلومترًا

كيف أبدأ؟ استخدم العلاقة: المسافة = السرعة $\times$ الزمن.

1. المسافة = السرعة $\times$ الزمن.

2. المسافة بالكيلومترات $= 2.5 \times 70 = 175$.

الطريقة السريعة: اضرب السرعة في الزمن.

تذكّر: المسافة تزداد مباشرة مع السرعة والزمن.

تنجز آلة أ 12 قطعة/ساعة، وآلة ب 15 قطعة/ساعة. إذا عملتا معًا، فكم ساعة تحتاجان لإنتاج 135 قطعة؟

A 2.5 ساعة	B 27 ساعة
C 9 ساعات	D 3 ساعات
E 5 ساعات	F 45 ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 5 — **E** ساعات

كيف أبدأ؟ اجمع المعدلات ثم اقسم الهدف عليها.

1. المعدل المشترك في الساعة $= 12 + 15 = 27$.

2. الزمن المطلوب بالساعات $= 135 \div 27 = 5$.

الطريقة السريعة: الهدف $\div$ المعدل المشترك.

تذكّر: بعد جمع المعدلات يصبح السؤال: كمية $\div$ معدل.

كانت قيمة 200. زادت بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

A انخفاض 11%	B انخفاض 20%
C انخفاض 25%	D انخفاض 10%
E زيادة 10%	F زيادة 5%

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: D — انخفاض 10%

كيف أبدأ؟ طلق كل نسبة على القيمة الموجودة في تلك اللحظة.

1. القيمة بعد التغير الأول $= 100 \div (20 + 100) \times 200 = 240$.

2. القيمة بعد التغير الثاني $= 240 \div (25 - 100) \times 240 = 180$.

3. الفرق عن الأصل $= 200 - 180 = 20$.

4. نسبة التغير $= 20 \div 200 \times 100 = 10$.

الطريقة السريعة: استخدم معاملي التغير: $1.2 \times 0.75 = 0.9$.

تذكر: النسب المتتالية لا تجمع ولا تُطرح مباشرة.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

30, 42, 56, 36, 20, 12	
A 42	B 30
C 12	D 56
E 36	F 20

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: E — 36

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

1. $4 \times 3 = 12$.

2. $5 \times 4 = 20$.

3. $6 \times 5 = 30$.

4. $7 \times 6 = 42$.

5. $8 \times 7 = 56$.

6. 36 لا يحقق الخاصية «حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكر: ابحث عن بنية واحدة واضحة تجمع خمسة أعداد، مثل حاصل ضرب عددين متتاليين.

اشترى متجر سلعة بـ240 درهماً وباعها بـ288 درهماً. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

40% A	120% B
48% C	20% D
25% E	80% F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20% — D

كيف أبدأ؟ احسب الربح بالدرهم أولاً ثم قارنه بسعر الشراء.

1. الربح بالدرهم $= 288 - 240 = 48$.

2. نسبة الربح $= 48 \div 240 \times 100 = 20$.

الطريقة السريعة: الربح $\div$ الشراء $\times 100$.

تذكّر: في نسبة الربح، المقام هو سعر الشراء إذا نص السؤال على ذلك.

متوسط 7 قيم هو 15. أضيفت قيمتان متوسطهما 24. فما متوسط القيم 9؟

24 A	16 B
15 C	19.5 D
18 E	17 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 17 — F

كيف أبدأ؟ حوّل متوسط كل مجموعة إلى مجموع.

1. مجموع القيم الأصلية $= 15 \times 7 = 105$.

2. مجموع القيمتين الجديدتين $= 2 \times 24 = 48$.

3. المجموع الجديد $= 105 + 48 = 153$.

4. المتوسط الجديد $= 153 \div 9 = 17$.

الطريقة السريعة: اجمع مجموع المجموعتين ثم اقسم على العدد الكلي.

تذكّر: متوسط القيمتين لا يُضاف مباشرة إلى المتوسط القديم.

ما العدد التالي في المتتالية؟

5, 8, 24, 28, 112, 117, 585, ؟

1170	A
591	C
597	E
592	F
3510	B
590	D

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 591 — C

كيف أبدأ؟ إذا لم تجد فرقًا ثابتًا، افحص هل عمليتان تتناوبان.

- العمليات تتناوب بين الجمع والضرب: $3+, 3\times, 4+, 4\times, 5+, 5\times$.
- بعد آخر عملية ضرب نعود إلى الجمع، ورقم الجمع التالي $6 = 1 + 5$.
- الحد التالي $591 = 6 + 585$.

الطريقة السريعة: حدد هل الدور التالي جمع أم ضرب، ثم استخدم الرقم التالي في السلسلة.

تذكّر: التناوب قد يكون مع أرقام تزداد تدريجيًا في كل مرة.

اليوم الذي يأتي بعد 3 أيام من غد هو الخميس. فما اليوم الحالي؟

الخميس	A
الأربعاء	C
الثلاثاء	E
الأحد	B
الجمعة	D
السبت	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: B — الأحد

كيف أبدأ؟ حوّل العبارة المركبة إلى إراحة واحدة من اليوم الحالي.

- «غد» إراحة قدرها 1، ثم 3 أيام إضافية.
- الإراحة الصافية $4 = 3 + 1$.
- نرجع 4 أيام من الخميس فنصل إلى الأحد.

الطريقة السريعة: ارجع 4 أيام من اليوم المذكور.

تذكّر: غد تساوي $+1$ ، فاجمعها مع بقية الأيام قبل التحرك.

فريق ينجز عملاً في 18 يومًا. بعد تدريب ارتفعت كفاءة الفريق بنسبة 20% مع بقاء عدد العمال نفسه. كم يومًا يحتاج للعمل نفسه؟

A 14 يومًا	B 3 أيام
C 12.5 يومًا	D 13 يومًا
E 14.4 يومًا	F 15 يومًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 15 — F يومًا

كيف أبدأ؟ الكفاءة والزمن علاقة عكسية للعمل نفسه.

- معامل الكفاءة $= 1 + 20 \div 100 = 1.2$.
- الزمن يتغير عكسيًا مع الكفاءة.
- الزمن الجديد بالأيام $= 18 \div 1.2 = 15$.

الطريقة السريعة: اقسم الزمن القديم على معامل زيادة الكفاءة.

تذكّر: زيادة الكفاءة لا تعني طرح النسبة نفسها من الزمن.

ثُمن العدد 480 ثم كسّر منه يساوي 20. فما الكسر المجهول؟

A الثمن	B الخمس
C الربع	D الثلث
E النصف	F السدس

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — الثلث

كيف أبدأ؟ طُبّق الكسور المعلومة أولاً، ثم قارن الناتج بالقيمة النهائية.

- حاصل ضرب مقامات الكسور المعلومة $= 8 = 8$.
- ثُمن من العدد 480 هو $480 \div 8 = 60$.
- بقي أن تنتقل من 60 إلى 20.
- $480 \div 20 = 3$ ، إذن الكسر المجهول هو الثلث.

الطريقة السريعة: $480 \div 20 = 3$.

تذكّر: الكسر المجهول هو نسبة الناتج قبله إلى الناتج بعده.

راشد أسرع من نورة. نورة أسرع من ناصر. راشد أسرع من سارة. راشد أسرع من ليان. أي عبارة مؤكدة؟

A ناصر أسرع من راشد	B ليان أسرع من راشد
C ليان أسرع من سارة	D راشد أسرع من ناصر
E نورة أسرع من راشد	F سارة أسرع من نورة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — راشد أسرع من ناصر

كيف أبدأ؟ ابحث عن عبارة يمكن إثباتها بسلسلة واضحة.

1. نتتبع مسارًا من راشد إلى ناصر عبر العلاقات المعطاة.
2. هذا المسار قائم في كل ترتيب متوافق مع الجمل، إذن العبارة مؤكدة.
3. بقية العبارات إما تخالف علاقة منصوصة أو تحتاج افتراضًا غير موجود.

الطريقة السريعة: اتبع أقصر سلسلة تثبت العبارة.

تذكر: لا تفترض علاقة لم يثبتها النص.

النسبة أ : ب = 2 : 5، والنسبة ب : ج = 3 : 3. إذا كان أ + ج = 84، فما قيمة ب؟

A 144	B 228
C 56	D 120
E 84	F 60

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — 60

كيف أبدأ؟ وُجد قيمة الحد المشترك ب أولاً.

1. نضرب النسبة الأولى في 3 والثانية في 5 ليتساوى حد ب: $6 = 3 \times 2$ ، و $15 = 3 \times 5$ ، و $15 = 5 \times 3$.
2. إذن أ : ب : ج = 6 : 15 : 15.
3. أ + ج = 6 + 15 = 21.
4. قيمة الجزء الواحد = $84 \div 21 = 4$.
5. ب = $4 \times 15 = 60$.

الطريقة السريعة: وُجد ب، ثم حوّل المجموع المعطى إلى قيمة جزء.

تذكر: في نسبتين لهما حد مشترك، لا تجمعهما قبل توحيد الحد المشترك.

سارة أكبر من مريم بـ 6 سنوات. بعد سنتين سيكون مجموع عمريهما 32 سنة. كم عمر سارة الآن؟

A 6 سنوات	B 16 سنة
C 17 سنة	D 18 سنة
E 19 سنة	F 11 سنة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 17 — C سنة

كيف أبدأ؟ ارجع أولاً من المجموع المستقبلي إلى المجموع الحالي.

- بعد سنتين يزيد مجموع العمرين بمقدار $2 \times 2 = 4$.
- المجموع الآن $32 - 4 = 28$.
- عمر الأكبر $(28 + 6) \div 2 = 17$.

الطريقة السريعة: اطرح 4 من المجموع ثم استخدم قاعدة المجموع والفرق.

تذكّر: فرق العمر ثابت، لكن مجموع العمرين يزيد سنتين كل سنة زمنية.

قطعت سيارة نصف المسافة بسرعة 80 كم/ساعة، والنصف الآخر بسرعة 30 كم/ساعة. إذا استغرقت الرحلة كاملة 11 ساعة، فما المسافة الكلية؟

A 1210 كيلومتراً	B 480 كيلومتراً
C 540 كيلومتراً	D 420 كيلومتراً
E 880 كيلومتراً	F 605 كيلومتراً

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 480 — B كيلومتراً

كيف أبدأ؟ انتبه: النصفان متساويان في المسافة لا في الزمن.

- نفرض نصف المسافة = ن، فزمن النصف الأول $= ن \div 80$ وزمن النصف الثاني $= ن \div 30$ ، ومجموعهما 11.
- بضرب طرفي المعادلة في $80 \times 30 = 2400$: $ن \times (80 + 30) = 2400 \times 11$.
- نحسب الطرفين: $80 + 30 = 110$ ، و $26400 = 2400 \times 11$.
- $240 = 110 \div 26400$.
- المسافة الكلية $= 240 + 240 = 480$.

الطريقة السريعة: قسّم الزمن بنسبة عكس السرعتين.

تذكّر: عند تساوي المسافتين، الجزء الأطول يستغرق زمناً أطول.

تنتج كل آلة من 4 آلات 25 قطعة/ساعة. عملت الآلات كلها 5 ساعات، ثم توقفت آلتان وعملت البقية 4 ساعات إضافية. كم قطعة أنتجت؟

A 650 قطعة	B 700 قطعة
C 200 قطعة	D 450 قطعة
E 600 قطعة	F 500 قطعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 700 — B قطعة

كيف أبدأ؟ قسّم الزمن إلى مرحلتين قبل وبعد التوقف.

1. إنتاج المرحلة الأولى $= 5 \times 25 \times 4 = 500$.
2. عدد الآلات العاملة بعد التوقف $= 2 - 4 = 2$.
3. إنتاج المرحلة الثانية $= 2 \times 25 \times 4 = 200$.
4. الإجمالي $= 200 + 500 = 700$.

الطريقة السريعة: إنتاج المرحلة الأولى + إنتاج المرحلة الثانية.
تذكّر: عندما يتغير عدد الآلات، احسب كل فترة منفصلة.

تنجز آلة 320 وحدة خلال 8 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 25%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 1000 وحدة؟

A 8 دقائق	B 18 دقيقة
C 25 دقيقة	D 10 دقائق
E 20 دقيقة	F 16 دقيقة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20 — E دقيقة

كيف أبدأ؟ استخرج المعدل، عدّله، ثم استخدم الهدف الجديد.

1. المعدل الأصلي في الدقيقة $= 320 \div 8 = 40$.
2. معامل التطوير $= 1 + 25 \div 100 = 1.25$.
3. المعدل الجديد في الدقيقة $= 40 \times 1.25 = 50$.
4. الزمن المطلوب بالدقائق $= 1000 \div 50 = 20$.

الطريقة السريعة: الهدف ÷ المعدل الجديد.
تذكّر: إذا زاد المعدل، الزمن المطلوب لهدف ثابت ينخفض.

تكلف 3 وحدات مبلغ 24 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 10 وحدات وأضيف رسم ثابت قدره 5 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

12.2 درهماً A	29 درهماً B
75 درهماً C	8 دراهم D
85 درهماً E	80 درهماً F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 85 — E درهماً

كيف أبدأ؟ افصل التكلفة المتناسبة عن الرسم الثابت.

1. سعر الوحدة الواحدة بالدرهم $8 = 3 \div 24$.

2. سعر 10 وحدات $80 = 10 \times 8$.

3. نصف الرسم الثابت مرة واحدة: $85 = 5 + 80$.

الطريقة السريعة: سعر الوحدات + الرسم الثابت.

تذكر: الرسم الثابت لا يتكرر مع كل وحدة ما لم يذكر السؤال ذلك.

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل كامل في 10 أيام. عملوا 3 أيام، ثم انضم إليهم عاملان. كم يومًا إضافيًا يحتاج العدد الجديد لإكمال العمل؟

8 أيام A	10 أيام B
84 يومًا C	9 أيام D
6 أيام E	7 أيام F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 6 — E أيام

كيف أبدأ؟ احسب العمل الكامل ثم المنجز ثم المتبقي.

1. العمل الكامل بوحدة عامل-يوم $120 = 10 \times 12$.

2. المنجز $36 = 3 \times 12$.

3. المتبقي $84 = 120 - 36$.

4. عدد العمال الجديد $14 = 2 + 12$.

5. الأيام الإضافية $6 = 14 \div 84$.

الطريقة السريعة: المتبقي $\div$ عدد العمال الجديد.

تذكر: عند تغير عدد العمال أثناء العمل، لا تطبق العدد الجديد على العمل الكامل.

في مجموعة عددها 240، غاب 40% منهم، ثم غادر 25% من الموجودين بعد ذلك. كم بقي؟

133 A	240 B
108 C	180 D
132 E	144 F

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 108 — C

كيف أبدأ؟ طَبِّق المرحلة الأولى ثم احسب المرحلة الثانية من العدد الجديد.

1. الباقي بعد الغياب الأول $= 240 - (100 - 40) \times 240 = 144$.

2. من غادر بعد ذلك $= 144 \times 25 = 36$.

3. المتبقي $= 144 - 36 = 108$.

الطريقة السريعة: احسب الباقي بعد كل مرحلة على حدة.

تذكّر: انتبه لعبارات مثل «من الموجودين» أو «من الباقي».