

2. बहुपद

बहुपद क्या है?

चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है।

उदाहरण

$x^2 + 2x + 1$, एक बहुपद बीजगणितीय व्यंजक है।

- $2x^5 + 4xy^3 + 6x^2$
- $4y^3 + y^2 + yz$
- $3x + x^2 - x^4$
- $5x^6y + 6px^2yx^2 - 8ax$

घात n वाले एक चर x वाले बहुपद को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है।

$$P(x) = anx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

जहाँ $a_n \neq 0$ और $a_n, a_{n-1}, a_1, a_0 = \text{अचर}$


बहुपद का घात

पदों के घातों में से महत्तम को बहुपद का घात (डिग्री) कहते हैं। यदि एक से अधिक चर राशियाँ हों, तो विभिन्न पदों में चर राशियों के घातों के योगफलों में से महत्तम को बहुपद का घात कहते हैं।

उदाहरण

$2y^2 - 3y + 4$, बहुपद बीजगणितीय व्यंजक में चर y की अधिकतम घात 2 है इसलिए बहुपद का घात 2 है।

रैखिक बहुपद



घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए, $2x - 3$, $\sqrt{3}x + 5$, $y + \sqrt{2}$ आदि।

द्विघात बहुपद

घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है 'वर्ग'।

उदाहरण के लिए $2x^2 + 3x - 2/5$, $y^2 - 2$ आदि।

अधिक व्यापक रूप में, x में कोई द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याये हैं और $a \neq 0$ है, के प्रकार का होता है।

त्रिघात बहुपद


घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण निम्न हैं:

$2 - x^3$, x^3 , $x^3 - x^2 + 3$ आदि

वास्तव में, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है: $ax^3 + bx^2 + cx + d$, जहाँ a, b, c, d वास्तविक संख्याये हैं और $a \neq 0$ है।

बीजीय बहुपद (Algebraic Polynomial)

चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे बीजीय बहुपद कहा जाता है।



जैसे :-

- $x + 2$
- $x + 6$
- $y - 4$
- $64 + a$

बीजीय बहुपद दो प्रकार के होते हैं।

1. अचर बहुपद

बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है वह अचर बहुपद कहलाता है।

जैसे :-

- $4x + 5$,
- $2x - 2$,
- $8y - 5$,
- 2 और 5 अचर बहुपद है क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर रहता है।

Note :-

- अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं।
- अचर बहुपद का घात शून्य होता है।

2. चर बहुपद

बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वह चर बहुपद कहलाता है।

जैसे :-

- $x^2 + 4x + 2$
- $2x^2 + 4x + 8$

Note :-

- चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है।

बहुपद का शून्यक

एक वास्तविक संख्या k बहुपद $p(x)$ का शून्यक कहलाती है, यदि $P(k) = 0$ है।

व्यापक रूप में यदि $p(x) = ax + b$ का एक शून्यक k है तो $p(k) = ak + b = 0$, अर्थात् $k = -b/a$ होगा। अतः रैखिक बहुपद $ax + b$ का शून्यक $-b/a = -(\text{आचार पद})/x$ का गुणांक है।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. घातों 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं।
2. एक द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$ जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएँ हैं और $a \neq 0$ है, के रूप का होता है।
3. एक बहुपद $p(x)$ के शून्यक उन बिंदुओं के x -निर्देशांक होते हैं जहाँ $y = p(x)$ का ग्राफ x -अक्ष को प्रतिच्छेद करता है।

किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध

किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध को एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।

इसके लिए एक द्विघात बहुपद माना $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ लीजिए। यहाँ हमें मध्य पद “ $- 8x$ ” को दो ऐसे पदों के योग के रूप में विभक्त करना है जिनका गुणनफल $6x \times 2x = 12x^2$ हो।

अतः, हम इसको लिख सकते हैं:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 8x + 6 &= 2x^2 - 2x - 6x + 6 \\ &= 2x(x - 1) - 6(x - 1) = (x - 1)(x - 3) \end{aligned}$$

$$= 2(x - 1)(x - 3)$$

इसलिए, $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ का मान $x = 1$ और $x = 3$ के लिए शून्य होगा।

अतः कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ के शून्यंक 1 और 3 हैं।

शून्यकों का योग

$$= 1 + 3 = 4 = -(-8)/2$$

$$= -(x \text{ का गुणांक})/(x^2 \text{ का गुणांक})$$

शून्यकों का गुणनफल

$$\text{शून्यकों का गुणनफल} = 1 \times 3 = 3 = 6/2 = (\text{अचर पद})/(x^2 \text{ का गुणांक})$$

व्यापक रूप में यदि α, β द्विघात बहुपद $p(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ के शून्यक हों तो इसके अनुसार $x - \alpha$ और $x - \beta$, $p(x)$ के गुणनखण्ड होंगे।

अतः $ax^2 + bx + c = k(x - \alpha)(x - \beta)$, जहाँ k अचर है।

$$= k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta]$$

$$= kx^2 - k(\alpha + \beta)x + k\alpha\beta$$

दोनों ओर के x^2 , x के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, हम पाते हैं:

$$a = k, b = -k(\alpha + \beta) \text{ और } c = k\alpha\beta$$

इससे प्राप्त होता है $\alpha + \beta = -b/a$

और $\alpha\beta = c/a$

अर्थात् शून्यको का योग $\alpha + \beta = -b/a = -(x \text{ का गुणांक})/(x^2 \text{ का गुणांक})$

शून्यकों का गुणनफल $\alpha\beta = c/a = (\text{अचर पद})/(x^2 \text{ का गुणांक})$

शून्यको के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद ज्ञात करना

इस विधि को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं:

उदाहरण

एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं।

हल:

माना द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$ है और इसके शून्यक α, β हैं।

$$\text{हम पाते हैं } \alpha + \beta = -b/a = -3$$

$$\alpha\beta = c/a = 2$$

यदि $a = 1$ है तो $b = 3$ और $c = 2$ होगा।

अतः, एक द्विघात बहुपद, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, $x^2 + 3x + 2$ है।

1. एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं।

2. यदि α, β द्विघात बहुपद $p(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ के शून्यक हों तो

$$\alpha + \beta = -b/a$$

$$\text{और } \alpha\beta = c/a$$

बहुपदों का जोड़

जब हम दो या दो से अधिक बहुपदों को जोड़ते हैं तो केवल समान पद जोड़े जाते हैं इसका अर्थ है कि समान चर और समान घात वाले पद जोड़े जाते हैं। असमान पदों को नहीं जोड़ा जाएगा, वो अपरिवर्तित रहेंगे। जोड़ में, परिणामी बहुपद की घात समान रहती है।

Q.1 बहुपद $5x^2 + 4x + 2$ और $8x^2 + 2x + 5$ को जोड़िए?

$$\text{हल:- } 5x^2 + 4x + 2 + 8x^2 + 2x + 5$$

$$(5x^2 + 8x^2) + (4x + 2x) + (2 + 5)$$

$$13x^2 + 6x + 7$$

$$\text{Ans. } 13x^2 + 6x + 7$$

Q.2 बहुपद $3a^2 + 5ab + 2$ और $7a^2 + 6 + 9ab$ को जोड़िए?

$$\text{हल:- } 3a^2 + 5ab + 2 + 7a^2 + 6 + 9ab$$

$$(3a^2 + 7a^2) + (5ab + 9ab) + (2 + 6)$$

$$10a^2 + 14ab + 8$$

$$\text{Ans. } 10a^2 + 14ab + 8$$

Q.3 बहुपद $3ab^3 + 6xy^4 + 4x^2$ और $8x^2 + 12ab^3 + 2xy^4$ को जोड़िए?

$$\text{हल:- } 3ab^3 + 6xy^4 + 4x^2 + 8x^2 + 12ab^3 + 2xy^4$$

$$(6xy^4 + 2xy^4) + (3ab^3 + 12ab^3) + (4x^2 + 8x^2)$$

$$8xy^4 + 15ab^3 + 12x^2$$

$$\text{Ans. } 8xy^4 + 15ab^3 + 12x^2$$

Q.4 बहुपदो $4x^2 + 8xy + 5y^2$ और $8y^2 - 3xy + 3x^2$ को जोड़िए

$$\text{हल:- } 4x^2 + 8xy + 5y^2 + 8y^2 - 3xy + 3x^2$$

$$(4x^2 + 3x^2) + (8xy - 3xy) + (6y^2 + 8y^2)$$

$$7x^2 + 5xy + 14y^2$$

$$\text{Ans. } 7x^2 + 5xy + 14y^2$$

बहुपदों का घटाना

बहुपदों का घटाव बहुपदों के योग के समान ही होता है। इसमें समान पदों को घटाया जाता है और असमान पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें भी परिणामी बहुपद की घात वही रहेगी।

Q.1 बहुपद $5xy + 8xy^2 + 6x^2y + 8y^3$ को $3xy + 2xy^2 + x^2y + 2Y^3$ में से घटाएं।

$$\text{हल:- } (5xy + 8xy^2 + 6x^2y + 8y^3) - (3xy + 2xy^2 + x^2y + 2Y^3)$$

$$(8y^3 - 2Y^3) + (6x^2y - x^2y) + (8xy^2 - 2xy^2) + (5xy - 3xy)$$

$$5y^3 + 5x^2y + 6xy^2 + 2xy$$

$$\text{Ans. } 5y^3 + 5x^2y + 6xy^2 + 2xy$$

बहुपदों का गुणा

जब दो या दो से अधिक बहुपदों को गुणा किया जाता है तो परिणाम हमेशा उच्च घात वाला बहुपद होता है। लेकिन दो बहुपदों में, यदि एक या दोनों बहुपद अचर बहुपद हों तो घात वही रहेगी। बहुपदों के गुणा में, समान चरों की घातों को घातांक के नियमों द्वारा जोड़ा जाता है।

Q.1 बहुपद $2x \times 4y$ का गुणा कीजिए?

हल:- $2x \times 4y$

$$= (2 \times 4) \times (x \times y)$$

$$= 8xy$$

Ans. $8xy$

Q.2 बहुपद $5a \times 8b$ का गुणा कीजिए?

हल:- $5a \times 8b$

$$= (5 \times 8) \times (a \times b)$$

$$= 40ab$$

Ans. $40ab$

Q.1 बहुपद $7t \times 2s \times 3r$ का गुणा कीजिए?

हल:- $5a \times 2b \times 7c$

$$= (5 \times 2 \times 7) \times (a \times b \times c)$$

$$= 70 abc$$

Ans. $70 abc$

Q.4 बहुपद $3p^2q^2 \times 12p^3q^3$ का गुणा कीजिए?

हल:- $3p^2q^2 \times 12p^3q^3$

$$(3 \times 12) \times (p^2 \times p^3 \times q^2 \times q^3)$$

$$= 36 p^5 q^5$$

Ans. $36 p^5 q^5$

बहुपदों का भाग

बहुपद के विभाजन में, परिणाम कम घात वाला बहुपद होता है और यदि बहुपदों में से एक अचर बहुपद है तो घात वही रहेगी।

Q.1 बहुपद $6a^2 \div 3a$ से भाग कीजिए?

हल:- $6a^2 \div 3a$

$$3 \times 2 \times a \times a / 3 \times a$$

$$2a$$

Ans. $2a$

Q.2 बहुपद $(2xy + 6x) \div 2x$ से भाग दीजिए?

हल:- $(2xy + 6x) \div 2x$

$$= (2xy + 6x)/2x$$

$$= 2x(y + 3)/2x$$

$$= y + 3$$

Ans. $y + 3$

त्रिघात बहुपद के शून्यक

यदि किसी त्रिघात बहुपद $ax^3 + bx^2 + cx + d$ के शून्यक α, β, γ हों तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि

$$\alpha + \beta + \gamma = -b/a$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = c/a$$

$$\text{और } \alpha\beta\gamma = -d/a$$

त्रिघात बहुपद का उदाहरण

जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद $p(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$, के शून्यक 3, -1 और $-1/3$ हैं। इसके पश्चात् शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए।

उदाहरण का हल

दिए हुए बहुपद कि तुलना $ax^3 + bx^2 + cx + d$ से करने पर हम पाते हैं कि

$$a = 3, b = -5, c = -11, d = -3$$

एक-एक करके शून्यकों के मान रखने पर

$$p(3) = 3 \times 3^3 - (5 \times 3^2) - (11 \times 3) - 3 = 81 - 45 - 33 - 3 = 0$$

$$p(-1) = 3 \times (-1)^3 - 5 \times (-1)^2 - 11 \times (-1) - 3 = -3 - 5 + 11 - 3 = 0$$

$$p(-1/3) = 3 \times (-1/3)^3 - 5 \times (-1/3)^2 - 11 \times (-1/3) - 3 = -1/9 + 5/9 + 11/3 - 3 = -2/3 + 2/3 = 0$$

अतः $3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ के शून्यक 3, -1 और $-1/3$ हैं।

इसलिए हम $\alpha = 3, \beta = -1$ और $\gamma = -1/3$ लेते हैं अब

$$\alpha + \beta + \gamma = 3 + (-1) + (-1/3) = 2 - 1/3 = 5/3 = -b/a$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 3 \times (-1) + (-1) \times (-1/3) + (-1/3) \times 3 = -3 + 1/3 - 1 = -4 + 1/3 = -11/3 = c/a$$

$$\text{और } \alpha\beta\gamma = 3 \times (-1) \times (-1/3) = 1 = -(-3)/3 = -d/a \text{ है।}$$

स्मरणीय तथ्य

यदि α, β, γ त्रिघात बहुपद $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ के शून्यक हों तो

बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म

आप जानते हैं कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं। परंतु, यदि आपको केवल एक शून्यक दिया हो, तो क्या आप अन्य दो शून्यक ज्ञात कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, त्रिघात बहुपद $x^3 - 3x^2 - x + 3$ को लेते हैं। माना इसका एक शून्यक 1 है तो $x^3 - 3x^2 - x + 3$ का एक गुणनखंड $x - 1$ है। इसलिए $x^3 - 3x^2 - x + 3$ को $x - 1$ से भाग देकर $x^2 - 2x - 3$ प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्राप्त द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए मध्य भाग को विभक्त करके किया जा सकता है।

$$x^2 - 2x - 3 = x^2 - 3x + x - 3$$

$$= x(x - 3) + 1(x - 3) = (x - 3)(x + 1)$$

इसलिए, त्रिघात बहुपद के सभी शून्यक 1, -1 और 3 हैं।

बहुपद को भाग देने की एल्गोरिथ्म (कलन विधि)

एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के एल्गोरिथ्म (कलन विधि) के विधिवत चरण निम्न प्रकार से हैं।
इसको समझाने के लिए एक उदाहरण पर विचार करते हैं।

यदि $p(x)$ और $g(x)$ कोई दो बहुपद हैं जहाँ $g(x) \neq 0$ हो तो हम बहुपद $q(x)$ और $r(x)$ ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि

$$p(x) = g(x) \times q(x) + r(x)$$

यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है।

उदाहरण

$2x^2 + 3x + 1$ को $x + 2$ से भाग दीजिये।

हल:

ध्यान दीजिए कि जब शेषफल या तो शून्य हो जाए या इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए, तो हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं।

भाजक	भाज्य	भागफल	शेषफल
$x + 2$	$2x^2 + 3x + 1$	$2x - 1$	3

$$\text{भाज्य} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल}$$

$$2x^2 + 3x + 1 = (x + 2) \times (2x - 1) + 3$$

याद रखने योग्य बातें


1. यह प्रक्रिया किसी बहुपद को एक द्विघात बहुपद से भाग देने के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है।
2. विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार दिए गए बहुपद $p(x)$ और शून्येतर बहुपद $g(x)$ के लिए दो ऐसे बहुपदों $q(x)$ तथा $r(x)$ का अस्तित्व है कि

$$p(x) = g(x) \times q(x) + r(x)$$

जहाँ, $r(x) = 0$ है या घात $r(x) < \text{घात } g(x)$ है।


NCERT SOLUTIONS
प्रश्नावली 2.1 (पृष्ठ संख्या 31)

प्रश्न 1 किसी बहुपद $p(x)$ के लिए, $y = p(x)$ का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में, $p(x)$ के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए:




उत्तर-


(i) $p(x)$ के शून्यकों की संख्या = 0 (क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को नहीं काटती है)




(ii) $p(x)$ के शून्यकों की संख्या = 1 (क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 1 बार काटती है)




(iii) $p(x)$ के शून्यकों की संख्या = 3




(iv) $p(x)$ के शून्यकों की संख्या = 2



(v) $p(x)$ के शून्यकों की संख्या = 4



(vi) $p(x)$ के शून्यकों की संख्या = 3



प्रश्नावली 2.2 (पृष्ठ संख्या 36)

प्रश्न 1 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए:

- (i) $x^2 - 2x - 8$
- (ii) $4s^2 - 4s + 1$
- (iii) $6x^2 - 3 - 7x$
- (iv) $4u^2 + 8u$
- (v) $t^2 - 15$
- (vi) $3x^2 - x - 4$

उत्तर-

(i) गुणनखंड विधि से:

$$x^2 - 2x - 8$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 2x - 8 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 4) + 2(x - 4)$$

$$\Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$$

$$\Rightarrow x - 4 = 0, x + 2 = 0$$

$$\Rightarrow x = 4, x = -2$$

$$\text{शून्यक; } \alpha = 4, \beta = -2$$

शून्यको तथा गुणांक के बिच संबंध की सत्यता की जाँच:

$$a = 1, b = -2 \text{ और } c = -8$$

$$\text{शून्यको का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a}$$

$$[4 + (-2)] = \frac{-(-2)}{1}$$

$$2 = 2 \dots (i)$$

$$\text{शून्यको का गुणनखंड } (\alpha\beta) = \frac{c}{a}$$

$$[4 + (-2)] = \frac{(-8)}{1}$$

$$-8 = -8 \dots (ii)$$

दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है।

(ii) गुणनखंड विधि से:

$$4s^2 - 4s + 1$$

$$\Rightarrow 4s^2 - 2s - 2s + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2s(2s - 1) - 1(2s - 1) = 0$$

$$\Rightarrow (2s - 1)(2s - 1) = 0$$

$$\Rightarrow 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2s = 1, 2s = 1$$

$$\Rightarrow s = \frac{1}{2}, s = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \alpha = \frac{1}{2} \text{ और } \beta = \frac{1}{2}$$

गुणांक $a = 4$, $b = -4$ और $c =$

शून्यको तथा गुणांकों के बिच सम्बन्ध की सत्यता की जाँच:

$$\text{शून्यको का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{-(-4)}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1+1}{2} = \frac{4}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{2} = \frac{4}{4}$$

$$\Rightarrow 1 = 1 \dots (i)$$

$$\text{शून्यको का गुणनफल } (\alpha\beta) = \frac{c}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \dots (ii)$$

अतः दोनों (i) और (ii) स्थितियों म संबंध सत्य है।

$$(iii) 6x^2 - 3 - 7x = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 7x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 9x + 2x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 3x(2x - 3) + 1(2x - 3) = 0$$

$$\Rightarrow (2x - 3)(3x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2x = 3, 3x = -1$$

$$\Rightarrow x = \frac{3}{2}, x = \frac{-1}{3}$$

$$\text{अतः } \alpha = \frac{3}{2} \text{ और } \beta = \frac{-1}{3}$$

$$\text{गुणांक } a = 6, b = -7 \text{ और } c = -3$$

शून्यांको तथा गुणांकों के बिच सम्बन्ध की सत्यता की जाँच:

$$\text{शून्यांको का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{3}{2} + \frac{-1}{3} \right) = \frac{-(-7)}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{9-2}{6} = \frac{7}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{6} = \frac{7}{6} \dots (i)$$

$$\text{शून्यांको का गुणनफल } (\alpha\beta) = \frac{-c}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \times \frac{-1}{3} = \frac{-3}{6}$$

$$(iv) 4u^2 + 8u = 0$$

$$4u(u + 2) = 0$$

$$4u = 0, \text{ और } u + 2 = 0$$

$$u = 0, u = -2$$

$$\text{अतः } a = 0 \text{ और } b = -2$$

$$\text{गुणांक } a = 4, b = 8 \text{ और } c = 0$$

शून्यांको तथा गुणांकों के बिच सम्बन्ध की सत्यता की जाँच;

$$\text{शून्यांको का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a}$$

$$\Rightarrow 0 + (-2) = \frac{-8}{4}$$

$$\Rightarrow -2 = -2 \dots (i)$$

$$\text{शून्यांको का गुणनफल } (\alpha\beta) = \frac{0}{4}$$

$$\Rightarrow 0 \times -2 = \frac{0}{4}$$

$$\Rightarrow 0 = 0 \dots (ii)$$

अतः दोनों (i) और (ii) स्थितियों में सम्बन्ध सत्य है।

(v)

$$t^2 - 15 = 0$$

$$\Rightarrow t^2 = 15$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{15} = \pm\sqrt{15}$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{15}, t = -\sqrt{15}$$

$$\text{अतः } \alpha = \sqrt{15} \text{ और } \beta = -\sqrt{15}$$

$$\text{गुणांक } a = 1, b = 0, \text{ और } c = -15$$

शून्यांको तथा गुणांकों के बिच संबंध की सत्यता की जाँच:

$$\text{शून्यको का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a}$$

$$\Rightarrow \sqrt{15} + (-\sqrt{15}) = \frac{-(0)}{1}$$

$$\Rightarrow 0 = 0 \dots (i)$$

$$\text{शून्यांको का गुणनफल } (\alpha\beta) = \frac{c}{a}$$

$$\Rightarrow \sqrt{15}(-\sqrt{15}) = \frac{-15}{1}$$

$$\Rightarrow -15 = -15 \dots (ii)$$

अतः दोनों (i) और (ii) स्थितियों सम्बन्ध सत्य है।

$$(vi) \Rightarrow 3x^2 - 4x + 3x - 4 = 0$$

$$\Rightarrow x(3x - 4) + 1(3x - 4) = 0$$

$$\Rightarrow (3x - 4)(x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow (3x - 4) = 0, \text{ और } (x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{4}{3}, \text{ और } x = -1$$

$$\text{अतः } \alpha = \frac{4}{3} \text{ और } \beta = -1$$

$$\text{गुणांक } a = 3, b = -1 \text{ और } c = -1$$

शून्यांको तथा गुणांकों के बिच सम्बन्ध की सत्यता की जाँच:

$$\text{शून्यांको का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} + (-1) = \frac{-(-1)}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{4-3}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \dots (i)$$

$$\text{शून्यांको का गुणनफल } (\alpha\beta) = \frac{c}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} \times (-1) = \frac{(-4)}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{-4}{3} = \frac{-4}{3} \dots (2)$$

अतः दोनों (i) और (ii) स्थितियों में संबंध सत्य है।

प्रश्न 2 एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं:

(i) $\frac{1}{4}, -1$

(ii) $\sqrt{2}, \frac{1}{3}$

(iii) $0, \sqrt{5}$

(iv) $1, 1$

(v) $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$

(vi) $4, 1$

उत्तर-

(i)

दिया है: $\alpha + \beta = \frac{1}{4}, \alpha\beta = -1$

चूँकि $ax^2 + bx + c = kx^2 - k(\alpha + \beta)x + k\alpha\beta$

तुलना करने पर,

$a = k, b = -k(\alpha + \beta)$ और $c = k\alpha\beta$

$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{1}{4}$ और $\alpha\beta = \frac{c}{a} = -1$

$\Rightarrow a = 4$

$\Rightarrow b = -4(\alpha + \beta)$

$\Rightarrow c = k\alpha\beta = 4(-1)$

अतः $ax^2 + bx + c$ के रूप में लिखने पर,

$\Rightarrow 4x^2 - 4(\alpha + \beta)x + 4(\alpha\beta)$

$4x^2 - 4\left(\frac{1}{4}\right)x + 4(-1)$

$\Rightarrow 4x^2 - x - 4$

द्विघात बहुपद है: $4x^2 - x - 4$

(ii)

दूसरी विधि से:

दिया है: $\alpha + \beta = \sqrt{2}, \alpha\beta = \frac{1}{3}$

चूँकि $ax^2 + bx + c = kx^2 - k(\alpha + \beta)x + k\alpha\beta$

या $ax^2 + bx + c = k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta]$

या $\frac{ax^2+bx+c}{k} = \left(x^2 - \sqrt{2}x + \frac{1}{3} \right)$

या $\frac{ax^2+bx+\text{c}}{k} = \frac{3x^2-3\sqrt{2}x+1}{3}$

यहाँ k एक अचर पद है, तुलना करने पर $k = 3$

अतः $ax^2 + bx + c = 3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1$

द्विघात बहुपद है: $3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1$

(iii)

दिया है: $\alpha + \beta = 0, \alpha\beta = \sqrt{5}$

चूँकि $ax^2 + bx + c = k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta]$

या $\frac{ax^2+bx+c}{k} = \frac{x^2+\sqrt{5}}{1}$

यहाँ k एक अचर पद है, तुलना करने पर $k = 1$

अतः $ax^2 + bx + c = x^2 + \sqrt{5}$

द्विघात बहुपद है: $x^2 + \sqrt{5}$

(iv)

दिया है: $\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = 1$

चूँकि $ax^2 + bx + c = k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta]$

$$\text{या } \frac{ax^2+bx+c}{c} = \frac{x^2-x+1}{1}$$

यहाँ k अचर पद है, तुलना करने पर, $k = 1$

$$\text{अतः } ax^2 + bx + c = x^2 - x + 1$$

द्विघात बहुपद है: $x^2 - x + 1$

(v)

दिया है: $\alpha = \beta = -\frac{1}{4}, \alpha\beta = \frac{1}{4}$

चूँकि $ax^2 + bx + c = k[x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta]$

$$\text{या } \frac{ax^2+bx+c}{k} = \frac{4x^2+x+1}{4}$$

यहाँ k एक अचर पद है, तुलना करने पर $k = 4$

$$\text{अतः } ax^2 + bx + c = 4x^2 + 4x + 1$$

द्विघात बहुपद है: $4x^2 + 4x + 1$

(vi)

तीसरी विधि:

दिया है: $\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 1$

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{4}{1} \text{ और } \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{4}{1}$$

तुलना करने पर, $a = 1, b = -4$ और $c = 4$

अतः $ax^2 + bx + c$ में मान रखने पर

$$ax^2 + bx + c = (1)x^2 = (-4)x + 4$$

$$= x^2 - 4x + 4$$

अतः द्विघात बहुपद है: $x^2 - 4x + 4$

प्रश्नावली 2.3 (पृष्ठ संख्या 39-40)

प्रश्न 1 विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, निम्न में $p(x)$ को $g(x)$ से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए:

(i) $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3, g(x) = x^2 - 2$

(ii) $p(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + 5, g(x) = x^2 + 1 - x$

(iii) $p(x) = x^4 - 5x + 6, g(x) = 2 - x^2$

उत्तर-

(i) $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3, g(x) = x^2 - 2$

$$\begin{array}{r} \overline{X - 3} \\ x^2 - 2 \overline{) x^3 - 3x^2 + 5x - 3} \\ \underline{(-y)^3 \quad (+)^{2x}} \\ -3x^2 + 7x - 3 \\ \underline{-3x^2 \quad +6} \\ (+) \quad (-) \\ \underline{ 7x - 9} \end{array}$$

भागफल $q(x) = x - 3$ और शेषफल $= 7x - 9$ है।

(ii) $p(x) = x^4 - 3x^2 + 4x + 5$, $g(x) = x^2 + 1 - x$

$$\begin{array}{r}
 \overline{x^2 + x - 3} \\
 x^2 - x + 1 \overline{) x^4 } \\
 \underline{x^4 - x^3 + x^2} \\
 (-) (+) \\
 \overline{x^3 - 4x^2 + 4x + 5} \\
 \overline{x^3 - x^2 + x} \\
 (-) (+) \\
 \overline{-3x^2 + 3x + 5} \\
 \overline{-3x^2 + 3x - 5} \\
 (+) (-) (+) \\
 \overline{ 8} \\
 \overline{ 8}
 \end{array}$$

भागफल $q(x) = x^2 + x - 3$ और शेषफल $= 8$ है।

(iii) $p(x) = x^4 - 5x + 6$, $g(x) = 2 - x^2$

$$\begin{array}{r}
 \overline{-x^2 - 2} \\
 -x^2 + 2 \overline{) x^4 - 5x + 6} \\
 \underline{x^4 - 2x^2} \\
 (-) (+) \\
 \overline{2x^2 - 5x + 6} \\
 \overline{2x^2 - 4} \\
 (-) (+) \\
 \overline{ -5x + 10} \\
 \overline{ -5x + 10}
 \end{array}$$

भागफल $q(x) = -x^2 - 2$ और शेषफल $= -5x + 10$ है।

प्रश्न 2 पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का एक गुणनखंड है:

(i) $t^2 - 3$, $2t^4 + 3t^3 - 2t^2 - 9t - 12$

(ii) $x^2 + 3x + 1$, $3x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 2x + 2$

(iii) $x^3 - 3x + 1$, $x^5 - 4x^3 + x^2 + 3x + 1$

उत्तर-

(i) $t^2 - 3, 2t^4 + 3t^3 - 2t^2 - 9t - 12$

$$\begin{array}{r}
 2t^2 + 2t + 4 \\
 t^2 - 3 \overline{) 2t^4 + 3t^3 - 2t^2 - 9t - 12} \\
 \underline{2t^4 \quad \quad - 6t^2} \\
 (-) \quad \quad (+) \\
 3t^3 + 4t^2 - 9t - 12 \\
 \underline{3t^3 \quad \quad - 9t} \\
 (-) \quad \quad (+) \\
 4t^2 \quad \quad - 12 \\
 \underline{4t^2 \quad \quad - 12} \\
 (-) \quad \quad (+) \\
 \underline{\quad \quad \quad 0}
 \end{array}$$

चूँकि शेषफल $r(x) = 0$ है।

अतः $t^2 - 3, 2t^4 + 3t^3 - 2t^2 - 9t - 12$ का एक गुणनखंड है।

(ii) $x^2 + 3x + 1, 3x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 2x + 2$

$$\begin{array}{r}
 3x^2 - 4x + 2 \\
 x^2 + 3x + 1 \overline{) 3x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 2x + 2} \\
 \underline{3x^4 + 9x^3 + 3x^2} \\
 (-) \quad (-) \quad (-) \\
 - 4x^3 - 10x^2 + 2x + 2 \\
 \underline{- 4x^3 - 12x^2 - 4x} \\
 (+) \quad (+) \quad (+) \\
 2x^2 + 6x + 2 \\
 \underline{2x^2 + 6x + 2} \\
 (-) \quad (-) \quad (-) \\
 \underline{\quad \quad \quad 0}
 \end{array}$$

चूँकि शेषफल $r(x) = 0$ है।

अतः $x^2 + 3x + 1, 3x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 2x + 2$ का एक गुणनखंड है।

(iii) $x^3 - 3x + 1$, $x^5 - 4x^3 + x^2 + 3x + 1$

$$\begin{array}{r}
 x^2 - 1 \\
 x^3 - 3x + 1 \overline{) x^3 - 4x^3 + x^2 + 3x + 1} \\
 \underline{x^3 - 3x^2 + x^2} \\
 (-) \quad (+) \quad (-) \\
 \underline{-x^3 \quad + 3x + 1} \\
 -x^3 \quad + 3x - 1 \\
 (+) \quad (-) \quad (+) \\
 \underline{\hspace{1.5cm} 2}
 \end{array}$$

चूँकि शेषफल $r(x) = 2$ है।

अतः $x^3 - 3x + 1$, $x^5 - 4x^3 + x^2 + 3x + 1$ का एक गुणनखंड नहीं है।

प्रश्न 3 $3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5$ के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि इसके दो शून्यक $\sqrt{\frac{5}{3}}$ और $-\sqrt{\frac{5}{3}}$ है।

उत्तर-

दिया है: $p(x) = 3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5$

और दो शून्यक $\sqrt{\frac{5}{3}}$ और $-\sqrt{\frac{5}{3}}$ है।

या $x - \sqrt{\frac{5}{3}} = 0$, $x + \sqrt{\frac{5}{3}} = 0$

या $\left(x - \sqrt{\frac{5}{3}}\right)\left(x + \sqrt{\frac{5}{3}}\right) = 0$

या $x^2 - \left(\sqrt{\frac{5}{3}}\right)^2 = 0$

$$\text{या } x^2 - \frac{5}{3} = 0$$

$$\text{या } 3x^2 - 5 = 0$$

इसलिए, $3x^2 - 5 = 0$ $p(x)$ का एक गुणनखंड है।

अब $3x^2 - 5$ से $3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5$ में भाग देने पर

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 2x + 1 \\
 3x^2 - 5 \overline{) 3x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5} \\
 \underline{3x^4 - 5x^2} \\
 (-) (+) \\
 \hline
 6x^3 + 3x^2 - 10x - 5 \\
 6x^3 - 10x \\
 \underline{(-) (+)} \\
 3x^2 - 5 \\
 3x^2 - 5 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

$$\text{अतः } p(x) = (3x^2 - 5)(x^2 + 2x + 1)$$

अब, $x^2 + 2x + 1$ को गुणनखंड कर शून्यक ज्ञात करने पर

$$= x^2 + x + x + 1 = 0$$

$$= x(x + 1) + 1(x + 1) = 0$$

$$= (x + 1)(x + 1) = 0$$

$$\text{या } x + 1 = 0, x + 1 = 0$$

$$\text{या } x = -1, x = -1$$

अतः दो अन्य शून्यक -1 और -1 है।

प्रश्न 4 यदि $x^3 - 3x^2 + x + 2$ को एक बहुपद $g(x)$ से भाग देने पर, भागफल और शेषफल क्रमशः $x - 2$ और $-2x + 4$ हैं तो $g(x)$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर- दिया है : भाज्य $p(x) = x^3 - 3x^2 + x + 2$

भागफल $q(x) = x - 2$,

शेषफल $r(x) = -2x + 4$

भाजक $g(x) = ?$

भाज्य = भाजक \times भागफल + शेषफल

$$p(x) = g(x) \times q(x) + r(x)$$

$$x^3 - 3x^2 + x + 2 = g(x)(x - 2) + (-2x + 4)$$

$$x^3 - 3x^2 + x + 2 + 2x - 4 = g(x)(x - 2)$$

$$g(x)(x - 2) = x^3 - 3x^2 + 3x - 2$$

$$\begin{array}{r}
 x^2 - x + 1 \\
 x - 2 \overline{) x^3 - 3x^2 + 3x - 2} \\
 \underline{(-) x^3 - 2x^2} \\
 x^2 + 3x - 2 \\
 \underline{- x^2 + 2x} \\
 x - 2 \\
 \underline{x - 2} \\
 \underline{(-) 0} \\
 0
 \end{array}$$

अतः भाजक $g(x) = x^2 - x + 1$ है।

प्रश्न 5 बहुपदों $p(x)$, $g(x)$, $q(x)$ और $r(x)$ के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा

- (i) घात $p(x)$ = घात $q(x)$ हो
- (ii) घात $q(x)$ = घात $r(x)$ हो
- (iii) घात $r(x) = 0$ हो

उत्तर-

- (i) युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,

$$p(x) = g(x) \times q(x) + r(x) \text{ जहाँ } q(x) = 0 \text{ हो}$$

$$\text{घात } p(x) = \text{घात } q(x) \text{ हो}$$

भाज्य $p(x)$ और भागफल $q(x)$ की घात सामान तभी हो सकता है जब भाजक $g(x)$ की घात 0 अर्थात् कोई संख्या हो।

$$\text{उदाहरण: माना } p(x) = 2x^2 - 6x + 3$$

$$\text{और माना } g(x) = 2$$

भाग देने पर,

$$p(x) = 2x^2 - 6x + 2 + 1$$

$$= 2(x^2 - 3x + 1) + 1$$

अब $2(x^2 - 3x + 1) + 1$ को $p(x) = g(x) \times q(x) + r(x)$ से तुलना करने पर हम पाते हैं।

$$\text{अतः } q(x) = x^2 - 3x + 1 \text{ और } r(x) = 1$$

इससे घात $p(x)$ = घात $q(x)$ प्राप्त होता है।

- (ii) युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,

$$p(x) = g(x) \times q(x) + r(x) \text{ जहाँ } q(x) = 0 \text{ हो,}$$

$$\text{घात } q(x) = \text{घात } r(x) \text{ हो,}$$

यह स्थिति तब आती है जब $p(x)$ और $g(x)$ का घात सामान हो जैसे-

$$\text{माना } p(x) = 2x^2 + 6x + 7 \text{ और } g(x) = x^2 + 3x + 2$$

$$\text{भाग देने पर, } q(x) = 2 \text{ और } r(x) = 3$$

$$\text{अतः घात } q(x) = \text{घात } r(x) \text{ है।}$$

(iii) युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,

$$p(x) = g(x) \times q(x) + r(x) \text{ जहाँ } q(x) = 0 \text{ हो,}$$

$$\text{घात } r(x) = 0 \text{ हो,}$$

$$r(x) = 0 \text{ तब होता है जब } p(x), g(x) \text{ से पूर्णतः विभाजित हो,}$$

$$\text{माना, } p(x) = x^2 - 1 \text{ और } g(x) = x + 1$$

विभाजित करने पर

$$q(x) = x - 1 \text{ और } r(x) = 0 \text{ प्राप्त होता है।}$$

प्रश्नावली 2.4 (पृष्ठ संख्या 40)

प्रश्न 1 सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए:

$$(i) \ 2x^3 + x^2 - 5x + 2; \frac{1}{2}, 1, -2;$$

$$(ii) \ x^3 - 4x^2 + 5x - 2; 2, 1, 1$$

उत्तर-

$$(i) \ p(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$$

$$\therefore p\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 5\left(\frac{1}{2}\right) + 2$$

$$= \frac{2}{8} + \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + 2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + \frac{2}{1}$$

$$= \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{2}{1}\right) - \frac{5}{2} = \frac{5}{2} - \frac{5}{2} = 0$$

$\Rightarrow \frac{1}{2}$, बहुपद $p(x)$ का एक शून्यक है।

पुनः $p(1) = 2(1)^3 + (1)^2 - 5(1) + 2$

$$= 2 + 1 - 5 + 2$$

$$= (2 + 2 + 1) - 5 = 5 - 5 = 0$$

$\Rightarrow 1$, बहुपद $p(x)$ का एक शून्यक है।

अब, $p(-2) = 2(-2)^3 + (-2)^2 - 5(-2) + 2$

$$= 2(-8) + (4) + 10 + 2$$

$$= -16 + 4 + 10 + 2$$

$$= -16 + 16 = 0$$

$\Rightarrow -2$, बहुपद $p(x)$ का एक शून्यक है।

शून्योंको और गुणांकों के संबंद

$$\therefore p(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$$

\therefore इसकी तुलना $ax^3 + bx^2 + cx + d$ से करने पर,

$$a = 2, b = 1, c = -5 \text{ और } d = 2$$

तथा $p(x)$ के लिए दीए गये शून्यक $\frac{1}{2}, -2$ और 1 है।

$$\text{इसलिए } \alpha = \frac{1}{2}, \beta = 1 \text{ और } \gamma = -2$$

$$\therefore \alpha + \beta + \gamma = \frac{1}{2} + 1 + (-2) = -\frac{1}{2}$$

$$\text{शून्यको का योगफल} = \frac{-b}{a} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = \frac{-b}{a}$$

दो शून्यको को क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल:

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{1}{2}(1) + 1(-2) + (-2)\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} - 2 - 1 = \frac{-5}{2} = \frac{c}{a}$$

तीनों शून्यको का गुणनफल

$$= \alpha\beta\gamma = \frac{1}{2} \times 1 \times (-2) = -1$$

अर्थात्

$$\frac{-d}{a} = \frac{-2}{2} = -1 \Rightarrow \alpha\beta\gamma = \frac{-d}{a}$$

इस प्रकार, $p(x)$ के शून्यको और गुणांकों के संबंध सत्यापित होते हैं।

(ii) यहाँ,

$$p(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

$$p(2) = (2)^3 - 4(2)^2 + 5(2) - 2$$

$$= 8 - 16 + 10 - 2 = 18 - 18 = 0$$

$\Rightarrow 2$, बहुपद $p(x)$ का शून्यक है।

$$\text{पुनः } p(1) = (1)^3 - 4(1)^2 + 5(1) - 2$$

$$= 1 - 4 + 5 - 2 = 6 - 6 = 0$$

$\Rightarrow 1$ बहुपद $p(x)$ का शून्यक है।

$\therefore 2, 1$ और 1 बहुपद $p(x)$ शून्यक है।

अब, $p(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ की तुलना $ax^3 + bx^2 + cx + d$ के साथ करने पर,

$$a = 1, b = -4, c = 5 \text{ और } d = -2$$

$\therefore 2, 1$ और 1 बहुपद $p(x)$ के शून्यक है।

$$\text{माना } \alpha = 2; \beta = 1; \gamma = 1$$

$$\text{संबंध: } \alpha + \beta + \gamma = 2 + 1 + 1 = 4$$

$$\text{शून्यको लका योगफल} = \frac{-b}{a} = \frac{-(-4)}{1} = 4$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = \frac{-b}{a}$$

दो शून्यको का क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 2(1) + 1(1) + 1(2)$$

$$= 2 + 1 + 2 = 5$$

$$\text{तथा } \frac{c}{a} = \frac{5}{1} = 5$$

$$\Rightarrow \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$$

$$\text{शून्यकों का गुणनफल } \alpha\beta\gamma = (2)(1)(1) = 2$$

$$\frac{-d}{a} = \frac{-(-2)}{1} = 2$$

$$\Rightarrow \alpha\beta\gamma = \frac{-d}{a}$$

इस प्रकार बहुपद $p(x)$ के शून्यकों व गुणांकों के संबंध स्थापित होते हैं।

प्रश्न 2 एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हों।

उत्तर- माना अभीष्ट त्रिघात बहुपद $ax^3 + bx^2 + cx + d$ है और α, β तथा γ इसके शून्यक हैं।

$$\therefore \alpha + \beta + \gamma = \frac{-(x \text{ का गुणांक})}{x^3 \text{ का गुणांक}} = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{x \text{ का गुणांक}}{x^3 \text{ का गुणांक}} = \frac{c}{a}$$

$$\alpha\beta\gamma = \frac{-\text{अचर पद}}{x^3 \text{ का गुणांक}} = \frac{-d}{a}$$

$$\text{अब, } \alpha + \beta + \gamma = 2 = \frac{-d}{a}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -7 = \frac{c}{a}$$

$$\alpha\beta\gamma = -14 = \frac{-d}{a}$$

$$\text{यदि } a = 1 \text{ हो, तो } \frac{-b}{a} = 2 \Rightarrow b = -2$$

$$\frac{c}{d} = -7 \Rightarrow c = -7$$

$$\frac{d}{a} = -14 \Rightarrow d = 14$$

∴ अभीष्ट त्रिघातीय बहुपद

$$\begin{aligned} & 1x^3 + (-2)x^2 + (-7)x + 14 \\ &= x^3 - 2x^2 - 7x + 14 \end{aligned}$$

प्रश्न 3 यदि बहुपद $x^3 - 3x^2 + x + 1$ के शून्यक $a - b$, a , $a + b$ हों, तो a और b ज्ञात कीजिए।

उत्तर- दिया गया है कि: $p(x) = x^3 - 3x^2 + x + 1$

इसकी तुलना $Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ से करने पर,

चूँकि $p(x)$ के शून्यक $(a - b)$, a और $(a + b)$ हैं।

$$\therefore \text{माना } \alpha + \beta + \gamma = -\frac{B}{A} = -\frac{(-3)}{1} = 3$$

$$\Rightarrow (a - b) + a(a + b) = 3$$

$$\Rightarrow 3a = 3$$

$$\Rightarrow a = \frac{3}{3} = 1$$

$$\text{पुनः } \alpha\beta\gamma = \frac{-D}{A} = -1$$

$$\Rightarrow (a - b) \times a \times (a + b) = -1$$

$$\Rightarrow (1 - b) \times 1 \times 1(1 + b) = -1$$

[$\because a = 1$, ऊपर सिद्ध किया गया है।]

$$\Rightarrow 1 - b^2 = -1$$

$$\Rightarrow b^2 = 1 + 1 = 2 \Rightarrow b = \pm\sqrt{2}$$

अतः $a = 1$ और $b = \pm\sqrt{2}$

प्रश्न 4 यदि बहुपद $x^4 - 6x^3 - 26x^2 + 138x - 35$ के दो शून्यक $2 \pm \sqrt{3}$ हों, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए।

उत्तर-

$$\text{चूँकि } p(x) = x^4 - 6x^3 - 26x^2 + 138x - 35$$

चूँकि $p(x)$ के दो शून्यक $= 2 \pm \sqrt{3}$ हैं।

$$\therefore [x - (2 + \sqrt{3})][x - (2 - \sqrt{3})] \text{ या } [(x - 2) - \sqrt{3}][(x - 2) + \sqrt{3}]$$

$$\text{या } (x - 2)^2 - (\sqrt{3})^2 \Rightarrow \text{या } (x^2 + 4 - 4x) - 3$$

या $x^2 - 4x + 1 \therefore (x^2 - 4x + 1)$ बहुपद $p(x)$ का एक गुणखंड है।

अब, $x^2 - 4x + 1$ से $p(x)$ को विभाजित करने पर,

$$\begin{array}{r}
 x^2 - 2x - 35 \\
 x^2 - 4x + 1 \overline{) x^4 - 6x^2 - 26x^2 + 138x - 35} \\
 \underline{x^4 - 4x^2 + x^2} \\
 (-) \quad (+) \quad (-) \\
 - 2x^3 - 27x^3 + 138x - 35 \\
 - 2x^3 + 8x^2 + 140x - 35 \\
 (+) \quad (-) \quad (+) \\
 \underline{- 35x^2 + 140x - 35} \\
 - 35x^2 + 140x - 35 \\
 (+) \quad (-) \quad (+) \\
 \underline{} \\
 \underline{} \\
 0
 \end{array}$$

$$\therefore (x^2 - 4x + 1)(x^2 - 2x - 35) = p(x)$$

$$\Rightarrow (x^2 - 4x + 1)(x - 7)(x + 5) = p(x)$$

अर्थात् $(x - 7)$ और $(x + 5)$ बहुपद $p(x)$ के गुणनखण्ड हैं।

$\therefore 7$ और -5 , बहुपद $p(x)$ के अन्य शून्यक हैं।

प्रश्न 5 यदि बहुपद $x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10$ को एक अन्य बहुपद $x^2 - 2x + k$ से भाग दिया जाए और शेषफल $x + a$ आता हो, तो k तथा a ज्ञात कीजिए।

उत्तर- बहुपद $x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10$ और $x^2 - 2x + k$ पर विभाजन एल्गोरिथ्म से हमें प्राप्त होता है:

$$\begin{array}{r}
 x^2 - 4x + (8 - k) \\
 x^2 - 2x + k \overline{) x^4 - 6x^3 + 16x^2 - 25x + 10} \\
 \underline{x^4 - 2x^3 + kx^2} \\
 (-) \quad (+) \quad (-) \\
 - 4x^2 + (16 - k)x^2 - 25x + 10 \\
 - 4x^3 + 8x^2 - 4kx \\
 (+) \quad (-) \quad (+) \\
 \underline{[(16 - k) - 8]x^2 + (-25 + 4k)x + 10} \\
 \text{या} \\
 (8 - k)x^2 + (4k - 25)x + 10 \\
 (8 - k)x^2 - 2(8 - k)x + k(8 - k) \\
 (-) \quad (+) \quad (-) \\
 \underline{[(-25 + 16) + (4k - 2k)]x - k(8 - k) + 10} \\
 \text{या} \\
 (-9 + 2k)x - k(8 - k) + 10
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{शेषफल} = (2k - 9)x - k(8 - k) + 10 \dots(i)$$

$$\text{परन्तु शेषफल} = x + a \dots(ii)$$

$$\text{अतः (i) और (ii) से, } 2k - 9 = 1$$


$$\Rightarrow 2k = 11 + 9 = 20 \Rightarrow k = \frac{20}{2} = 10$$

$$\text{और } \alpha = -k(8 - k) + 10 = -10(8 - 10) + 10$$

$$= -10(-2) + 10 = 20 + 10 = 30$$


$$\text{अतः } k = 10 \text{ और } \alpha = 30$$


APNA STUDY APNA GROUP



**Class 10
Notes &
Updates**

Apna Study Apna Group

SUBSCRIBED 



SCHOOL

क्लास 10 के और भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स के नोट्स जल्द ही अपलोड किए जाएंगे 📖 ✨
धन्यवाद! आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ 🎯 😊 ***