

இன்ஹேலர் (MDI) பயன்படுத்தும் முறை

How to Use Your Metered-Dose Inhaler (MDI) Correctly — Step-by-Step Guide

பம்பு இன்ஹேலர் (pMDI) ஆஸ்துமா / சுவாசக் குழாய் பிரச்சனைக்கான மருந்தை நேரடியாக நுரையீரலுக்கு அளிக்கிறது. சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால் மட்டுமே முழு பலனும் கிடைக்கும்.

A pressurised metered-dose inhaler (pMDI) delivers asthma / airway medicine directly to the lungs. It only works fully if used with the correct technique.

பயன்படுத்தும் படிகள் | Steps to Use

#	தமிழ்	English
1	இன்ஹேலரை 5 வினாடிகள் நன்றாக உலுக்கவும்.	Shake the inhaler well for 5 seconds before each use.
2	மவுத்‌பீஸ் மூடியை திறக்கவும்.	Remove the mouthpiece cap.
3	இன்ஹேலரிலிருந்து விலகி, முழுவதுமாக மூச்சை வெளியே விடவும்.	Breathe out fully, turning your head away from the inhaler.
4	இன்ஹேலரை நேராக பிடித்து, மவுத்‌பீஸ் வாயில் வைத்து உதடுகளால் இறுக்கமாக மூடவும்.	Hold the inhaler upright, place the mouthpiece in your mouth, and seal your lips around it.
5	கேனிஸ்டரை ஒரு முறை அழுத்தி, அதே நேரத்தில் மெதுவாகவும் ஆழமாகவும் மூச்சை உள்ளிழுக்கவும்.	Press down once on the canister while breathing in slowly and deeply through the mouth.
6	இன்ஹேலரை வாயிலிருந்து எடுத்து, சுமார் 10 வினாடிகள் மூச்சை பிடித்து வைக்கவும்.	Remove the inhaler from your mouth and hold your breath for about 10 seconds.
7	பிறகு மெதுவாக மூச்சை வெளியே விடவும்.	Breathe out slowly.
8	இரண்டாவது பஃப் தேவைப்பட்டால், 30-60 வினாடிகள் காத்திருந்து மீண்டும் 1-7 படிகளை செய்யவும்.	If a second puff is prescribed, wait 30-60 seconds and repeat steps 1-7.
9	பயன்படுத்திய பின் வாயை தண்ணீரால் கொப்பளித்து துப்பவும் (ஸ்டீராய்டு இன்ஹேலர் என்றால் இது மிக முக்கியம்).	Rinse your mouth with water and spit it out after use — especially important for steroid inhalers, to prevent thrush and hoarseness.

டோஸ் கவுண்டர் மற்றும் பராமரிப்பு | Dose Counter & Maintenance

தமிழ்	English
டோஸ் கவுண்டரை அவ்வப்போது சரிபார்த்து, அது பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும் முன் புதிய இன்ஹேலரை பெறவும்.	Check the dose counter regularly and get a refill before it reaches zero — an empty inhaler gives no medicine even if it still sprays.
புதிய இன்ஹேலர் அல்லது 1 வாரத்திற்கு மேல் பயன்படுத்தாத இன்ஹேலரை, முதல் முறை பயன்படுத்தும் முன் காற்றில் 2-4 முறை சோதனை தெளிப்பு (பிரைமிங்) செய்யவும்.	If the inhaler is new, or hasn't been used for more than a week, prime it by spraying 2-4 test puffs into the air before use.
வாரத்திற்கு ஒரு முறை மவுத்‌பீஸை உலர்ந்த துணியால் துடைக்கவும். உலோக கேனிஸ்டரை தண்ணீரில் நனைக்க வேண்டாம்.	Wipe the mouthpiece with a dry cloth once a week. Do not wash the metal canister itself in water.

முக்கியமான குறிப்புகள் | Important Tips

- ஒருங்கிணைப்பில் சிரமம் / சிறு குழந்தைகள்:** கை-மூச்சு ஒருங்கிணைப்பு கடினமாக இருந்தால் அல்லது குழந்தை சிறியதாக இருந்தால், மருத்துவர் பரிந்துரைத்த ஸ்பேசர் (spacer) பயன்படுத்தவும்.
If coordinating the press-and-breathe is difficult, or for young children, use a spacer device as advised by your doctor.
- பகிர வேண்டாம்:** உங்கள் இன்ஹேலரை மற்றவர்களுடன் பகிர வேண்டாம் — தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது.
Never share your inhaler with anyone else — risk of infection spread.
- சேமிப்பு:** அறை வெப்பநிலையில், நேரடி வெயில் மற்றும் அதிக வெப்பத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கவும்.
Store at room temperature, away from direct sunlight and excess heat.
- அலெர்ஜி குறிப்பு:** மருந்தில் உள்ள எந்த பொருளுக்கும் ஒவ்வாமை தெரிந்திருந்தால், மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.
Inform your doctor if your child has a known allergy to any component of the medication.