

புழு தொற்று — குடும்ப அறிவுரைகள்

Worm Infestation — Family Instructions

ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினருக்கான அறிவுரைகள் | Instructions for Every Family Member

தமிழ்	English
வீட்டில் உள்ள அனைவரும் ஒரே நாளில் மருந்து எடுக்க வேண்டும்.	Treat ALL household members on the same day.
2 வாரங்களுக்குப் பிறகு அனைவரும் மீண்டும் ஒரு டோஸ் எடுக்க வேண்டும்.	Repeat dose in 2 weeks for all members.
நகங்களை குட்டையாக வெட்டவும்.	Cut fingernails short.
கழிப்பறை பயன்பாட்டிற்குப் பின்னும், சாப்பிடும் முன்னும் கைகளை நன்றாக கழுவவும்.	Wash hands thoroughly after toilet and before meals.
தினமும் காலையில் குளிக்கவும்.	Morning bath daily.
சிகிச்சை காலத்தில் அடிக்குள்ளாடை மற்றும் படுக்கை விரிப்புகளை தினமும் மாற்றி துவைக்கவும்.	Change and wash underwear and bed linen daily during treatment.
படுக்கை விரிப்புகளை உதறாதீர்கள்.	Do not shake bed linen.
மலவாய் பகுதியை சொறியாதீர்கள் — குறிப்பாக இரவில்.	Avoid scratching the perianal area — especially at night.

கூடுதல் சுகாதார அறிவுரைகள் | Additional Hygiene Instructions

தமிழ்	English
சாப்பிடும் முன்னும், கழிப்பறை பயன்பாட்டிற்குப் பின்னும் கைகளை கழுவவும்.	Wash hands before eating and after using the toilet.
பச்சை காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை சாப்பிடும் முன் நன்றாக கழுவவும்.	Wash all raw vegetables and fruits before eating.
மனித மலத்தை உரமாக பயன்படுத்த வேண்டாம்.	Avoid use of human faeces as fertiliser.
சுத்தமான அல்லது கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை மட்டும் குடிக்கவும்.	Drink only clean or boiled water.
அசுத்தமான மண்ணில் விளையாடுவதை தவிர்க்கவும்.	Avoid playing in contaminated soil.

மருத்துவமனைக்கு மீண்டும் வர வேண்டிய சூழ்நிலைகள் | Return to Hospital If

- இரண்டு டோஸ்களும் முடிந்த பிறகும் 2 வாரங்களுக்கு மேல் அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால்.
Symptoms persist beyond 2 weeks after completing both doses.
- வீட்டில் புதிதாக யாருக்காவது அறிகுறிகள் தோன்றினால்.
New members of the household develop symptoms.
- குழந்தைக்கு வயிற்று வலி, வாந்தி, அல்லது மலத்தில் புழுக்கள் தென்பட்டால்.
Child has abdominal pain, vomiting, or visible worms in stool.
- மருந்து எடுத்த பிறகு தோல் அரிப்பு அல்லது வேறு எதிர்வினை தென்பட்டால்.
Any signs of rash or reaction after medication.

