DM
Dr. Dinesh Mittal
MBBS, DCH ·Child Specialist ·DMC/R/00668

Dr. Dinesh Mittal Child Clinic
H-34/69, Sector 3, Rohini, Delhi 110085
+91 81305 21456 ·childspecialistrohini.com

Complementary feeding guide

ऊपरी आहार (अन्नप्राशन के बाद) गाइड

6 months – 2 years

From 6 months, breast milk alone is not enough. Start soft home food at 6 completed months and keep breastfeeding till 2 years or more. 6 महीने के बाद सिर्फ़ माँ का दूध काफ़ी नहीं। 6 महीने पूरे होने पर घर का नरम खाना शुरू करें और माँ का दूध 2 साल या उससे ज़्यादा तक जारी रखें।

1 Golden rules ज़रूरी नियम

Every milk feed is a meal. Count breast milk, formula and other milk as one meal each.
हर बार का दूध भी एक "खाना" है — माँ का दूध, फ़ॉर्मूला या दूसरा दूध, सब गिनें।

Day: 2–3 hours between any two meals (milk or semisolid). Nothing in between.
दिन में दो खानों के बीच 2–3 घंटे का अंतर रखें। बीच में कुछ न दें।

Night: 6–7 hours between meals. Do not feed every time the baby wakes.
रात में दो खानों के बीच 6–7 घंटे का अंतर। हर बार उठने पर दूध न पिलाएँ।

7 meals a day in total. As semisolids increase, milk feeds reduce.
दिन में कुल 7 खाने। जैसे-जैसे ठोस खाना बढ़ेगा, दूध की बारी कम होगी।

Thick, not watery. Food should stay on a tilted spoon. Dal-paani and soups are not enough.
खाना गाढ़ा हो, पानी जैसा नहीं — झुकी चम्मच पर टिका रहे। दाल का पानी या सूप काफ़ी नहीं।

Katori–chammach, no bottle. Feed sitting up, with no TV or phone.
कटोरी-चम्मच से खिलाएँ, बोतल नहीं। बच्चे को बैठाकर खिलाएँ, टीवी या फ़ोन नहीं।

2 How many meals and how much कितनी बार और कितना

Age उम्र	Semisolid meals ठोस खाना	Milk feeds दूध	Amount per semisolid meal एक बार में कितना	Texture खाना कैसा हो
6 months **6 महीने**	2	5	Start with 2–3 tsp (10–15 ml). Increase slowly to 50–60 ml by the end of the month. 2–3 छोटी चम्मच (10–15 ml) से शुरू करें, महीने के अंत तक 50–60 ml।	Thick, smooth mash, like thick dal. गाढ़ा, अच्छी तरह मसला हुआ — गाढ़ी दाल जैसा।
7–8 months **7–8 महीने**	3	4	60–125 ml per meal. हर बार 60–125 ml।	Mashed with small soft lumps. Soft finger foods. मसला हुआ, छोटे नरम टुकड़ों के साथ। हाथ से पकड़ने वाले नरम टुकड़े।
9–11 months **9–11 महीने**	4 3 meals + 1 snack	3	About 125 ml per meal. हर बार लगभग 125 ml।	Finely chopped, minced. Learning to chew. बारीक कटा हुआ — चबाना सीखे।
12–24 months **1–2 साल**	5 3 meals + 2 snacks	2	150–250 ml per meal. हर बार 150–250 ml।	Family food, cut small. Same food as the family, less spice. घर का वही खाना, छोटे टुकड़ों में, कम मसाले।

Measure your katori once: fill it with water and pour into a feeding bottle or measuring cup. Many small katoris hold 100–150 ml.
अपनी कटोरी एक बार नाप लें: पानी भरकर नापने वाले कप में डालें। छोटी कटोरी में अक्सर 100–150 ml आता है।

3 Sample day: times दिन का उदाहरण — समय

Age	6:00 am	8:30 am	11:30 am	2:30 pm	5:30 pm	8:30 pm	11:00 pm	Night
6 months	Milk	Milk	Semisolid	Milk	Semisolid	Milk	Milk	Sleep till 6 am
7–8 months	Milk	Breakfast	Milk	Lunch	Milk	Dinner	Milk	Sleep till 6 am
9–11 months	Milk	Breakfast	Milk	Lunch	Snack fruit	Dinner	Milk	Sleep till 6 am
1–2 years	Milk	Breakfast	Snack fruit	Lunch	Snack	Dinner	Milk	Sleep till 6 am

Milk = breast milk / formula / milk **Semisolid** = home food Day gap: **2½–3 h**

Night gap: **about 7 h** (11 pm → 6 am)

Shift the whole table to suit your family's day (for example start at 7 am). Keep the gaps the same. If the baby wakes at night before 6–7 hours, try patting and water sips first.
पूरा टाइम-टेबल अपने घर के हिसाब से आगे-पीछे कर लें (जैसे 7 बजे से शुरू), पर अंतर वही रखें। रात में 6–7 घंटे से पहले बच्चा उठे तो पहले थपकी और पानी के घूँट से सुलाने की कोशिश करें।

4 Food groups: give at least 5 of 8 every day रोज़ 8 में से कम से कम 5 समूह

1. Grains & roots
अनाज और कंद

Rice, wheat, dalia, suji, ragi, bajra, jowar, oats, poha, potato, sweet potato.चावल, गेहूँ, दलिया, सूजी, रागी, बाजरा, ज्वार, ओट्स, पोहा, आलू, शकरकंद।

2. Dals, nuts & seeds
दालें, मेवे और बीज

Moong, masoor, arhar, chana, rajma (well mashed), besan, peanut or almond powder, til.मूँग, मसूर, अरहर, चना, राजमा (अच्छे से मसला), बेसन, मूँगफली या बादाम का पाउडर, तिल।

3. Dairy
दूध से बनी चीज़ें

Dahi, paneer, small amount of milk in cooking. Cow/buffalo milk as a drink only after 1 year.दही, पनीर, खाने में थोड़ा दूध। गाय/भैंस का दूध पीने के लिए 1 साल के बाद ही।

4. Meat & fish
NON-VEG
मांस और मछली

Chicken, fish, mutton, liver — boiled, finely minced or mashed. Can start from 6–7 months.चिकन, मछली, मटन, कलेजी — उबला हुआ, बारीक कीमा या मसला। 6–7 महीने से दे सकते हैं।

5. Egg
EGG
अंडा

Whole egg, fully cooked (hard-boiled, mashed or scrambled). From 6 months.पूरा अंडा, अच्छी तरह पका हुआ (उबला, मसला या भुर्जी)। 6 महीने से।

6. Orange & dark green
नारंगी और गहरी हरी सब्ज़ी-फल

Carrot, pumpkin (kaddu), papaya, mango, palak, methi, bathua, sarson.गाजर, कद्दू, पपीता, आम, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों।

7. Other fruits & vegetables
दूसरे फल और सब्ज़ियाँ

Banana, apple, chikoo, pear, guava (no seeds), lauki, tinda, beans, peas, beetroot.केला, सेब, चीकू, नाशपाती, अमरूद (बीज निकालकर), लौकी, टिंडा, बीन्स, मटर, चुकंदर।

8. Breast milk
माँ का दूध

Continue till 2 years or more. It counts as a milk meal.2 साल या ज़्यादा तक जारी रखें। यह दूध वाला "खाना" गिना जाएगा।

Add 1 tsp ghee or oil to each semisolid meal for energy. **Iron every day:** ragi, dal, green leafy vegetables, plus EGG or NON-VEG if your family eats them. A little fruit after meals helps iron absorption.
हर ठोस खाने में 1 छोटी चम्मच घी या तेल डालें। रोज़ आयरन वाली चीज़ें: रागी, दाल, हरी पत्तेदार सब्ज़ी — और अंडा या नॉन-वेज अगर घर में खाते हैं। खाने के बाद थोड़ा फल आयरन को शरीर में लगने में मदद करता है।

EGG NON-VEG Only for families who eat them. A vegetarian diet with all the other groups is fully enough. सिर्फ़ उन परिवारों के लिए जो खाते हैं। बाकी सब समूहों वाला शाकाहारी खाना भी पूरा पौष्टिक है।

5 How to start: first weeks शुरुआत कैसे करें

Week हफ़्ता	What to give (one new food every 2–3 days) क्या दें (हर 2–3 दिन में एक नई चीज़)
Week 1–2 **पहले 2 हफ़्ते**	Rice + moong dal khichdi (mashed, with ghee), ragi porridge, mashed banana, boiled mashed potato or carrot. चावल-मूँग दाल की खिचड़ी (मसली हुई, घी के साथ), रागी की खीर/दलिया, मसला केला, उबला मसला आलू या गाजर।
Week 3–4 **तीसरा-चौथा हफ़्ता**	Dalia, suji upma, mashed papaya / apple / chikoo, pumpkin or lauki mash, dahi. EGG mashed boiled egg. दलिया, सूजी उपमा, मसला पपीता / सेब / चीकू, कद्दू या लौकी, दही। अंडा: उबला मसला अंडा।
Month 7–8 **7–8 महीने**	Vegetable khichdi, besan chilla pieces, paneer bhurji, soft roti soaked in dal, idli. NON-VEG minced chicken or fish in khichdi. सब्ज़ी वाली खिचड़ी, बेसन चीला के टुकड़े, पनीर भुर्जी, दाल में भीगी नरम रोटी, इडली। नॉन-वेज: खिचड़ी में बारीक चिकन या मछली।
Month 9 onwards **9 महीने के बाद**	Roti-sabzi (cut small), dal-chawal, poha, paratha pieces, curd rice, fruit pieces as snacks. EGG omelette pieces. NON-VEG soft chicken or fish pieces. रोटी-सब्ज़ी (छोटे टुकड़े), दाल-चावल, पोहा, पराठे के टुकड़े, दही-चावल, नाश्ते में फल के टुकड़े। अंडा: ऑमलेट के टुकड़े। नॉन-वेज: नरम चिकन या मछली के टुकड़े।

6 Do and don't क्या करें, क्या न करें

Do ✓ करें

- Wash hands and utensils. Feed freshly made food.
  हाथ और बर्तन धोएँ। ताज़ा बना खाना दें।
- Offer small sips of boiled, cooled water with meals.
  खाने के साथ उबले-ठंडे पानी के छोटे घूँट दें।
- Let the child touch and hold food. Mess is part of learning.
  बच्चे को खाना छूने और पकड़ने दें — गंदगी सीखने का हिस्सा है।
- Stop when the child turns away or closes the mouth.
  बच्चा मुँह फेरे या बंद करे तो रुक जाएँ।
- Try a refused food again after a few days. It may take 8–10 tries.
  मना की हुई चीज़ कुछ दिन बाद फिर दें — 8–10 बार में पसंद आती है।
- Give iron and vitamin D drops only as your doctor advises.
  आयरन और विटामिन D की दवा डॉक्टर की सलाह से ही दें।

Don't × न करें

- **No salt** before 1 year. **No sugar, jaggery** before 1 year (ideally 2). **Never honey** before 1 year.
  1 साल से पहले नमक नहीं। चीनी, गुड़ 1 साल (बेहतर 2 साल) तक नहीं। शहद 1 साल से पहले कभी नहीं।
- No biscuits, packet foods, juice, cold drinks, tea or coffee.
  बिस्किट, पैकेट वाला खाना, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय-कॉफ़ी नहीं।
- No bottle, and no food mixed in the milk bottle.
  बोतल नहीं, और बोतल के दूध में खाना मिलाकर नहीं।
- No forcing, no feeding while asleep, no TV or phone at meals.
  ज़बरदस्ती नहीं, सोते में नहीं, खाते समय टीवी-फ़ोन नहीं।
- No whole nuts, whole grapes, chana, popcorn or hard pieces before 4 years (choking risk).
  4 साल से पहले साबुत मेवे, साबुत अंगूर, चना, पॉपकॉर्न या सख्त टुकड़े नहीं — गले में फँस सकते हैं।
- Don't leave cooked food out for more than 1 hour; throw it away.
  पका खाना 1 घंटे से ज़्यादा बाहर रखा हो तो फेंक दें।

7 · After 1 year: milk
1 साल के बाद दूध

- Milk is a drink, not the main food. Keep total milk to about **400 ml a day**, including dahi, paneer, shakes and kheer. Breastfeeding can continue.
  दूध पीने की चीज़ है, मुख्य खाना नहीं। कुल दूध लगभग 400 ml रोज़ — दही, पनीर, शेक और खीर मिलाकर। माँ का दूध जारी रख सकते हैं।
- Too much milk causes poor appetite, constipation and anaemia.
  ज़्यादा दूध से भूख कम, कब्ज़ और खून की कमी होती है।
- Give milk in a cup or glass, not a bottle.
  दूध कप या गिलास से दें, बोतल से नहीं।

8 · See the doctor if
डॉक्टर को दिखाएँ अगर

- Weight is not increasing, or the child refuses most food for a week.
  वज़न नहीं बढ़ रहा, या बच्चा एक हफ़्ते से ज़्यादातर खाना मना कर रहा है।
- Gagging or vomiting with every lumpy food after 9–10 months.
  9–10 महीने के बाद हर टुकड़े वाले खाने पर उबकाई या उल्टी।
- Rash, vomiting or loose motions every time after a particular food.
  किसी खास चीज़ के बाद हर बार दाने, उल्टी या दस्त।

Go to emergency immediately
तुरंत इमरजेंसी जाएँ

- Swelling of lips, face or eyes, or difficulty breathing after a food.
  खाने के बाद होंठ, चेहरा या आँखें सूजें, या साँस लेने में दिक्कत।
- Choking: cannot cry, cough or breathe.
  गले में कुछ फँसा हो — बच्चा रो, खाँस या साँस न ले पाए।

Based on IAP infant and young child feeding guidelines and WHO guidance. This guide is general advice; follow your doctor's advice for your child. यह सामान्य सलाह है; अपने बच्चे के लिए डॉक्टर की सलाह मानें।

Dr. Dinesh Mittal, MBBS, DCH
+91 81305 21456