DM
**Dr. Dinesh Mittal**
MBBS, DCH ·Child Specialist ·DMC/R/00668

Dr. Dinesh Mittal Child Clinic
H-34/69, Sector 3, Rohini, Delhi 110085
+91 81305 21456 ·www.drdineshmittal.com

# Complementary feeding guide

## ऊपरी आहार (अन्नप्राशन के बाद) गाइड

**6 months – 2 years**

From 6 months, breast milk alone is not enough. Start soft home food at 6 completed months and keep breastfeeding till 2 years or more. 6 महीने के बाद सिर्फ़ माँ का दूध काफ़ी नहीं। 6 महीने पूरे होने पर घर का नरम खाना शुरू करें और माँ का दूध 2 साल या उससे ज़्यादा तक जारी रखें।

## 1 Golden rules ज़रूरी नियम

**Every milk feed is a meal.** Count breast milk, formula and other milk as one meal each.
हर बार का दूध भी एक "खाना" है — माँ का दूध, फ़ॉर्मूला या दूसरा दूध, सब गिनें।

**Day: 2–3 hours** between any two meals (milk or semisolid). Nothing in between.
दिन में दो खानों के बीच 2–3 घंटे का अंतर रखें। बीच में कुछ न दें।

**Night: 6–7 hours** between meals. Do not feed every time the baby wakes.
रात में दो खानों के बीच 6–7 घंटे का अंतर। हर बार उठने पर दूध न पिलाएँ।

**7 meals a day** in total. As semisolids increase, milk feeds reduce.
दिन में कुल 7 खाने। जैसे-जैसे ठोस खाना बढ़ेगा, दूध की बारी कम होगी।

**Thick, not watery.** Food should stay on a tilted spoon. Dal-paani and soups are not enough.
खाना गाढ़ा हो, पानी जैसा नहीं — झुकी चम्मच पर टिका रहे। दाल का पानी या सूप काफ़ी नहीं।

**Katori–chammach, no bottle.** Feed sitting up, with no TV or phone.
कटोरी-चम्मच से खिलाएँ, बोतल नहीं। बच्चे को बैठाकर खिलाएँ, टीवी या फ़ोन नहीं।

## 2 How many meals and how much कितनी बार और कितना

| Age<br>उम्र | Semisolid meals<br>ठोस खाना | Milk feeds<br>दूध | Amount per semisolid meal<br>एक बार में कितना | Texture<br>खाना कैसा हो |
|---|---|---|---|---|
| **6 months**<br>**6 महीने** | 2 | 5 | Start with 2–3 tsp (10–15 ml). Increase slowly to 50–60 ml by the end of the month.<br>2–3 छोटी चम्मच (10–15 ml) से शुरू करें, महीने के अंत तक 50–60 ml। | Thick, smooth mash, like thick dal.<br>गाढ़ा, अच्छी तरह मसला हुआ — गाढ़ी दाल जैसा। |
| **7–8 months**<br>**7–8 महीने** | 3 | 4 | 60–125 ml per meal.<br>हर बार 60–125 ml। | Mashed with small soft lumps. Soft finger foods.<br>मसला हुआ, छोटे नरम टुकड़ों के साथ। हाथ से पकड़ने वाले नरम टुकड़े। |
| **9–11 months**<br>**9–11 महीने** | 4<br>3 meals + 1 snack | 3 | About 125 ml per meal.<br>हर बार लगभग 125 ml। | Finely chopped, minced. Learning to chew.<br>बारीक कटा हुआ — चबाना सीखे। |
| **12–24 months**<br>**1–2 साल** | 5<br>3 meals + 2 snacks | 2 | 150–250 ml per meal.<br>हर बार 150–250 ml। | Family food, cut small. Same food as the family, less spice.<br>घर का वही खाना, छोटे टुकड़ों में, कम मसाले। |

**Measure your katori once:** fill it with water and pour into a feeding bottle or measuring cup. Many small katoris hold 100–150 ml.
अपनी कटोरी एक बार नाप लें: पानी भरकर नापने वाले कप में डालें। छोटी कटोरी में अक्सर 100–150 ml आता है।

## 3 Sample day: times दिन का उदाहरण — समय

| Age | 6:00 am | 8:30 am | 11:30 am | 2:30 pm | 5:30 pm | 8:30 pm | 11:00 pm | Night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 months | Milk | Milk | Semisolid | Milk | Semisolid | Milk | Milk | Sleep till 6 am |
| 7–8 months | Milk | Breakfast | Milk | Lunch | Milk | Dinner | Milk | Sleep till 6 am |
| 9–11 months | Milk | Breakfast | Milk | Lunch | Snack fruit | Dinner | Milk | Sleep till 6 am |
| 1–2 years | Milk | Breakfast | Snack fruit | Lunch | Snack | Dinner | Milk | Sleep till 6 am |

**Milk** = breast milk / formula / milk  **Semisolid** = home food  Day gap: **2½–3 h**

Night gap: **about 7 h** (11 pm → 6 am)

Shift the whole table to suit your family's day (for example start at 7 am). Keep the gaps the same. If the baby wakes at night before 6–7 hours, try patting and water sips first.
पूरा टाइम-टेबल अपने घर के हिसाब से आगे-पीछे कर लें (जैसे 7 बजे से शुरू), पर अंतर वही रखें। रात में 6–7 घंटे से पहले बच्चा उठे तो पहले थपकी और पानी के घूँट से सुलाने की कोशिश करें।

## 4 Food groups: give at least 5 of 8 every day रोज़ 8 में से कम से कम 5 समूह

### 1. Grains & roots
**अनाज और कंद**

Rice, wheat, dalia, suji, ragi, bajra, jowar, oats, poha, potato, sweet potato.चावल, गेहूँ, दलिया, सूजी, रागी, बाजरा, ज्वार, ओट्स, पोहा, आलू, शकरकंद।

### 2. Dals, nuts & seeds
**दालें, मेवे और बीज**

Moong, masoor, arhar, chana, rajma (well mashed), besan, peanut or almond powder, til.मूँग, मसूर, अरहर, चना, राजमा (अच्छे से मसला), बेसन, मूँगफली या बादाम का पाउडर, तिल।

### 3. Dairy
**दूध से बनी चीज़ें**

Dahi, paneer, small amount of milk in cooking. Cow/buffalo milk as a drink only after 1 year.दही, पनीर, खाने में थोड़ा दूध। गाय/भैंस का दूध पीने के लिए 1 साल के बाद ही।

### 4. Meat & fish
NON-VEG
**मांस और मछली**

Chicken, fish, mutton, liver — boiled, finely minced or mashed. Can start from 6–7 months.चिकन, मछली, मटन, कलेजी — उबला हुआ, बारीक कीमा या मसला। 6–7 महीने से दे सकते हैं।

### 5. Egg
EGG
**अंडा**

Whole egg, fully cooked (hard-boiled, mashed or scrambled). From 6 months.पूरा अंडा, अच्छी तरह पका हुआ (उबला, मसला या भुर्जी)। 6 महीने से।

### 6. Orange & dark green
**नारंगी और गहरी हरी सब्ज़ी-फल**

Carrot, pumpkin (kaddu), papaya, mango, palak, methi, bathua, sarson.गाजर, कद्दू, पपीता, आम, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों।

### 7. Other fruits & vegetables
**दूसरे फल और सब्ज़ियाँ**

Banana, apple, chikoo, pear, guava (no seeds), lauki, tinda, beans, peas, beetroot.केला, सेब, चीकू, नाशपाती, अमरूद (बीज निकालकर), लौकी, टिंडा, बीन्स, मटर, चुकंदर।

### 8. Breast milk
**माँ का दूध**

Continue till 2 years or more. It counts as a milk meal.2 साल या ज़्यादा तक जारी रखें। यह दूध वाला "खाना" गिना जाएगा।

**Add 1 tsp ghee or oil** to each semisolid meal for energy. **Iron every day:** ragi, dal, green leafy vegetables, plus EGG or NON-VEG if your family eats them. A little fruit after meals helps iron absorption.
हर ठोस खाने में 1 छोटी चम्मच घी या तेल डालें। रोज़ आयरन वाली चीज़ें: रागी, दाल, हरी पत्तेदार सब्ज़ी — और अंडा या नॉन-वेज अगर घर में खाते हैं। खाने के बाद थोड़ा फल आयरन को शरीर में लगने में मदद करता है।

EGG NON-VEG Only for families who eat them. A vegetarian diet with all the other groups is fully enough. सिर्फ़ उन परिवारों के लिए जो खाते हैं। बाकी सब समूहों वाला शाकाहारी खाना भी पूरा पौष्टिक है।

## 5 How to start: first weeks शुरुआत कैसे करें

| Week<br>हफ़्ता | What to give (one new food every 2–3 days)<br>क्या दें (हर 2–3 दिन में एक नई चीज़) |
|---|---|
| **Week 1–2**<br>**पहले 2 हफ़्ते** | Rice + moong dal khichdi (mashed, with ghee), ragi porridge, mashed banana, boiled mashed potato or carrot.<br>चावल-मूँग दाल की खिचड़ी (मसली हुई, घी के साथ), रागी की खीर/दलिया, मसला केला, उबला मसला आलू या गाजर। |
| **Week 3–4**<br>**तीसरा-चौथा हफ़्ता** | Dalia, suji upma, mashed papaya / apple / chikoo, pumpkin or lauki mash, dahi. EGG mashed boiled egg.<br>दलिया, सूजी उपमा, मसला पपीता / सेब / चीकू, कद्दू या लौकी, दही। अंडा: उबला मसला अंडा। |
| **Month 7–8**<br>**7–8 महीने** | Vegetable khichdi, besan chilla pieces, paneer bhurji, soft roti soaked in dal, idli. NON-VEG minced chicken or fish in khichdi.<br>सब्ज़ी वाली खिचड़ी, बेसन चीला के टुकड़े, पनीर भुर्जी, दाल में भीगी नरम रोटी, इडली। नॉन-वेज: खिचड़ी में बारीक चिकन या मछली। |
| **Month 9 onwards**<br>**9 महीने के बाद** | Roti-sabzi (cut small), dal-chawal, poha, paratha pieces, curd rice, fruit pieces as snacks. EGG omelette pieces. NON-VEG soft chicken or fish pieces.<br>रोटी-सब्ज़ी (छोटे टुकड़े), दाल-चावल, पोहा, पराठे के टुकड़े, दही-चावल, नाश्ते में फल के टुकड़े। अंडा: ऑमलेट के टुकड़े। नॉन-वेज: नरम चिकन या मछली के टुकड़े। |

## 6 Do and don't क्या करें, क्या न करें

### Do ✓ करें

- Wash hands and utensils. Feed freshly made food.
  हाथ और बर्तन धोएँ। ताज़ा बना खाना दें।
- Offer small sips of boiled, cooled water with meals.
  खाने के साथ उबले-ठंडे पानी के छोटे घूँट दें।
- Let the child touch and hold food. Mess is part of learning.
  बच्चे को खाना छूने और पकड़ने दें — गंदगी सीखने का हिस्सा है।
- Stop when the child turns away or closes the mouth.
  बच्चा मुँह फेरे या बंद करे तो रुक जाएँ।
- Try a refused food again after a few days. It may take 8–10 tries.
  मना की हुई चीज़ कुछ दिन बाद फिर दें — 8–10 बार में पसंद आती है।
- Give iron and vitamin D drops only as your doctor advises.
  आयरन और विटामिन D की दवा डॉक्टर की सलाह से ही दें।

### Don't × न करें

- **No salt** before 1 year. **No sugar, jaggery** before 1 year (ideally 2). **Never honey** before 1 year.
  1 साल से पहले नमक नहीं। चीनी, गुड़ 1 साल (बेहतर 2 साल) तक नहीं। शहद 1 साल से पहले कभी नहीं।
- No biscuits, packet foods, juice, cold drinks, tea or coffee.
  बिस्किट, पैकेट वाला खाना, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय-कॉफ़ी नहीं।
- No bottle, and no food mixed in the milk bottle.
  बोतल नहीं, और बोतल के दूध में खाना मिलाकर नहीं।
- No forcing, no feeding while asleep, no TV or phone at meals.
  ज़बरदस्ती नहीं, सोते में नहीं, खाते समय टीवी-फ़ोन नहीं।
- No whole nuts, whole grapes, chana, popcorn or hard pieces before 4 years (choking risk).
  4 साल से पहले साबुत मेवे, साबुत अंगूर, चना, पॉपकॉर्न या सख्त टुकड़े नहीं — गले में फँस सकते हैं।
- Don't leave cooked food out for more than 1 hour; throw it away.
  पका खाना 1 घंटे से ज़्यादा बाहर रखा हो तो फेंक दें।

### 7 · After 1 year: milk
### 1 साल के बाद दूध

- Milk is a drink, not the main food. Keep total milk to about **400 ml a day**, including dahi, paneer, shakes and kheer. Breastfeeding can continue.
  दूध पीने की चीज़ है, मुख्य खाना नहीं। कुल दूध लगभग 400 ml रोज़ — दही, पनीर, शेक और खीर मिलाकर। माँ का दूध जारी रख सकते हैं।
- Too much milk causes poor appetite, constipation and anaemia.
  ज़्यादा दूध से भूख कम, कब्ज़ और खून की कमी होती है।
- Give milk in a cup or glass, not a bottle.
  दूध कप या गिलास से दें, बोतल से नहीं।

### 8 · See the doctor if
### डॉक्टर को दिखाएँ अगर

- Weight is not increasing, or the child refuses most food for a week.
  वज़न नहीं बढ़ रहा, या बच्चा एक हफ़्ते से ज़्यादातर खाना मना कर रहा है।
- Gagging or vomiting with every lumpy food after 9–10 months.
  9–10 महीने के बाद हर टुकड़े वाले खाने पर उबकाई या उल्टी।
- Rash, vomiting or loose motions every time after a particular food.
  किसी खास चीज़ के बाद हर बार दाने, उल्टी या दस्त।

### Go to emergency immediately
### तुरंत इमरजेंसी जाएँ

- Swelling of lips, face or eyes, or difficulty breathing after a food.
  खाने के बाद होंठ, चेहरा या आँखें सूजें, या साँस लेने में दिक्कत।
- Choking: cannot cry, cough or breathe.
  गले में कुछ फँसा हो — बच्चा रो, खाँस या साँस न ले पाए।

Based on IAP infant and young child feeding guidelines and WHO guidance. This guide is general advice; follow your doctor's advice for your child. यह सामान्य सलाह है; अपने बच्चे के लिए डॉक्टर की सलाह मानें।

Dr. Dinesh Mittal, MBBS, DCH
+91 81305 21456