

P08. 느타리 버섯 (정답과 해설)

01. 느타리버섯을 재배사에서 2열 4단으로 작업할 때 균상의 단과 단 사이 간격(cm)으로 가장 적절한 것은?

- ① 60 ② 50
③ 40 ④ 30

◆ 정답 : ① 60

◆ 해설 : 느타리버섯을 재배사에서 2열 4단으로 작업할 때
균상의 단과 단 사이 간격(cm)는 60cm이다.

02. 느타리버섯 재배 시 발생하는 푸른곰팡이병의 방제약제는?

- ① 베노밀 수화제(벤레이트)
- ② 클로르피리포스 입제(도스반)
- ③ 빈클로졸린 입상수화제(놀란)
- ④ 스트렙토마이신 수화제(부라마이신)

◆ 정답 : ① 베노밀 수화제(벤레이트)

◆ 해설 : 느타리버섯 재배 시 발생하는 푸른곰팡이병의 방제약제
-> 베노밀 수화제(벤레이트)

03. 느타리버섯 병재배 시설에 필요 없는 것은?

- ① 배양실 ② 억제실
③ 생육실 ④ 배지냉각실

◆ 정답 : ② 억제실

◆ 해설 : 느타리버섯 병재배 시설에 필요한 것
- 배양실, 생육실, 배지냉각실

04. 느타리버섯 벗짚재배 시 벗짚의 물 축이기 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단시간 내 축인다.
- ② 추울 때 작업한다.
- ③ 물을 충분히 축인다.
- ④ 배지의 수분은 70% 내외가 좋다.

◆ 정답 : ② 추울 때 작업한다.

◆ 해설 : 느타리버섯 벗짚재배 시 벗짚의 물 축이기 작업

- 단시간 내 축인다.
- 가을에 작업한다.
- 물을 충분히 축인다.
- 배지의 수분은 70% 내외가 좋다.

05. 버섯파리 중에 유충의 길이가 2mm 정도로 황색 또는 오렌지색을 띠며 주로 균상 표면이 장기간 습할 때 피해를 주는 해충은?

- ① 포리드
- ② 세시드
- ③ 시아리드
- ④ 마이세토피

◆ 정답 : ② 세시드

◆ 해설 : 버섯파리 중에 유충의 길이가 2mm 정도로 황색 또는 오렌지색을 띠며 주로 균상 표면이 장기간 습할 때 피해를 주는 해충은 세시드이다.

06. 느타리버섯 벗짚재배 시 벗짚의 물 축이기 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단기간 내 축인다.
- ② 추울 때 작업한다.
- ③ 물을 충분히 축인다.
- ④ 배지의 수분은 70% 내외가 좋다.

◆ 정답 : ② 추울 때 작업한다.

◆ 해설 : 느타리버섯 벗짚재배 시 벗짚의 물 축이기 작업

- 단시간 내 축인다.
- 가을에 작업한다.
- 물을 충분히 축인다.
- 배지의 수분은 70% 내외가 좋다.

07. 느타리버섯의 원기 형성을 위한 재배사의 환경 조건으로 부적합한 것은?

- ① 충분한 자연광
- ② 저온 충격과 변온
- ③ 70~80% 정도의 습도
- ④ 1,000~1,500ppm 정도의 이산화탄소 농도

◆ 정답 : ② 저온 충격과 변온

◆ 해설 : 느타리버섯 원기 형성을 위한 재배사의 환경 조건

- 충분한 자연광
- 70~80% 정도의 습도
- 1,000~1,500ppm 정도의 이산화탄소 농도

08. 느타리버섯 균상재배를 위해 솜(폐면) 배지를 살균할 때 최적 온도 범위로 가장 적합한 것은?

- ① 45~50℃
- ② 50~55℃
- ③ 60~65℃
- ④ 70~75℃

◆ 정답 : ③ 60~65℃

◆ 해설 : 느타리버섯 균상재배를 위해 솜(폐면) 배지를 살균할 때 최적 온도 범위

- 60~65℃

09. 느타리버섯의 세균성갈변병에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① *Patoea Folasci*에 의해 발생한다.
- ② 여름철 고온 상태에서 주로 발생한다.
- ③ 재배사 내의 습도가 90~95%일 때 발생한다.
- ④ 결로현상이 많이 일어나는 재배사에서 잘 발생한다.

◆ 정답 : ① *Patoea Folasci*에 의해 발생한다.

◆ 해설 : 느타리버섯의 세균성갈변병
 - *Patoea Folasci*에 의해 발생한다.
 (갓 표면이 썩어 들어가는 병이다.)

10. 성충은 다른 버섯파리에 비해 매우 작고 증식속도가 매우 빠르며 유충의 길이는 2mm 정도이고 버섯 대는 가해하지 못하는 것은?

- ① 세시드
- ② 포리드
- ③ 시아리드
- ④ 마이세토틸

◆ 정답 : ① 세시드

◆ 해설 : 성충은 다른 버섯파리에 비해 매우 작고 증식속도가 매우 빠르며 유충의 길이는 2mm 정도이고 버섯 대는 가해하지 못하는 것은 세시드이다.

11. 느타리버섯 비닐멀칭 균상재배의 종균접종 및 배양관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 접종할 톱밥종균은 콩알 크기로 부수어 사용한다.
- ② 종균은 배지의 중앙에만 접종하여 오염을 방지한다.
- ③ 멀칭하는 비닐의 색깔은 흑색,백색,청색도 가능하다.
- ④ 균사배양 온도는 배지 속이 25~30℃가 되도록 유지한다.

◆ 정답 : ② 종균은 배지의 중앙에만 접종하여 오염을 방지한다.

◆ 해설 : 느타리버섯 비닐멀칭 균상재배의 종균접종 및 배양관리
 - 접종할 톱밥종균은 콩알 크기로 부수어 사용한다.
 - 멀칭하는 비닐의 색깔은 흑색,백색,청색도 가능하다.

