

P08. 느타리 버섯 (문제 풀기)

01. 느타리버섯을 재배사에서 2열 4단으로 작업할 때 균상의 단과 단 사이 간격(cm)으로 가장 적절한 것은?

- ① 60 ② 50
③ 40 ④ 30

02. 느타리버섯 재배 시 발생하는 푸른곰팡이병의 방제약제는?

- ① 베노밀 수화제(벤레이트)
- ② 클로르피리포스 입제(도스반)
- ③ 빈클로졸린 입상수화제(놀란)
- ④ 스트렙토마이신 수화제(부라마이신)

03. 느타리버섯 병재배 시설에 필요 없는 것은?

- ① 배양실 ② 억제실
③ 생육실 ④ 배지냉각실

04. 느타리버섯 벗짚재배 시 벗짚의 물 축이기 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단시간 내 축인다.
- ② 추울 때 작업한다.
- ③ 물을 충분히 축인다.
- ④ 배지의 수분은 70% 내외가 좋다.

05. 버섯파리 중에 유충의 길이가 2mm 정도로 황색 또는 오렌지색을 띠며 주로 균상 표면이 장기간 습할 때 피해를 주는 해충은?

- #### ④ 마이세토피

④ 배지의 수분은 70% 내외가 좋다.

④ 1,000~1,500ppm 정도의 이산화탄소 농도

④ 70~75℃

④ 결로현상이 많이 일어나는 재배사에서 잘 발생한다.

- ① 세시드 ② 포리드
③ 시아리드 ④ 마이세토피

11. 느타리버섯 비닐멀칭 균상재배의 종균접종 및 배양관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 접종할 톱밥종균은 콩알 크기로 부수어 사용한다.
- ② 종균은 배지의 중앙에만 접종하여 오염을 방지한다.
- ③ 멸칭하는 비닐의 색깔은 흑색, 백색, 청색도 가능하다.
- ④ 균사배양 온도는 배지 속이 25~30℃가 되도록 유지한다.

12. 느타리버섯에 피해를 주는 병해로 Trochoderma의 완전세대
로 Hypocrea가 발생하는 것은?

- ④ 푸른곰팡이병**