

## P10. 양송이버섯 (문제)

01. 양송이버섯을 곡립종균에 배양할 때 균덩이가 생성되는 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 곡립배지의 산도가 낮을 때
- ② 곡립배지의 수분 함량이 높을 때
- ③ 원균 또는 접종원이 퇴화하였을 때
- ④ 곡립배지의 흔들기 작업이 지연되었을 때

02. 양송이버섯 균사 생장에 알맞은 퇴비 배지의 최적 수분 함량은?

- ① 58~60%
- ② 68~70%
- ③ 78~80%
- ④ 88~90%

03. 양송이버섯 재배에 사용되는 복토의 조건으로 가장 부적합한 것은?

- ① 토성: 사양토
- ② 산도: PH 7.5
- ③ 유기물 함량: 4~9%
- ④ 공극률: 70~80% 입단구조

04. 양송이버섯 종균 접종 후 관리 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 퇴비 배지의 수분 함량을 90% 정도로 유지한다.
- ② 25℃ 이상 장기간 유지되면 균사가 사멸하므로 주의한다.
- ③ 퇴비 배지가 너무 과습하거나 진압을 심하게 한 경우 환기를 자주한다.
- ④ 퇴비 온도가 상승하기 시작하면 실내온도를 5~10℃ 낮도록 유지해야 한다.

05. 양송이버섯의 균사 생장에 가장 알맞은 산도(PH)는?

- ① 5.5 내외                                      ② 6.5 내외
- ③ 7.5 내외                                      ④ 8.5 내외

06. 양송이버섯의 종균재식 방법이 아닌 것은?

- ① 혼합접종법                                      ② 층별접종법
- ③ 표면접종법                                      ④ 복토접종법

07. 다음 중 양송이버섯 퇴비의 후발효 목적이 아닌 것은?

- ① 퇴비의 영양분 합성
- ② 암모니아태질소 제거
- ③ 병해충 사멸
- ④ 퇴비의 탄력성 증가

08. 양송이버섯 복토 재료의 조건 중 부적당한 것은?

- ① 공극량이 많은 것
- ② 보수력이 높은 것
- ③ 가비중이 무거운 것
- ④ 유기물이 많은 것

09. 양송이버섯 복토의 클로르피크린 약제 소독 시 토양 온도로 적합하지 않은 것은?

- ① 12℃    ② 17℃
- ③ 22℃    ④ 25℃

10. 양송이 자실체가 생장하는 과정으로 바르게 된 것은?

- ① 핀헤드 - 버튼 - 컵 - 플렛

11. 양송이 자실체 생장단계 중 갓과 대의 구분이 뚜렷해지고 있어 갓이 피기 전이며 포자가 형성되지 않아 주름살이 담홍색을 띠며 보통 수확하는 단계를 무엇이라 하는가?

12. 양송이의 주름살의 색상에 대한 설명으로 옳은 것은?

13. 양송이 재배 단계 중 환경 요인의 허용 범위가 가장 좁아서 정밀한 관리가 필요한 시기는?

14. 2~3주기 양송이 수확 시 적당한 재배사의 온도는?

15. 양송이 재배 시 발병을 고려하지 않는 조건에서 양송이 생장에 가장

알맞은 재배사 내의 상대습도는?

① 95~90%

② 85~80%

③ 75~70%

④ 65~60%