

Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca X02Z – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIB2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA EA10 - ESABAC - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Tema di: MATEMATICA, MATEMATICA E INFORMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

La funzione derivabile y = f(x) ha, per $x \in [-3, 3]$, il grafico Γ , disegnato in figura 1. Γ presenta tangenti orizzontali per x = -1, x = 1, x = 2. Le aree delle regioni A, B, C e D sono rispettivamente 2, 3, 3 e 1. Sia g(x) una primitiva di f(x) tale che g(3) = -5.




Figura 1

- 1. Nel caso f(x) fosse esprimibile con un polinomio, quale potrebbe essere il suo grado minimo? Illustra il ragionamento seguito.
- 2. Individua i valori di $x \in [-3, 3]$, per cui g(x) ha un massimo relativo e determina i valori di x per i quali g(x) volge la concavità verso l'alto.
- 3. Calcola g(0) e, se esiste, il $\lim_{x\to 0} \frac{1+g(x)}{2x}$.
- 4. Sia $h(x) = 3 \cdot f(2x + 1)$, determina il valore di $\int_{-2}^{1} h(x) dx$.





Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca X02Z – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIB2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA EA10 - ESABAC - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Tema di: MATEMATICA, MATEMATICA E INFORMATICA

PROBLEMA 2

Assegnate le funzioni reali $f(x) = \ln(x)$ e $g(x) = e^{x-2}$, e indicati con F e G i loro grafici in un riferimento cartesiano Oxy:

- 1. stabilisci dominio e codominio delle funzioni f e g, e traccia quindi i grafici relativi alle funzioni a(x) = f(g(x)) e b(x) = g(f(x));
- 2. determina l'equazione della retta r, tangente a F nel suo punto di ascissa e^2 . Stabilisci inoltre se esiste una retta s, parallela a r, che sia tangente a G;
- 3. determina l'equazione della retta t, parallela alla bisettrice del primo quadrante, che sia tangente a F. Dimostra che t risulta essere tangente anche a G;
- 4. detta A la regione piana finita delimitata dall'asse y, dalla retta di equazione y = x 1 e dal grafico G, calcola l'area di A e il volume del solido generato ruotando A intorno all'asse y.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca X02Z – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: LIB2 – SCIENTIFICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA EA10 - ESABAC - SCIENTIFICO INTERNAZIONALE FRANCESE

Tema di: MATEMATICA, MATEMATICA E INFORMATICA

QUESTIONARIO

- 1. Determinare l'espressione analitica della funzione y = f(x) sapendo che la retta y = -2x + 5 è tangente al grafico di f nel secondo quadrante e che $f'(x) = -2x^2 + 6$.
- 2. Risolvere l'equazione: $5\binom{n+1}{5} = 21\binom{n-1}{4}$.
- 3. Calcolare $\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{3x+5} \sqrt{3x-2})$.
- 4. Sia f la funzione, definita per tutti gli x reali, da

$$f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + (x-4)^2 + (x-5)^2$$

determinare il minimo di f.

- 5. Detta A(n) l'area del poligono regolare di n lati inscritto in un cerchio C di raggio r, verificare che $A(n) = \frac{n}{2}r^2sen\frac{2\pi}{n}$ e calcolarne il limite per $n \to \infty$.
- 6. I lati di un triangolo misurano, rispettivamente, 6 cm, 6 cm e 5 cm. Preso a caso un punto *P* all'interno del triangolo, qual è la probabilità che *P* disti più di 2 cm da tutti e tre i vertici del triangolo?
- 7. Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & 0 \le x \le 1\\ x^2 - kx + k & 1 < x \le 2 \end{cases}$$

determinare il parametro k in modo che nell'intervallo [0,2] sia applicabile il teorema di Lagrange e trovare il punto di cui la tesi del teorema assicura l'esistenza.

8. Il grafico della funzione $f(x) = \sqrt{x}$ ($x \in \Re, x \ge 0$) divide in due porzioni il rettangolo ABCD avente vertici A(1, 0), B(4, 0), C(4, 2) e D(1, 2). Calcolare il rapporto tra le aree delle due porzioni.