

통계적 추론

-표본의 크기가 클 때-



통계적 추론

- 표본이 갖고 있는 정보를 분석하여 모수에 관한 결론을 유도하고, 모수에 대한 가설의 옳고 그름을 판단하는 것을 말한다.
- 추출된 표본으로부터 모집단의 일반적인 특성을 추론해내는 것을 뜻한다.
- 모집단의 일부인 표본으로부터 전체 모집단의 성질을 추론해내는 것이기 때문에, 100% 확실하다고는 할 수 없다.
- 따라서, 통계적인 추론을 할 때에는 그 결론의 부정확한 정도를 반드시 언급해야 한다.
- 수치로 표시할 수 있게 하는 도구로 기초통계1에서 배웠던 확률론과 표본분포 등이 이용된다.

통계적 추론

- ▶ 통계적 추론은 조사자의 관심에 따라 모수의 추정과 모수에 대한 가설 검정이라는 두 가지 문제로 나눌 수 있다.
- ▶ 모수의 추정: 미지수인 모수에 대한 추측 혹은 추측치를 그 수치화된 정확도와 함께 제시하는 것이다.
- ▶ 모수에 대한 가설검정: 모수에 대한 여러 가설들이 적합한지 혹은 적합치 않은 것인지를 추출된 표본으로부터 판단하는 것이다.

모수의 추정

▶ 점추정:

모평균 μ 를 하나의 값으로 추정한다.

전체가 아닌 일부 표본으로부터 얻어진 수치이므로 실제 모평균 μ 와는 차이가 있기 때문에 이러한 차이, 즉 오차의 한계 또는 적당한 구간을 제시하는 것이 필요하다.

▶ 구간추정: 모평균 μ 를 포함할만한 적당한 구간을 정한다.

▶ 여기서는 모평균이라고 언급하였지만, 관심이 있는 어떤 모수에 대해서 생각하면 된다.

모수에 대한 가설검정

- 가설검정: 모평균 μ 값이 어떤 예측치(ex. 5년 전의 평균값인 155cm)와 다른지를 판단한다.
- 여기서는 모평균이라고 언급하였지만, 관심이 있는 어떤 모수에 대해서 생각하면 된다.

- 통계량(Statistic): 표본의 관측값들에 의해 결정되는 양
ex. \bar{X}, X_1, \dots
- 추정량(Estimator): 모수를 추정하기 위해 만들어진 통계량
ex. μ 에 대한 추정량 \bar{X}
- 추정치(Estimate): 주어진 관측값으로부터 계산된 추정량의 값
ex. μ 에 대한 추정량 \bar{X} 의 추정치 $\bar{x} = 160.2cm$
- 표준오차(Standard Error, S.E.): 추정량의 표준편차

모평균의 추정(표본의 크기가 클 때) - 점추정

- 모수: 모집단의 평균 μ
- 자료: 평균이 μ 이고 표준편차가 σ 인 모집단에서 임의추출한 표본 X_1, \dots, X_n
- (모평균 μ 의) 추정량: 표본평균 \bar{X}

$$E(\bar{X}) = \mu, \text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$$


- 표준오차: $S.E.(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$

- 추정된 표준오차: s/\sqrt{n} where $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

모평균의 추정(표본의 크기가 클 때) - 구간추정

➤ $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ by Central Limit Theorem

➤ $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \rightarrow P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$



➤ $P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$: 근사치

➤ 100(1 - α)% 신뢰구간

$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ if σ is known

$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$ if σ is unknown


where 100(1 - α)%: 신뢰도(신뢰수준)

➤ 오차범위(error margin): $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

신뢰구간의 의미

➤ $P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$

➤ $P(158.0563 < \mu < 162.3437) = 0 \text{ or } 1$



➤ 94%의 신뢰구간이 모수를 포함하고 있다. 반복수를 무한히 증가시키면, 95%의 신뢰구간이 모수를 포함할 것이다.

점추정과 신뢰구간



가설검정

- 대립가설(H_1): 입증하여 주장하고자 하는 가설
- 귀무가설(H_0): 대립가설의 반대 가설로 대립가설을 입증할 수 없을 때 대립가설을 무효화 시키면서 받아들이는 가설
- 제 1종오류(Type 1 error; α): 귀무가설이 맞을 때, 귀무가설을 기각하는 오류
- 제 2종오류(Type 2 error; β): 귀무가설이 틀리는데, 귀무가설을 기각하지 않는 오류

	H_0 가 사실(참)	H_0 가 허위(거짓)
H_0 채택(결정)	옳은 결정	2종 오류
H_0 기각(결정)	1종류	옳은 결정

- 검정통계량(test statistic): 검정을 할 때 이용되는 표본의 함수, 즉 통계량
ex. Z-통계량, t-통계량 등

가설검정

- 기각역(critical region): 귀무가설을 기각하게 하는 구간
ex. $R: \bar{X} \leq c$
- H_0 (귀무가설)가 맞을 때, $\alpha = P(\bar{X} \leq c)$
- H_1 (대립가설)가 맞을 때, $\beta = P(\bar{X} > c)$
- 두 확률을 최소화시키는 기각역을 선택

가설검정

- 하지만, 두 확률은 반비례 관계가 존재
- 대개의 경우에 제 1종오류가 제 2종오류보다 심각한 것이기 때문에, 제 1종 오류 값이 0.05, 0.1 또는 0.01등의 작은 값을 갖도록 상한선을 두고 제 2종 오류를 작게해 주는 기각역을 선택한다.
- 유의수준(significance level): 선택된 기각역의 H_0 하에서의 확률(α)

모평균 μ 에 대한 가설검정

- ▶ 표본의 크기가 클 때 모평균 μ 에 대한 가설 $H_0: \mu = \mu_0$ 를 검정하기 위한 검정통계량은 다음과 같다.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

검정통계량의 분포는 H_0 가 맞을 때 $N(0,1)$ 을 따른다. 각 대립가설에 대하여 유의수준 α 를 갖는 기각역은 다음과 같다.

$H_1: \mu < \mu_0$ 일 때 $R: Z \leq -z_\alpha$ (단측검정)

$H_1: \mu > \mu_0$ 일 때 $R: Z \geq z_\alpha$ (단측검정)

$H_1: \mu \neq \mu_0$ 일 때 $R: |Z| \geq z_{\alpha/2}$ (양측검정)

단, 모집단의 표준편차(σ)가 주어져 있을 때 s 를 σ 로 대체한다.

모평균 μ 에 대한 가설검정

- P-값(혹은 유의확률): 주어진 검정통계량의 관측치로부터 H_0 를 기각하게 하는 최소의 유의수준을 말한다.
- $H_1: \mu < \mu_0$ 일 때 $R: Z \leq -z_\alpha$ (단측검정) \rightarrow P-값 $= P(Z \leq z)$
- $H_1: \mu > \mu_0$ 일 때 $R: Z \geq z_\alpha$ (단측검정) \rightarrow P-값 $= P(Z \geq z)$
- $H_1: \mu \neq \mu_0$ 일 때 $R: |Z| \geq z_{\alpha/2}$ (양측검정) \rightarrow P-값 $= P(|Z| \leq |z|)$



