	Glasgow Coma Scale	score
Apertura degli occhi	**spontaneamente, cioè i meccanismi di risveglio sono presenti, non significa che è cosciente però.**	**4**
	alla parola, cioè se sente parlare, osserva.	**3**
	al dolore, solo se viene per esempio pizzicato.	**2**
	non apre gli occhi, brutto segno! Significa stato vegetativo!	**1**
Risposte verbali	**orientata, cioè il paziente è "connesso", relaziona con l'ambiente, capisce e risponde, ma non vuol dire che un paziente con ictus nell'area della parola è in coma irreversibile! Occhio!**	**5**
	confusa, cioè dice stramberie! A me è successo che una donna collegava la puntura nel sedere con una violenza e gridava dicendo che la stavano violentando!	**4**
	parole non appropriate, parole a casaccio, urla, bestemmie, cose insensate, anche se pronunciate bene!	**3**
	suoni incomprensibili, per esempio farfuglia, grugnisce..	**2**
	nessuna	**1**
Risposte motorie	**obbedisce ai comandi,**	**6**
	localizza il dolore, se non vi è risposta ai comandi si applica uno stimolo doloroso che viene mantenuto finché non si abbia il massimo della risposta: inizialmente si applica la pressione al letto ungueale con il risultato di estensione o flessione del gomito; se vi è una di queste risposte allora lo stimolo viene effettuato al collo o al tronco per ricercare la "localizzazione" che si intende effettuata quando gli arti si muovono per tentare di rimuovere lo stimolo doloroso.	**5**
	si ritrae, flette ma non localizza il dolore	**4**
	in flessione anormalmente	**3**
	in estensione al dolore, si ha quando la risposta è in adduzione delle braccia, rotazione interna e pronazione dell'avambraccio nel modello stereotipato della decerebrazione.	**2**
	Nessuna	**1**