

Logică pentru Informatică

Logica de ordinul I

Examen - 16 Februarie 2022

Subiect pentru studentul: ACHI

RU

Reguli:

- Citiți cu atenție subiectele.
- Subiectul este individual.
- Este permisă consultarea bibliografiei.
- Nu este permisă comunicarea cu alte persoane pentru rezolvarea subiectelor. Nu este permisă partajarea ciornelor sau rezolvărilor.
- Acolo unde se cere, scanați rezolvarea în format A4 într-un singur document PDF de maxim 2MB.

Înainte de a încărca soluția, verificați cu atenție calitatea scanării.

În cazul în care calitatea scanării este slabă, rezultatul va reflecta doar ce se observă în scanare fără efort.

- Soluția trebuie încărcată în documentul Google Forms de la adresa:

<https://forms.gle/4tjdtZMC53vJDCE69>.

- Soluțiile transmise prin orice alt canal de comunicare (e.g., Discord, email) nu sunt acceptate.
- Formularul nu permite încărcarea soluțiilor care nu sunt în format PDF sau au mai mult de 2MB.

0. Introduceți următorul cod în formularul Google:

C001

Introduceți numele dumneavoastră în formularul Google:

AC

1. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Considerăm următoarea frază:

Toate numerele complexe sunt impare și nu sunt mai mari decât 0.

Care dintre formulele de mai jos poate fi o traducere fidelă a frazei de mai sus în LP1:

- (a) $(\forall y'. (R(y') \rightarrow (P_1(y') \wedge \neg S_4(y'))))$
- (b) $(\forall z_3. (I'(z_3) \rightarrow (P_3(z_3) \vee S(z_3))))$
- (c) $\neg(\exists x. (R(x) \rightarrow (P_1(x) \vee S_4(x))))$
- (d) $(\forall z'. \neg(C(z') \leftrightarrow (P_2(z') \vee S(z'))))$

2. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Care formulă dintre cele de mai jos este consecință semantică din mulțimea

$$\{(\forall x. (R(x) \rightarrow P(x)))\}?$$

- (a) $(\forall x. (R(x) \rightarrow (\exists y. P(y))))$
- (b) $(\forall y. (\forall x. (R(x) \rightarrow P(y))))$
- (c) $(\forall x. (R(x) \rightarrow (\forall y. P(y))))$
- (d) $(\forall x. (\forall y. (R(x) \rightarrow P(y))))$

3. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Care formulă dintre cele de mai jos este echivalentă cu

$$((\exists y. \neg P(b)) \wedge (\forall x. P(a)))?$$

- (a) $(\exists x. \neg(\neg P(b) \rightarrow \neg P(a)))$
- (b) $((\forall x. \neg Q(x)) \wedge (\forall x. P(y)))$
- (c) $((\forall y. \neg Q(x)) \vee (\exists x. P(x)))$
- (d) $((\exists x. Q(x)) \wedge (\exists x. \neg Q(y)))$

4. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Care formulă dintre cele de mai jos este nesatisfiabilă?

- (a) $(\neg(\exists y. P(x)) \rightarrow \neg(\forall x. \neg P(a)))$
- (b) $((\forall y. Q(x)) \vee (\exists y. \neg P(y)))$
- (c) $((\forall x. \neg P(b)) \wedge \neg(\exists y. \neg Q(y)))$
- (d) $\neg(\exists y. (\neg Q(y) \rightarrow \neg Q(y)))$

5. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Care formulă dintre cele de mai jos este validă?

- (a) $((\exists y.P(a)) \rightarrow (\forall x.Q(x)))$
- (b) $(\neg(\forall y.\neg Q(a)) \wedge (\forall x.P(b)))$
- (c) $((\exists x.\neg P(b)) \rightarrow (\exists y.Q(y)))$
- (d) $(\neg(\forall x.Q(a)) \vee \neg(\forall x.\neg Q(a)))$

6. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Considerăm următoarea formulă:

$$((\exists x'.P'(x',x)) \wedge (\forall x'.P'(i(e),x'))).$$

Care dintre formulele de mai jos este o formă normală prenex a acesteia?

- (a) $(\exists z_1.(\forall x'.(\neg P'(i(e),z_1) \wedge \neg P'(x',x))))$
- (b) $(\exists x'.(\forall z_1.(P'(x',x) \wedge P'(i(e),z_1))))$
- (c) $(\forall x'.(\exists z_1.(P'(x',x) \wedge P'(i(e),z_1))))$
- (d) $(\exists x'.(\forall x'.(P'(i(e),x') \wedge P'(x',x))))$

7. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Considerăm următoarea formulă:

$$(\forall y.(\exists z.((\neg P_1(z_1,z_1) \vee \neg Q(h(y,z))) \rightarrow P_1(y,e)))).$$

Care dintre formulele de mai jos este o închidere existențială a acesteia?

- (a) $(\exists z_1.(\forall y.(\exists z.((\neg P_1(z_1,z_1) \vee \neg Q(h(y,z))) \rightarrow P_1(y,e))))$
- (b) $(\forall y.(\exists z.(\exists z_1.((\neg P_1(z_1,z_1) \vee \neg Q(h(y,z))) \rightarrow P_1(y,e))))$
- (c) $(\forall y.(\exists z.(\exists z_1.(\exists e.((\neg P_1(z_1,z_1) \vee \neg Q(h(y,z))) \rightarrow P_1(y,e)))))$
- (d) $(\forall y.(\exists z_1.(\exists z.((\neg P_1(z_1,z_1) \vee \neg Q(h(y,z))) \rightarrow P_1(y,e))))$

8. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Considerăm următoarea formulă:

$$(\forall z_3.(\exists y.(\exists z_2.((\neg P_1(j_1(a),f(a,z_3)) \wedge Q(f(a,y))) \wedge P_1(f(j_1(a),z_2),a)))).$$

Care dintre formulele de mai jos este o formă normală Skolem corespunzătoare acesteia?

- (a) $(\forall y.((\neg P_1(j_1(a),f(a,z_3)) \wedge Q(f(a,c))) \wedge P_1(f(j_1(a),g(z_3,y)),a)))$
- (b) $(\exists y.(\exists z_2.((\neg P_1(j_1(a),f(a,a)) \wedge Q(f(a,y))) \wedge P_1(f(j_1(a),z_2),a)))$
- (c) $(\forall z_3.((\neg P_1(j_1(a),f(a,z_3)) \wedge Q(f(a,k(z_3)))) \wedge P_1(f(j_1(a),j(z_3)),a)))$
- (d) $(\forall y.((\neg P_1(j_1(a),f(a,z_3)) \wedge Q(f(a,k(z_2)))) \vee P_1(f(j_1(a),k(y)),a)))$

9. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Care problemă de unificare dintre cele de mai jos are cel puțin o soluție?

- (a) $\{y \doteq g(b,h(x)), f(b,i(b)) \doteq x\}$
- (b) $\{z \doteq g(a,z), f(h(z),z) \doteq x\}$
- (c) $\{y \doteq g(x,a), f(z,z) \doteq y\}$
- (d) $\{z \doteq f(i(a),h(z)), g(i(a),z) \doteq y\}$

10. Alegeți în formularul Google litera corespunzătoare răspunsului corect.

Considerăm următorul set de clauze:

$$\{P(h(z_2, e), z_1) \vee \neg Q'(i(e)), Q'(z_2) \vee \neg P(y_2, i(y_2)) \vee S_2(y_2, i(y_2), e), \neg S_2(e, i(e), h(z_2, e))\}.$$

Care dintre clauzele de mai jos poate fi obținut prin aplicarea unei singure reguli de Rezoluție de ordinul I?

- (a) $\neg Q'(i(e)) \vee Q'(z_2)$
- (b) \square
- (c) $\neg Q'(i(e)) \vee Q'(z_2) \vee S_2(h(z_2, e), i(h(z_2, e)), e)$
- (d) $S_2(h(z_2, e), i(h(z_2, e)), e)$

11. Redactați pe o foaie A4 rezolvarea pentru exercițiul de mai jos.

Găsiți o demonstrație formală pentru următoarea secvență:

$$\{(\neg(p_3 \vee q_3) \rightarrow r'_2), \neg p_3, \neg q_3\} \vdash r'_2$$

12. Redactați pe aceeași foaie A4 rezolvarea pentru exercițiul de mai jos și încărcați scanarea foii ca un fișier PDF.

Arătați că următoarea formulă propozițională este satisfiabilă folosind un raționament la nivel semantic:

$$((r_1 \leftrightarrow r_1) \rightarrow \neg q).$$