

# Point Rotation Formula Proof

Daniel E. Janusch

October 6, 2022

preface:  $\tan^{-1}(y, x)$

pf:

goal: rotate  $(a, b)$   $\theta$  units around the point  $(h, k)$

$A_1 := (a, b)$

$B_1 := (a, k)$

$C_1 := (h, k)$

shift everything by  $(-h, -k)$

$A_2 := (a - h, b - k)$

$B_2 := (a - h, 0)$

$C_2 := (0, 0)$

$m\angle A_1 B_1 C_1 = m\angle A_2 B_2 C_2$

$t := \tan^{-1}(b - k, a - h)$  (the angle that  $(a, b)$  would have if  $(h, k)$  was the origin)

$\theta_2 := t + \theta$  (the new angle)

$(\cos \theta_2, \sin \theta_2)$  has the right angle with the distance scaled to 1

$d := \sqrt{(b - k)^2 + (a - h)^2}$  (the distance between  $(a, b)$  and  $(h, k)$ )

the point would then be  $(d \cos \theta_2, d \sin \theta_2)$

after shifting by  $(h, k)$  to counteract the shift from before it becomes  $(h + d \cos \theta_2, k + d \sin \theta_2)$

$$= \begin{pmatrix} h + \cos(\tan^{-1}(b - k, a - h) + \theta) \sqrt{(b - k)^2 + (a - h)^2}, \\ k + \sin(\tan^{-1}(b - k, a - h) + \theta) \sqrt{(b - k)^2 + (a - h)^2} \end{pmatrix}$$

■