# बेडसोर टाळताना: फक्त गादी बदलून काम भागत नाही

> अंथरुणावर असलेल्या व्यक्तीची त्वचा, आराम आणि सन्मान जपायचा आहे. छोटी नियमित काळजी यात खूप उपयोगी ठरते.

## दाबाची जखम कशी सुरू होते?

एकाच जागी बराच वेळ दाब राहिल्यास त्वचा आणि आतल्या ऊतींना इजा होऊ शकते. स्वतः वळता न येणे, त्वचेचा ओलावा, कमी खाणे आणि आधीची जखम यामुळे काळजी अधिक आवश्यक होते. ही फक्त दिसण्याची गोष्ट नाही; वेदना आणि रोजच्या आरामाशी तिचा संबंध असतो.

## रोजच्या काळजीत काय पाहायचे?

टाचा, कंबर-माकडहाडाचा भाग, नितंब, कोपरे आणि उपकरणाखालची त्वचा पाहण्याची पद्धत परिचारिकेकडून शिका. नवीन लालसरपणा, गडद किंवा जांभळट रंग, उष्णता, वेदना किंवा त्वचा उघडणे नोंदवा. गडद त्वचेवर लाल रंग ठळक दिसेलच असे नाही. रुग्ण “इथे दुखते” म्हणत असेल तर तेही महत्त्वाचे आहे.

## किती वेळाने वळवायचे?

धोका, स्वतः हालता येणे, गादी, वेदना आणि त्वचेची स्थिती पाहून प्रशिक्षित टीमने वळवण्याचा आराखडा द्यावा. सर्वांना एकच वेळापत्रक लावू नका. मदत करताना त्वचा चादरीवर घासली जाऊ नये यासाठी योग्य पद्धत शिका. व्यक्तीला काय करणार आहोत ते आधी सांगून, आराम पाहत हालचाल करा.

## महाग गादी घेतली तर बाकी काळजी संपते?

नाही. दाब कमी करणारी गादी हा योजनेचा एक भाग आहे. त्वचा स्वच्छ व कोरडी ठेवणे, आवश्यक ओलावा-प्रतिबंधक काळजी, योग्य हालचाल आणि पोषण यांचा विचारही हवा. त्वचेवर लालसरपणा दिसल्यावर जोराने तेल मालिश किंवा चोळणे करू नका; त्यामुळे नाजूक त्वचेला इजा होऊ शकते.

## खाणे कमी होत असेल तर तेही सांगा

रुग्णाला न खाल्ल्याबद्दल दोष देऊ नका. भूक, गिळण्याचा त्रास आणि वजनातील बदल सांगा. पोषणाची गरज तपासून योजना ठरते. जखम आहे म्हणून प्रत्येकाला स्वतःहून प्रथिनांची पावडर किंवा जास्त पाणी देणे योग्य नाही; किडनी, हृदय किंवा गिळण्याची अडचण असल्यास बदल आवश्यक असतात.

## जखम दिसल्यावर उशीर नको

न सुटणारा रंगबदल, फोड, वाढती वेदना किंवा उघडी जखम असेल तर लवकर तपासणी घ्या. ताप, वाढता लालसरपणा, पू किंवा व्यक्ती खूप अस्वस्थ असल्यास तातडीने सल्ला घ्या. घरच्या घरी कोणतेही प्रतिजैविक किंवा मलम लावून पाहण्याऐवजी जखमेची योग्य तपासणी आवश्यक आहे.

जीवाला धोका असलेल्या स्थितीत भारतात ११२ वर संपर्क करा. इतर देशांत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांक वापरा.

## मनातले प्रश्न

**त्वचा अखंड आहे म्हणजे धोका नाही?**

त्वचा उघडण्याआधीही रंग, वेदना किंवा तापमान बदलू शकते. सुरुवातीचा बदल कळवा.

**काळजी घेणाऱ्याला विश्रांती मिळाली तर?**

पर्यायी मदत आणि व्यवहार्य लिखित वेळापत्रक टीमबरोबर ठरवा. काळजी एका व्यक्तीवरच पडू नये.

## लक्षात ठेवण्याची गोष्ट

दाब कमी करणे, त्वचा पाहणे आणि व्यक्तीचा आराम—गादीबरोबर ही काळजीही हवी.

## आधार आणि मूळ संदर्भ


NICE CG179 — pressure-ulcer prevention and management
https://www.nice.org.uk/guidance/cg179/chapter/recommendations

NHS — pressure ulcers and warning signs
https://www.nhs.uk/conditions/pressure-sores/

NICE — preventing pressure ulcers
https://www.nice.org.uk/guidance/cg179/ifp/chapter/prevention

NIDDK — healthy eating with chronic kidney disease
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/healthy-eating-adults-chronic-kidney-disease

NHS — swallowing problems
https://www.nhs.uk/symptoms/swallowing-problems-dysphagia/

Government of India — Emergency Response Support System 112
https://112.gov.in/about


ही माहिती समजून घेण्यासाठी आहे. वैयक्तिक उपचारासाठी आपल्या डॉक्टरांची योजना पाळा. औषधे स्वतः बदलू नका. संदर्भ तपासले: २४ ऑक्टोबर २०२६.

Website: https://home-visiting-icu-doctor.vercel.app/#wikiSection
Article: pressure | mr