घरी नळीची काळजी: दोन नळ्या, दोन वेगळ्या योजना

> लघवीची नळी आणि आहाराची नळी एकसारखी नाहीत. काळजी कशी घ्यायची हे शिकून घेतल्याने घरच्यांचा ताणही कमी होतो.

“चुकले तर?” ही भीती कमी करूया

रुग्ण घरी आल्यावर उपकरणे पाहून दडपण येऊ शकते. फक्त कागदावरच्या सूचना पुरेशा वाटत नसतील तर परिचारिकेला प्रत्यक्ष करून दाखवायला सांगा. मग त्यांच्या उपस्थितीत आपण करून दाखवा. कोणती नळी आहे, तिचे काम काय आणि अडचण आल्यास कोणाला फोन करायचा हे लिहून ठेवा. सर्व नळ्यांसाठी एकच सूचना लागू होत नाही.

लघवीची बॅग कुठे ठेवायची?

बॅग मूत्राशयाच्या पातळीखाली ठेवा—फक्त “पोटाखाली” एवढे सांगणे पुरेसे नाही. नळी वाकलेली किंवा दाबली गेलेली नाही ना हे पाहा. उपकरणाला हात लावण्याआधी आणि नंतर हात धुवा. प्रवेशाजवळची त्वचा सौम्य साबण व पाण्याने स्वच्छ ठेवण्याच्या सूचना पाळा. बॅग पूर्ण भरेपर्यंत थांबू नका.

लघवी बंद झाली तर जास्त पाणी पाजायचे?

आधी नळी वाकली आहे का आणि बॅग योग्य ठिकाणी आहे का ते पाहा. तरीही निचरा होत नसेल, पोट दुखत असेल किंवा आजूबाजूने लघवी गळत असेल तर तातडीने परिचारिका किंवा डॉक्टरांशी बोला. स्वतः नळी काढू, धुवू किंवा आत ढकलू नका. किडनी किंवा हृदयाच्या आजारात पाण्याची मर्यादा असेल तर “लघवी व्हावी” म्हणून ती मोडू नका.

आहाराची नळी: वापरण्याआधी सुरक्षितता

नाकातून पोटात गेलेल्या नळीची योग्य स्थिती खात्री करून घेण्याची शिकवलेली पद्धत प्रत्येक वापरापूर्वी पाळा. नळी सरकल्याची शंका, उलटी, नवीन खोकला किंवा श्वासाचा त्रास असेल तर तिच्यातून पाणी, औषध किंवा आहार देऊ नका; टीमशी संपर्क करा. फक्त बाहेरची खूण पाहून किंवा पोटावर आवाज ऐकून स्वतः खात्री करू नका.

घाई नको; आपला लिखित आराखडा हवा

आहाराचा प्रकार, प्रमाण, वेग, शरीराची स्थिती आणि पाण्याचे फ्लश हे स्वतंत्र योजनेत हवे. गोळ्या कुटून देण्यापूर्वी त्या नळीतून सुरक्षितपणे देता येतात का ते विचारा. बंद नळीत जोराने द्रव ढकलू नका. बदलाची वेळ आणि पद्धत उपकरणानुसार ठरवा; सर्वांना एकच कालावधी लागू करू नका.

या बदलांकडे दुर्लक्ष नको

ताप, थंडी वाजणे, खालच्या पोटात दुखणे, स्पष्ट रक्त, बंद नळी किंवा नळी निसटणे यासाठी तातडीने सल्ला घ्या. आहार देताना तीव्र श्वासाचा त्रास किंवा रुग्ण प्रतिसाद देत नसेल तर आहार थांबवून **आपत्कालीन मदत** घ्या.

जीवाला धोका असलेल्या स्थितीत भारतात ११२ वर संपर्क करा. इतर देशांत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांक वापरा.

मनातले प्रश्न

कॅथेटर आहे म्हणून भरपूर पाणी द्यायचे?

पाण्याबाबतची वैयक्तिक योजना पाळा. किडनी किंवा हृदयाचा आजार असल्यास वेगळा सल्ला आवश्यक असतो.

नळी घरी स्वतः बदलता येते?

योग्य प्रशिक्षण आणि स्पष्ट वैयक्तिक सूचना असल्याशिवाय नाही. अडचण असल्यास प्रशिक्षित टीमची मदत घ्या.

लक्षात ठेवण्याची गोष्ट

स्वच्छ हात, योग्य स्थिती, शिकवलेली पद्धत आणि अडचणीच्या वेळी लगेच संपर्क—हीच सुरक्षित काळजीची सुरुवात.

आधार आणि मूळ संदर्भ

NHS — living with a urinary catheter
https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/urinary-catheters/living-with/

Cambridge University Hospitals — tube feeding at home
https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/tube-feeding-at-home/

CDC — catheter-associated infection prevention
https://www.cdc.gov/uti/about/cauti-basics.html

NIDDK — healthy eating with chronic kidney disease
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/healthy-eating-adults-chronic-kidney-disease

Government of India — Emergency Response Support System 112
https://112.gov.in/about

ही माहिती समजून घेण्यासाठी आहे. वैयक्तिक उपचारासाठी आपल्या डॉक्टरांची योजना पाळा. औषधे स्वतः बदलू नका. संदर्भ तपासले: २४ ऑक्टोबर २०२६.

Website: https://home-visiting-icu-doctor.vercel.app/#wikiSection
Article: tubes | mr